





3 2044 106 451 230

Fl  
49  
EL









2074.354

W. JUNK  
VERLAG, BUCHHANDL.  
NATURWISS. & MATHEMAT.  
BERLIN W. 15



JOAN. SIGISM.  
ELSHOLTII  
FLORA  
MARCHICA,

*Sive,*

CATALOGUS PLANTARUM,  
Quæ partim in hortis Electora-  
libus Marchiæ Brandenburgicæ  
primariis, Berolinensi, Aurangibur-  
gico, & Potsdamensi excoluntur:  
partim sua sponte passim  
proveniunt.



BEROLINI,

---

Ex officina Rungiana.

*Sumptibus Danielis Reichelii, Bibliop.*

cl<sup>o</sup> l<sup>o</sup>c LXIII.

ARBOR ETUM

HARVARD

UNIVERSITY

*Just. Lipsius lib. 1. De milit. Roman.  
Dial. 1.*

Ut in vere anni flores gignunrur, au-  
tumnus tamen est, qui dat fru-  
ctus : sic literati in florida ætate  
amœniora dant, in senili utili-  
ora.

*Nobil.*

*Excellentiss. & Experientissimis*

Marchionatus Electoralis Branden-  
burgici

**MEDICIS,**

Itemq; aliis Rei Herbariæ peritis,  
Collegis, Fautoribus, Amicis


**FLORAM MARCHICAM,**

Observantiæ tesseram offert, atq;  
ad liberalem communicationem, si quas  
præterea stirpes vernaculas propria observatio  
suppeditavit, ipsos peramanter  
invitat

**A U C T O R.**

In Floram Marchicam  
Cl. V. JOANNIS SIGISMUNDI  
ELSHOLTII,

Philos. atq; Medic. Doct. Sereniss. Elector.  
Brandenburg. Medici Ordinarii, Hortorumq;  
Electoralium Præfecti, & Practici apud Be-  
rolinenfes celeberrimi.

 *Nter Naturam varium certamen, &  
Artem,  
Vertitur, & dubio pondere nutat ho-  
nos.*

*Una per immensum spargit miracula Mundum,  
Et serit in multis adita dona locis:*

*Altera constringit. Spatio densantur in arcto  
Munera, conveniunt germina sylva coit.*

*Quid mirum est Asiam latis florescere campis,*

*Quid nos Europæ pulchra vireta movent?*

*Quid nova pars terræ proprias tenet avia plan-  
tas,*

*Quid sibi præscriptos Africa laudat agros?*

*Omnia qui jugit, qui Sole reponit in uno,*

*Cui Patriæ tellus, humor & aura favet,*

*Vicerit. Huic alius concluditur Orbis in Orbe,*

*Zonaq; disjunctas perficit una plagas.*

*In toto mirum non est consistere Mundum,*

*In spatio mirum est, & brevior libro.*

Hamburgi scr.

Michael Kirstenius,

Med. D. & Gymnas. P. P.

IN





IN  
FLORAM MARCHICAM  
INTRODUCTIO,  
De varietate conscribendi plantarū  
Catalogos.

**S** Tirpium, quas Natura parens certis locis profert, indices conficiendi & edendi ratio quanquam Antiquitatis exemplo forte non penitus destituatur: nostro tamen, & superiori seculo in usum magis tracta videtur. Ea vero cum varia sit, & satis late pateat: si de varietate illa conscribendi plantarum Catalogos hic quædam præfati fuerimus, nec operam nos lufuros, nec ab instituto illud nostro alienum fore arbitramur.

*Catalogus* origine Græca vox est, & Latinis aut sermonem sonat, aut scripturam, quæ rerum numerum vel ordinem recenset: adeoq; nobis libellum notabit, in quo nomina rerum consignata reperiuntur, sive nuda, sive notis illustrata breviculis. Componere vero catalogos in iis rebus cogimur, quarum numerus major est, quam ut retineri memoria facile possit: unde nomina militum in codicem referri Vegetius jubet, & librorum indices Bibliothecæ exigunt numerosiores. Quod si ulla unquam in re, in herbaria sane exaratis cata-

logis, ob infinitum fere plantarum numerum, longe maxime opus est.

In istis vero condendis qui defudarunt, aut universale quid moliti fuere, aut via processerunt particulari. Illorum non ita multi extant, nisi velimus exempli loco adducere Hortum medicum & philosophicum Joachimi Camerarii, qui forma catalogi digestus est. Pertinet huc Conradi Gesneri Catalogus plantarum quadrilinguis, & suo modo etiam Davidis Kyberi trilingue rei herbariæ Lexicon. Nuda nomina, sed appositis iconibus, exhibet Botanicum Francofurtanum, itemq; ex magnis operibus desumptæ & seorsim editæ Icones stirpium Leonhardi Fuchsi, Matthiæ de l'Obel sive Lobelii, Jacobi Theodori Tabernæmontani: quibus tamen scriptis vereor ut proprie nomen Catalogi competat. Speciem Indicis præ se fert etiam Botanotheca Guil. Laurembergii, quæ per Classes plantæ digeruntur, itemq; Joan. Bauhini Historiæ plantarum generalis Prodrômus: sicut ausu adhuc feliciore nuper idem tentavit Joan. Jonstonus libro, cui titulus: Notitia Regni Vegetabilis. Universalem vero Herbariorum omnium, quotquot extabant, indicem sive Pinacæ concinnavit, & anno supra millesimum sexcentesimo XXIII. Basileæ Caspar Bauhinus vulgavit: opus sane aureum, & in hoc genere adhuc sine pari, adeo ut per excellentiam Catalogus stirpium universalis merito jure dici debeat.

Par-

Particulares elenchos qui confecere, aut integram mundi partem sibi sumserunt : aut regnum, aut ducatum, aut comitatum aliquem. Exempli loco tametsi commentarios Nicolai Monardes de medicamentis Occidentalis Indiæ, aut Caroli Clusii de plantis Hispanicis, Pannonicis, Auftriacis, aut Prosperi Alpini de Plantis Ægypti, aut Guilielmi Pisonis de plantis Brasiliæ, aut Thomæ Hariotti de Insula Virginia, aut Jacobi Cornuti de plantis Canadensibus allegare non liceat : nihilo minus catalogi nomen jure suo merentur Joannis Thalii Sylva Hercynia, Joannis Franci Hortus Lusatia, Caspar. Suencfeldii Stirpes Silesiæ, Joannis Lœselii Plantæ Borussiæ: quorum etiam Conradi Gesneri Hortos Germaniæ non absurde refero.

Strictioribus adhuc limitibus industriam suam definire, qui enumerationem stirpium in certaduntaxat regionis parte sive territorio provenientium susceperunt. Ita plantas, quæ circa Basileam sponte nascuntur, peculiari catalogo complexus est Caspar Bauhinus : quæ circa Altorfium Ludovicus Jungerman, & nuperrime Mauritius Hofmannus : quæ circa Gedanum, Nicolaus Oelhafen: quæ circa Brunsvigam, Joannes Chemnitius: quæ circa Cantabrigiam Angliæ, Anonymus: quæ circa Hallam Saxonum, Carolus Schæffer nuper admodum. Stocchornium & Nessum montes in Bernatum ditione Benedictus Aretius de-

scripsit, & stirpes in eis nascentes recensuit. Idem in monte Pilati Lugdunensi describendo præstitit Joannes du Choul montium Lugdunensis agri Præfectus. Baldi vero montis Veronensis plantas Franciscus Calceolarius, ac Joannes Pona pharmacopœi typis publicaverunt. Circa Balneum Bollenſe, quas plantas tellus sponte profert, earum catalogum Joannes Bauhinus dedit: circa thermas autem Hirschbergenses, Casparus Suenfeld, quem paullo ante citavimus.

Hortorum fines omnium strictissimi, qui tamen copia plantarum nec cedunt montibus integris, & angustiam varietate compensant. Cæterum singulorum encomia viretorum, quibus nostra ætate floridum caput Europa superbissime erigit, nunc non persequar: quotusquisque enim, præter Byzantinos Othomannorum, non stupeat Hortos Viennenses Augustiff. Imperatorum: Vaticanos Pontificis, & Cardinalium Romanorum: Parisinos Regis Galliarum: Toletanos & Bruxellenses Regis Hispaniæ: aulicos Principum Electorum, Ducum, & Episcoporum per Germaniam, & speciatim quidem Heidelbergenses, Salisburgenses, atq; nuper Eystetenſes: Mantuanos Ducum Gonzagarum: Parmenses Farnesiorum: Florentinos Mediceorum, atq; alios. Nobis impræſenti ſufficiat illos attigisse, qui ob stirpium insignem varietatem possessores suos eo compulerunt, ut nomina ipsarum in indices referrent, ac typorum ope aliis communicarent, In-

Inter illos superiori seculo PATAVINUS primus emicuit, in gratiam Medicinæ Studioforum anno XXII. Serenissimi Senatus Veneti decreto exstructus. De ipso vero non pigeat audire testimonium Joannes Veslingii in epistola quadam ad Petrum Servium, Jacobi Philippi Tomasini lib. I. Gymnas. Patavin. cap. XXXII. inserta: *Est ille omnium, inquit, quot per Italiae tractus videre licuit, structurâ pulcherrimus, quemq; vel eo magis commendes, quo minus tessellato emblemate, fontium artificio, marinis corallijs, conchyliorumq; crustis, & signorum pompa: sed nativa potius venustate consurgit universus.* Ejus catalogus sub annum clō Ic XCI. Venetiis italico idiomate cum horti areis, auctore Jacobo Antonio Cortuso, prima vice lucem aspexit. Mox in Germania una cum conjectaneis synonymicis plantarum Melchioris Guilandini quarti in ordine Præfecti latine recusatus, atq; auspicio tandem Joan. Veslingii A. clō Ibc XLIII. Cretensibus plantis auctior prodiit. Cæterum de origine prima horti hujus Antenorei legi dignum est problema XX. Petri Belonii lib. De negl. stirp. cultura.

*Messana* urbs Siciliæ & studiis & mercatura celebris, in usum Medicorum hortum alit longe pulcherrimum, cujus plantas Petr. Castellus Medicinæ ibidem Professor atq; Præfectus indice complexus est, & additis præcipuorum auctorum cognominibus in lucem produxit. Libellus Messanæ anno clō Ibc XL. impressus extat.

Anno clb lbc IIX. Joannes Robinus Botanicus Regio hortum Henrici IV. *Parisiensem* cum figuris plantarum ducentis & quatuordecim Lutetiæ exaratum dedit: at vero habetur etiam Catalogus absq; iconibus stirpium illarum, quibus Viridarium Parisiense regium A. clb lbc XXXVI. fuit instructum. Quod si iconum habeatur ratio, cunctorum industriam hac parte superavit Basilius Beslerus, qui singulas Eystetensis Horti plantas in æs ad vivum prorsus delineari, & exemplaria libri nonnulla coloribus ad invidiam elegantibus illustrari, auspicio Ill. Principis Conradi Episcopi Eystetensis curavit, qui ipse ausu hoc & se digna liberalitate gratiâ non tantum omnium iniit, verum etiam Reverendissimo nomini suo gloriæ nunquam intermōituræ decus addidit.

Extat quoque Catalogus horti regii *Warsaviensis* utriusq; tam suburbani, quam qui arci adjacet: simul cum plantis vernaculis. Quin immo temperiem cœli Danici non esse teneris stirpibus adeo inimicam, numerosus nominum apparatus ostendit, quem in Catalogo horti regii *Hafniensis* impresso conspiciere licet. Porro viridario *Oxonienſi* magna Britannia superbit, *Lugdunensi* Batavia: nec minus suo se *Grœninga* jactat. Horum trium catalogi typis quoq; habentur exarati, qui nuper in unum collecti fasciculum cum plerisq; præcedentiū, *Hafniæ* a Simone Paulli publici juris facti sunt. Quin & Ludovicus Jungerman



man cognitione plantarum dum viveret, nemini secundus A. clb lbc XLVI. prælo commisit Catalogum plantarum, quæ in horto Medico & agro *Altorfino* reperiuntur: viridarium *Hessense* in Ducatu Brunsvicensi situm, scripto Germanico in lucem duodecimo abhinc anno Joannes Royer Ducis hortulanus protraxit. Plantas denique Horti Electoralis *Regiomontani* in Borussia Michael Titius, itemq; Horti publici *Amstelodamensis* libello nuperrime edito Hermannus Cornelius recensuit.

Privatorum Horti pauciores extant. Petrus tamen *Hondius* olim edidit libellum Belgicum, cui titulus: *Dapes inemptæ*, in quo viretum suum satis prolixè describit. Ante hos quatuor annos etiam stirpes proprii Horti recensuit Dionysius *Jonquet*, Medicus Parisiensis. Id quod præstitisse dicitur quoque Joan. *Hermannus* Pharmacopœus Bruxellensis. Alii præter enarratos catalogi num prælum senserint, inquirere jam non libet, præcipuos vero per Europam hos esse constat: nec dubium ullum est, quin temporis successu, & usu magis introducto plures sint hinc inde emerfuri.

Emergit sane vel hodie nostra aliquali opera novus & (quod præfiscini dictum sit) inter reliquos quoq; locum sibi vendicaturus stirpium Catalogus. Is autem licet ante paucos annos iussu Serenissimi Electoris FRIDERICI GUILLIEL.

ELMI Domini nostri clementissimi, intra limites unius Horti Berolinensis aulici primum natus fuerit: ex vicinia tamen tantum augmenti paulatim sensit, ut non hortensis amplius, sed provincialis fere nunc videri possit. Nihilominus cum Marchionatus Brandenburgensis finibus arctis haut claudatur, sed latissime pateat: plusculas hinc inde plantas præter jam observatas in locis sylvosis, palustribus, & inaccessis latere credendū est, quas successu temporis aut nos, aut alii facile superaddent: præsertim cum extremas omnes Provinciæ oras necdum simus scrutati, sed meditullium duntaxat, & loca Sedi Electorali proxima.

Ad onomatothesium autem plantarum in hoc Catalogo quod attinet, quotquot negotium ejusmodi exsequendum hæcenus subiere, maximam partem tramite nimis libero incessisse mihi videntur: dum nomina absque auctore, aut rarissime ipso addito proposuerunt. Unde sæpe numero usu venit, ut quam plantam designent, tantum non intelligatur: multo minus vero, ab aliquone Auctorum antea ea annotata, an ab auctore catalogi primum observata fuerit, clare percipi queat. Accuratus propterea cæteris elaboratus est Messanensis Catalogus, adjecta quoque Botanicorum principum synonyma continens: itemq; Catalogitum Joannis Chemnitii, & Joan. Lœselii, tum Mauritiï Hofmanni supra laudati.

Nos sane majoris perspicuitatis ergo haut volandum libere, sed inhærendum vestigiis certi aucto-

ctoris nobis esse existimavimus. Cumq; ita persuasus sim, nostra hac ætate perfectiorem Synopsin illo Casp. Bauhini paulo ante memorato Pinace vix inveniri: hunc mihi unice sequendum delegi. Utor igitur meris nominibus inde depromtis, & adjicio præcipua plantarum cognomina ex Trago, Matthiolo, Lobelio, Dodonæo, Tabernæmontano, Clusio, Beslerio, & interdum aliis, in gratiam illorum, quibus ad manus Pinax non est. Quod si tamen omnino contingat, ut cætera quoq; minorum auctorum synonyma requirantur, tunc pinax ipse adeundus fuerit atq; consulendus.

Adjicio itidem Germanicam stirpium nomenclaturam, quæ ipsa cum incredibili confusione prematur, selegi ex cæteris primarium nomen, idq; unicum plerumq;, & quod homonymia minime omnium laboret: cætera auctoribus, & plebi relinquo. Inserui etiam pauculas stirpes, quæ apud nos habentur, & tamen ab auctore nostro aut revera omissæ sunt, aut omissæ videntur. Neq; enim velim cuiquam persuadere, Casp. Bauhinum nihil ignorasse, aut rem herbariam penes ipsum adeo substituisse, ut summum perfectionis gradum attigerit: quin potius, ne ignaviæ nos posteri nostri accusent, summa ope niti decet, ut subinde aliquid a nobis quoq; conferatur.

Deniq; cum in Catalogo præsentis Hortensis atq; Sylvestris Flora suavi matrimonio coiverint: quo ab excultis spontaneæ dignoscerentur, asterisco has signare volui. Nunc autem Elenchum ipsum subjungimus.

*Abi-*

# PLANTARUM CATALOGUS.



*Bies alba sive femina*, C.B. Weiße Zanne, Abies, Matth. Lob. Tab. Picea, Dod. Sponte quidem apud nos rarius provenit: rubra vero satis frequens, quam tamen Piceam Bauhinus constituit.

*Abrotanum mas augustifolium majus*, C.B. Stabwurz / Hebraute. Abrotanum mas, Dod. Matth. Lob. Tab. Eyf. primum, Trag.

*Abrotanum campestre*, C.B.\* Wilde Stabwurz / wilde Hebraute. Ambrosia, Lon. altera, Matth. tertia, Tab. tenuifolia, Lob. Cujus cauliculi rubent, frequentior.

*Abrotanum femina foliis teretibus*, C.B. Ganz graw Cypressenfraut. Abrotanum femina, Matth. Lob. Tab. Clus. Eyf. Cupressus herba, Cord. Chamæcyparissus Plinii, Trag. Santolina altera, Dod.

*Abrotanum femina folijs minus incanis*, C.B. Grawlicht Cypressenfraut. Abrotanum secundum, Clus. Polii altera species non ita incana, Column.

*Abrotanum femina viridis*, C.B. Ganz grün Cypressenfraut. Abrotanum femina Salmantica sexta, Clus.

*Absinthium Dioscoridis*, C.B.\* Wilde Wermuth. Absinthium vulgare, Trag. Fuch. Lob. Tab. Eyf. majus & vulgare, Clus. latifolium, Dod.

Ab-

*Absinthium Ponticum tenuifolium incanum*, C. B. Garten oder Römisch Wermuth. Absinthium tenuifolium, Dod. Ponticum, Matth. Tab. Ponticum album, Eyst.

*Acacia folijs Scorpioidis leguminosa*, C. B. Indianische Acacia. Acacia, Dod. vera, Clus. Spina acaciæ Dioscoridis, Lob.

*Acanthus sativus vel mollis Vergilij*, C. B. Welsch Bärenclaw. Acanthus, Matth. levis, Eyst. verus, Trag. sativus, Dod. Lob. Tab.

*Acarna flore luteo patulo*, C. B. \* Aearne. Aearnæ varietas, Lob. Carlina sylvestris, Tab. sylvestris minor, Dod. sylvestris minor Hispanica, Clus.

*Acer montanum candidum*, C. B. \* Ahorn. Acer major, Dod. Lob. Cam. ep. Platanus, Trag. Fructus huic sunt alati.

*Acer campestre & minus*, C. B. \* Maßholder. Acer, Trag. Lob. minor, Dod. latifolium, Clus. Fructus huic lunulati.

*Acetosa pratensis*, C. B. \* Wild Sauramff. Acetosa, Lon. Oxalis, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Tob. Adest quoq; folijs crispis, quæ Oxalis crispa, Tab.

*Acetosa arvensis lanceolata*, C. B. \* Wild Sauramff mit lanzformigen blettern. Oxalis minor, Matth. minima, Trag. ovina, Tab. tenuifolia sinuata vervecina. Lob.

*Acetosa rotundifolia hortensis*, C. B. Garten



ten-Sauramiff mit runden blettern. *Oxalis rotunda*, Tab. rotundifolia, Dod. Franca seu Romana, Ger. sativa Franca rotundifolia repens, Lob.

*Acetosa Hispanica maxima*. Großer Spanischer Sauramiff. *Acetosa Hispanica grandissimis foliis*, Cam

*Acetosa Americana, folijs longissimis pediculis donatis*, C. B. Sauramiff mit bläsigten samen. *Acetosa vesicaria peregrina*, Eyst.

*Aconitum lycoctonum luteum*, C. B. & Eyst. Eisenhütlein mit gelben blumen. *Aconitum secundum*, Matth. Tab. lycoctonum majus, Dod. luteum ponticum, Lob.

*Aconitum caruleum seu Napellus primus*, C. B. Eisenhütlein mit blawen blumen. *Napellus*, Matth. Dod. arboreus, Eyst. major latifolius & angustifolius, Tab. verus caruleus, Lob. Adest etiam flore variegato.

*Aconitum racemosum*, C. B. \* Eisenhütlein mit traublicher frucht. *Christophoriana*, Dod. Lob. Clus. Tab. Eyst. cui etiam *Costus niger*.

*Aconitum unifolium luteum bulbosum*, C. B. Eisenhütlein mit knolliger wurzel. *Aconitum hyemale Belgarum*, Lob. hyemale Ponticum, Eyst. lycoctonum luteum minus, Dod. *Ranunculus cū flore in medio folio radice tuberosa*, Jo. Bauh.

*Acorus verus, sive Calamus aromaticus officinarum*, C. B. \* Calmus. *Acorum*, Tab. Eyst. legitimum, Clus. hisp. *Acorus*, perperam *Calamus aromaticus officinarum*, Matth. Lob.

*Aco-*



*Acorus adulterinus*, C. B. \* Falscher Calmus/  
Gelbe Wasser-Zilie. *Acorum falsum*, Matth. *A-*  
*corus nostras palustris*, Lob. *Iris palustris lutea*,  
Tab. *Pseudoiris*, Dod. *Pseudoiris palustris*, Eyst.

*Adonis hortensis flore minore atrorubente*, C.  
B. Brunelle. *Adonis recentiorum*, Lob. *Adoni-*  
*um*, Tab. *Flos Adonis vulgo*, Clus. *Eranthemum*,  
Dod. Eyst. Adest etiam flore miniato.

*Aethiopis folijs sinuosis*, C. B. Mohrenkraut.  
*Aethiopis*, Matth. Dod. Tab. Eyst. five *Phlomi-*  
*tis*, Lob.

*Ageratum folijs serratis*, C. B. Leber-Balsam.  
*Ageratum*, Matth. Tab. Eyst. *Septentrionalium*,  
Lob. *Eupatorium Mesuz*, Trag. *Balsamita mi-*  
*nor*, Dod.

*Alcea vulgaris minor*, C. B. \* *Alcea* / *Sigmars-*  
*fraut*. *Alcea*, Matth. Tab. *vulgaris*, Dod. Lob.  
Clus. Eyst.

*Alcea cannabina*, C. B. *Alcea* mit hanffblet-  
tern. *Alcea fruticans*, Eyst. *fruticosior*, Lob. *fru-*  
*ticosa cannabino folio*, Clus.

*Alcea arborescens Syriaca*, C. B. Baum-*Al-*  
*cea* / *Ketmia* / *Syrischer Pappelbaum*. *Alcea Syri-*  
*aca*, Eyst. *arborescens*, Cam. *Althaea frutex secun-*  
*da*, Clus. *Ketmia Syrorum*, quibusdam. *Flos co-*  
*lore variat*.

*Alcea vesicaria*, C. B. & Dod. *Alcea* mit bla-  
senblumen. *Alcea Veneta*, Trag. Eyst. *peregrina*,  
Tab. *Solisequa*, Lob. *Malva Veneta*, Lon. *Hype-*  
*coun*, Matth,

*Alcea Indica parvo flore*, C. B. *Alcea* *Bamia*, *Alcea* *Ægyptia*, Clus. *Bamia*, *Alpin.* *Cam.* *Belli.* *Bamia Alexandrina*, Cæsalp.

*Alcea Ægyptiaca villosa*, C. B. Mosch *Alcea*. *Bamia muschata*, Jo. Veslingii *Not. ad Prosp.* *Alpin. de plant. Ægypt.* *Abelmosch Ægyptiorum*, Ponæ. *Belmuscus Honorii Belli.* Semen odore moschum refert.

*Alchimilla vulgaris*, C. B. \* & Clus *Sinatr.* *Alchimilla*, *Trag.* *Dod.* *Lob.* *Tab.* *Eyst.* *Pes leonis*, *Fuch.* *Lon.* *Stellaria*, *Matth.*

*Alliaria*, C. B. \* *Matth.* *Dod.* *Lob.* *Tab.* *Knoblauchkraut/Leuchel.* *Alliaria* & *Thlaspidium cornutum*, *Trag.* *Alliastrum*, *Gesn. hort.*

*Allium sativum*, C. B. & *Dod.* *Knoblauch.* *Allium*, *Trag.* *Matth.* *Ruell.* *Lob.* *Lon.* *hortense*, *Fuch.*

*Allium sativum alterum*, C. B. & *Dod.* *Schlangen-Knoblauch* / quoniam caput cum summa caulis parte sese contorquet serpentis instar. *Allium Creticum* vel *serpentinum*, *Cam.* *sativum amphicarpon*, *Cord.* feritur enim nucleis tam radicis, quam capitis. *Scorodoprasum secundum*, *Clus.*

*Alnus rotundi folia, glutinosa viridis*, C. B. \* *Else/Erle.* *Alnus*, *Dod.* *Matth.* *Trag.* *Lob.* *Tab.* *vulgaris*, *Clus.* *Ligna foco præbet*, & *palos sub aqua lapidescentes.*

*Alnus folio incano*, C. B. *Molligt Elsenbaum.*

*Al-*

*Alnus hirsuta*, Matth. An *Alnus altera*, Clus. Folia parte adversa glabra & viridia: averfa lanuginosa & albicantia. Ne cum *Aria Theophrasti* confundatur, cavendum.

*Alnus nigra baccifera*, C.B.\* *Saulbaum*/Trag. *Alnus nigra*, Lob. *baccifera*, Tab. *Frangula*, Dod. Matth. *Arbor foetida*, Lon. *Cortex interior corpus* satis violenter evacuat.

*Alnus nigra polycarpus*, C. B.\* *Saulbaum* mit grossen geferbten blettern/*Kreuzbeer*. *Lonic.* An *Alnus nigra baccifera rugosiore folio seu major*, Joh. Bauh. Cæteris auctoribus indicta videtur. Reperi primum in ripa fluvii *Stapeniz* prope oppidum *Prignicense Perleberg*, ubi vulgo *Potscherben* appellabatur.

*Aloe vulgaris*. C. B. *Alloe*. *Aloë*, Trag. Matth. Dod. Lob. Clus. *Eyst*, communis, Cam. *Græca*, quorundam. Hæc mira extra terram vivacitate vi- ret: unde laquearibus appendi consuevit. In Indiis nata amarefcit, & succum notum *seplasiis* sup- peditat: is amaror in noſtrate non deprehen ditur.

*Aloe folio in oblongum aculeum abeunte*, C. B. *Americanische Alloe*. *Aloe Americana*, Dod. Clus. Tab. *Eyst*. *Aloe folio mucronato*, Lob. Succus ex ea colligitur, inquit *Camerarius* in hor- to, facultate cum priore non diffimili. In hortis Electoralibus habentur tres satis grandes, quarum tamē nulla hæctenq floruit: nihilominus cum tem- pore flores expectamus, freti aliarum exemplis.

Sane creditum haecenus fuit, Aloen Americanam in Europa vix ante centesimum annum flores proferre : unde evenit, ut de ejus flore Botanici Europæi ferè omnes tacuerint. Primus Carolus Clusius in Curis posterior, retulit historiam unius, quæ Avenioni 1599. M. Majo caulem protrudere & florere cæpit, & intra quatuor aut quinque dies ad tringinta palmos pervenit. Post Clusium annotavit similem historiam Petrus Borellus, Centur. I. Observ. I. de Aloe, quæ Monspelii in horto D. Perier Pharmacopœi A. 1647. caulem subito, & quidem cum fragore, strepitu atq; impetu protrusit, una cum floribus in summitate: ita ut triginta circiter palmorum mensuram caulis intra quatuor aut quinque dies acquisierit, inferiore parte femoris crassitiem æquante. Idem Borellus simile quid in urbe Piscenenfi Languedociæ paullo ante contigisse asserit, & quidem in conspectu Regis Ludovici XIII. & Cardinalis Richelii, multorumq; magnatum, ubi intra XXXVI. horas ad XXVIII. palmos excrevit talis Aloe, adeo ut stupendam hanc stirpem à pictore eximio delineari Rex jussit. Porro verò delata quoq; fuit A. superioris seculi octogesimo tertio in hortum Stutgardiensem Cellissimi Principis VVirtembergici quædam Aloe, quæ sumtis paulatim incremensis tandem A. 1688. simili ratione caulem M. Majo protrudere, & in flores postea expandi cæpit usq; ad Septembrē proximē sequentem. Acquisiverat interea caulis

cras.



crassitiem duum pedum, & quatuor digitorum: altitudinem XXIII. pedum, & IV. digitorum. Emiserat etiam ramos XL. umbella florida ornatos, ita ut singulæ umbellæ, sicut in Icone impressa apparet, ducentis, trecentis aut quadringentis flosculis constarent.

*Aloe palustris*, C. B. \* Wasser Aloe/ Sichelkraut. *Sedum aquatile*, Dod. *Stratiotes* sive *Militaris aizoides*, Lob. Fundo Spreæ fluminis copiose innascitur.

*Alsine hederula folio*, C. B. \* Hünnerbiß mit kleinen Ephemblettern. *Alsine hederacea*, Tab. spuria prior, Dod. *Morsus gallinæ folio hederulæ*, Lob.

*Alsine chamadryfolia*, flosculis pediculis oblongis insidentibus, C. B. \* Hünnerbiß mit Gamanderblättern. *Alsine spuria altera*, Dod. foliis trifraginis, Lob. ic. Tab.

*Alsine triphyllos cærulea*, C. B. \* Hendelkraut flosculis cæruleis, Trag. *Alsine recta*, Tab. parva recta, Lob. ic.

*Alsine altissima nemorum*, C. B. \* Sehr hoher Hünnerbiß. *Alsine major*, Dod. Tab. maxima, Lob. ic. *Morsus gallinæ* secundum genus, Trag.

*Alsine media*, C. B. \* & Tab. Mittelmässiger Hünnerbiß/ Mewr. *Alsine*, Matth. Lob. Lon. minor, Dod. *Morsus gallinæ* primum genus, Trag.

*Alsine minor multicaulis*, C. B. \* Kleiner

Hünerbiß mit vielen stengeln. *Alfene minor*, Fuchs. Tab. minima, Dod. Lob. Morfus gallinæ quarta species, Trag.

*Alfene affinis Androsace dicta major*, C. B. Hünerbiß Androsace genant. Androsace altera, Matth. Clus. Tab. annua spuria, Ger.

*Alfene Spergula dicta major*, C. B. \* Hünerbiß Spergula genant. Spergula, Dod. Saginæ Spergula, Lob. icon.

*Alfene hirsuta minor*, C. B. \* Kauer Hünerbiß: Alfene hispida minuta, Thalii.

*Althæa Dioscoridis & Plinij*, C. B. \* Gemeine Ybisch/ Hemisch. Althæa, Matth. Trag. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Eyst. Bysmalva, Ger.

*Althæa Theophrasti flore luteo*, C. B. Ybisch mit gelben blumen. Althæa luteis floribus, Lob. Malva Theophrasti, Tab. Abutilon Avicennæ, Matth. Eyst.

*Amaranthus simplicipanicula*, C. B. Tausend- schön der gemeine. Amaranthus, Matth. vulgaris, Tab. spicatus, Eyst. angustifolius simplicispicata panicula, Lob.

*Amaranthus maximus*, C. B. Tausend- schön der größte. Amaranthus major paniculis rubris, Eyst. major floribus paniculosis. spicatis purpureis, Lob. major flore obsoleti coloris, Dod. Blitum, Matth. majus Peruanum, Clus.

*Amaranthus panicula incurva*, C. B. Tausend- schön mit gekrümmtem busche. Amaranthus cristata-



status, Eyst. holosericeis sanguineis reticulatis floribus, Lob.

*Amaranthus panicula conglomerata*, C. B. Tausendschön mit gedrungenem busche. *Amaranthus purpureus major*, Tab. saturo cocci colore, Dod. purpureus saturo coccineus, Lob.

*Amaranthus folio variegato*, C. B. Tausendschön mit bunten blettern/ Papagen- Federn. *Amaranthus tricolor*, Lob. Tab. Eyst. *Blitum maculosum*, & *Herba papagalli*, Dod.

*Amaranthus coccineus*. Ganz rother Amaranth. Nimirum caules, & folia, & flores, adeoq; tota stirps eleganter rubet: proditus ipse fuit primum a Joanne Parkesonio Anglo in Theatro Botanico, Londini 1646. edito.

*Amygdalus sativa*, C. B. Mandelbaum. *Amygdalus*, Dod. Trag. Tab. *Amygdala*, Matth. Lob. Eyst. Adsunt tum dulces, tum amaræ.

*Amygdalo nana*. Zwercfmandelbaum. Elegans hæc est, & ab altera proceritate differt, foliisque angustis: fructu non adeò.

*Anagallis phæniceo flore*, C. B. \* Lichtrohter Gauchel/ Zeisigkraut. *Anagallis mas*, Matth. Dod. Trag. Fuch. Lon. phænicea, Tab. phænicea mas, Lob.

*Anagallis ceruleo flore*, C. B. Blauer Gauchel. *Anagallis foemina*, Matth. Dod. Trag. Fuch. Lon. cærulea, Tab. cærulea foemina, Lob. Clus.

*Anagallis aquatica major folio subrotundo*,

*C. B.* \* Grosse Bachbungen mit rundlichen blettern. *Anagallis aquatica folio maximo*, Thal. Berula, Tab.

*Anagallis aquatica minor folio subrotundo*, *C. B.* \* Kleine Bachbungen mit rundlichen blättern. *Anagallis aquatica sive Becabunga Germanorum*, Lob. Dod. minor prima, Tab.

*Anagallis aquatica major folio oblongo*, *C. B.* \* Grosse Bachbungen mit länglichen blettern. *Berula major*, Tab.

*Anagallis aquatica minor folio oblongo*, *C. B.* \* Kleine Bachbungen mit länglichen blettern. *Anagallis aquatica minor secunda*, Tab.

*Anagyris non foetida minor*, *C. B.* Baumbo-  
nen. *Anagyris minus foetens*, Lob. altera, Matth. Tab. angustifolia, Eyst. Faba inversa, Trag. Lon. Eghelo, Dod.

*Androsæmon maximum frutescens*, *C. B.* Staudigt Mannsblut. *Androsænum*, Dod. *Clymenum Italarum*, Lob. *Siciliana*, Eyst. *Herba Siciliana*, Tab.

*Androsæmon foetidum*, *C. B.* Stinkend Mannsblut. *Androsæmon tragodes*, Eyst. minus, Cam. *Tragium*, Ponæ. *Creticum*, Bellon.

*Anemone Geranij rotundo folio purpurascens*, *C. B.* Anemone/Windröflein. *Anemone prima*, Dod. papaveracea, Tab. latifolia altera, Clus. hisp. tuberosa bulbocastani radice, Lob.

*Anem. latifolia simplici carneo flore*, *C. B.* Anemo-

*Anemone hortensis latifolia sexta simplici flore*, Clus.

*Anemone ænanthes folijs flore violaceo hexaphyllo*, C. B. *Anemone tertia*, Dod. *tenuifolia altera*, Clus. hisp. *angustifolia*, Tab. *tuberosa radice*, Lob. *tenuifolia flore purpureo violaceo*, Eyst. Adest etiam *flore rubro*.

*Anemone tenuifolia flore amplo atrorubente*, C. B. *Anemone hortensis tenuifolia 17. simplici flore*, Clus. Vulgo, il Ré.

*Anemone tenuifolia flore niveo*, C. B. *Anemone hortensis tenuifolia 13. simplici flore*, Clus. qui addit, Constantinopoli primum missam fuisse nomine Galipoli laté.

*Anemone tenuifolia flore exalbido majore*, C. B. *Anemone hortensis tenuifolia decima flore simplici*, Clus.

*Anemone latifolia maxima versicolor*, C. B. *Anemone latifolia flore multiplici*, Clus. hisp. & pann. *Chalcedonica major*, Tab. *maxima polyanthos Chalcedonica*, Lob.

*Anemone latifolia Pavo minus polyphylla*, C. B. *Anemone hortensis latifolia Pavo major 2. Clus. hortensis flore pleno coccineo variegata latifolia*, Eyst.

*Anemone latifolia flava*, C. B. *Anemone hortensis latifolia duplo flore flavo*, Clus. Eyst.

*Anemone tenuifolia multiplex rubra*, C. B. *Anemone multiplex rubra*, Clus. hisp. *quarta*, Dod. *flore multiplicato coccineo*, Lob. *colore tenuifolia*, Eyst.

B 5

ARNOLD Arboretum  
HARVARD  
UNIVERSITY

*Anemone tenuifolia multiplex purpurea*, C. B. *Anemone tenuifolia pleno purpureo flore* Caccini, Clus. cur. post.

*Anemone sylvestris alba major*, C. B. *Anemone pannonica*, Dod. tertia, Matth. flore albo, Lob. Eyft. major alba, Tab.

*Anemone nemorosa flore majore*, C. B. \* *Wald-Anemone*. *Anemone quinta*, Dod. *Ranunculus candidus*, Trag. *nemorosus*, Lob. Tab. *nemorosus albus*, Eyft. *fylvarum*, Clus.

*Observandum*, præter recensitas hæcenus, plures adhuc in hortis nostris cultas fuisse *Anemonæ* species, quas singulas minutim prosequi, opus foret hominis nimium curiosi, cum teste Carolo Clusio lib. II. Hist. plant. cap. LVII. Natura hic non minus ludat, quam in Tulipis aut Iridibus. Inde factum, ut *Anemonis* quoq; peculiaria inde re nomina Galliarum atque Belgii hortulani tentarint, qualia sunt: *La courtisane*, *la regardé*, *la regata*, *la ranunculiere*, *Visconte*, *l'arbec*, *Sant Carl/Prinz Albert* & similia, in quibus tamen eruendis aut servandis multum laborare non placuit.

*Anethum hortense*, C. B. Dille. *Anethomi*, Matth. Dod. Lob. Tab. Trag. Fuchf. & cæterorum.

*Angelica sativa* C. B. Matth. Trag. Lon. *Angelice*. *Angelica*, Lob. Tab. major, Dod.

*Angelica sylvestris major*, C. B. \* *Wilde Angelice*

licke die groſſe. *Angelica ſylveſtris*, Lob. Tab. Matth. Dod. Trag. Fuchſ.

*Angelica ſylveſtris minor ſive erratica*, C. B. \* Wilde Angelicke die kleine. *Podagraria*, Lob. Herba Gerhardi, Dod. *Ægopodium*, Tab. *Angelicæ vitium*, Trag.

*Angelica aquatica*, C. B. \* Waſſer Angelicke. *Archangelica*, Lob. Dod. Cluſ.

*Angelica Americana baccifera*. Americaniſche Angelicke. Nota jam dudum fuit horto Lugdunenſi Batavo hoc nomine.

*Anguria Citrullus dicta*, C. B. Citrullen. *Anguria*, Matth. Dod. *Citrullus*, Tab. officinarum, Lob. *Cucumer vel cucumis citrullus*, Fuchſ.

*Aniſum herbarijs*, C. B. & reliquis. Aniß.

*Anonis ſpinosa flore purpureo*, C. B. \* Stachelichte Hauhechel / Stallkraut. *Anonis*, Dod. Fuchſ. *spinosa*, Eyſt. *Ononis*, Matth. Tab. hortendiſis, Lob. *Reſta bovis*, Trag.

*Anonis ſpinis carens purpurea*, C. B. \* Hauhechel ohne ſtacheln. *Anonis non ſpinosa*, Eyſt. *purpurea*, Tab. *mitior prima*, Cluſ.

*Anonis non ſpinosa flore luteo variegato*, C. B. Hauhechel mit gelbgeſtreiffen blumen. *Ononis flore luteo variegato mitis*, Eyſt.

*Antirrhinum majus alterum folio longiore*, C. B. Löwenmaul. *Antirrhinum*, Dod. Lob. Tab. ſecundum, Matth. *flore rubro & flore albo*, Eyſt. Adeſt utrumq;.

An-



*Antirrhinum arvense majus*, C. B. \* Wild Löwenmaul / Orant. *Antirrhinum primum*, Matth. minus, Tab. minimum, Lob. sylvestre, Dod. Eyst.

*Anthyllis maritima Chamaesyca similis*, C. B. Meer-Anthyllis. *Anthyllis Valentina*, Clus. Lob. ic. *Peplion* sive *Pephis*, Dod.

*Aparine vulgaris*, C. B. \* Klebefraut. *Aparine*, Matth. Dod. Lob. Fuch. Trag. Lon.

*Apium hortense*, seu *Petroselinum vulgo*, C. B. Petersilge. *Apium hortense*, Matth. Dod. Lob. sativum, Tab.

*Apium vel Petroselinum crispum*, C. B. Krause Petersilge. *Apium crispum vel multifolium*, Tab. *Apium hortense crispatum*, Lugd.

*Apium hortense latifolium*, C. B. Seleri. *Seleri Italicorum*, cujus radice in coena cum oleo sale & pipere frequenter utuntur. Figuram exhibet C. B. in Prodr. & Matth. cum brevi descriptione.

*Apium montanum folio ampliore*, C. B. \* Berg-Petersilge. *Oreoselinum*, Lob. Clus. primum, Tab. sive *Veelgutta*, Dod.

*Apium sylvestre lacteo succoturgens*, C. B. \* Alsnack. *Apium sylvestre*, Dod. *Thysselinum Plinii*, Lob. *Olsenichium*, Cord. hist. *Thalii*, cui etiam *Meum Silesiacum palustre*. In sylvis paludosis circa Arensfelde.

*Apium palustre*, & *Apium officinarum*, C. B. \*  
Wesf.



Wassermerck oder Eppich. *Apium palustre*, Matth. *Paludapium*, Tab. *Eleoselinum*, Dod. Lob

*Apium Macedonicum*, C. B. Macedonische Petersilge. *Petroselinum Macedonicum*, Matth. Lob, Dod. Tab.

*Aquilegia sylvestris*, C. B. \* Wilde Ackelen. *Aquileia*, Dod. *Aquilina*, Matth. Lob. Tab. Invenitur flore exiguo caeruleo.

*Aquilegia hortensis simplex*, C. B. Einfache garten Ackelen. *Aquilina alba*, Tab. rubra, Lob. ic. Adest flore albo, carneo, caeruleo, variegato.

*Aquilegia hortensis multiplex flore magno*, C. B. Gefülte Ackelen mit grossen blumen. *Aquilegia multiplici flore*, Dod. *Aquilina pleno flore*, Clus. *Multiplex*, Tab. Adest flore albo, carneo, caeruleo, violaceo, maculato.

*Aquilegia hortensis multiplici flore inverso*, C. B. Gefülte Ackelen mit umbgekehrten blumen. *Aquilina nona*, Tab. pleno inverso flore, Clus. hist. plenis multiplicibus floribus, Lob. ic. *Aquilegia caerulea inverso flore*, Eyst.

*Aquilegia flore roseo multiplici*, C. B. Gefülte Ackelen mit rosenförmigen blumen. *Aquilina pleno roseo flore*, Clus. *Aquilegia stellata flore purpureo*, Eyst. Adsunt hujus quoq; aliquot varietates.

Ari.

*Aristolochia longa vera*, C. B. Lange Oster-luzie. *Aristolochia longa*, Dod. Lob. ic. Clus. hist. & hisp.

*Aristolochia Clematidis recta*, C. B. Steigende Osterluzie. *Aristolochia longa*, Trag. Matth. *longa vulgaris*, Eyst. *Clematidis*, Lob. Tab. *Sarracennica*, Dod.

*Artemisia vulgaris major*, C. B. Großer Ben-fuß. *Artemisia*, Matth. *vulgaris*, Clus. *latifolia*, Dod. *mater herbarum*, Lob. *rubra & alba*, Tab. Adest utraque: rubra vero solet vulgo vocari Rothe Bucke.

*Artemisia vulgaris minor*, C. B. Kleiner Ben-fuß. *Artemisia minor*, Matth.

*Arum vulgare non maculatum*, C. B. Pfaffenpint ohn flecken / Deutsch Ingwer / Zehrwurz. *Arum*, Tab. *Latifolium*, Eyst. Fuch. *Ari primum* genus, Trag.

*Arum maculatum*, maculis candidis vel nigris, C. B. Fleckig Pfaffenpint. *Arum*, Matth. Eyst. *maculatum*, Tab. *Officinarum*, Lob. *nigricantibus lituris signatum*, Dod.

*Arum maximum Ægyptiacum*, quod vulgo *Colocasia*, C. B. *Colocasia*. *Arum Ægyptiacum*, Matth. Dod. Lob. *Colocasia*, Clus. Eyst.

*Arundo vulgaris, sive phragmites Dioscoridis*, C. B. \* Gemein Rohr. *Arundo palustris*, Matth. Tab. *Harundo phragmitis*, Dod. *vallatoria*, Lob.

*Arun-*

*Arundo sativa*, C.B. Spanisch Rohr. *Arundo*, Matth. domestica, Tab. Italica major, Cam. donax five cypria, Dod. donax sativa, Lob. Intus cava est: non farcta, qualis Indica illa, ex quibus scipiones parant.

*Arundo Indica latifolia*, C. B. & Tab. Blumen Rohr das rote. *Arundo Indica florida*, Lob. *Canna Indica*, Clus. hisp. *Indica rubra*, Eyst.

*Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato*, C. B. Blumenrohr das gelbe. *Canna Indica lutea rubris maculis punctata vel flore croceo guttato*, Eyst. Tertia est in Prodro-mo C. B.

*Asarum*, C.B. \* Haselwurz. *Asarum*, Matth. Dod. Tab. Eyst. *Asarum baccaris five baccatus*, Lob. ic. & Adv. Vulgago, Perpen-sa quibusdam.

*Asclepias flore albo*, C. B. \* Schwalbenwurz mit weissen blumen. *Asclepias*, Fuch. Lob. Tab. Vincetoxicum, Matth. Dod. Hirundinaria, Trag. Lon.

*Asclepias nigro flore*, C. B. Schwalbenwurz mit schwarzen blumen. *Asclepias flore nigro*, Tab. Clus. altera flore, nigro, Lob. Vincetoxici altera species, Dod.

*Asparagus sativa*, C. B. Garten Spargen. *Asparagus*, Matth. Trag. Fuch. altilis, Tab. hortensis, Dod. vulgaris, Lob. domesticus, Eyst.

*Asparagus sylvestris tenuissimo folio*, \* C. B. Wilde Spargen. *Asparagus sylvestris*, Matth. Caltor.

Aspe-

*Asperula five Rubeola montana odora*, C. B. \* Meserich/Waldmeister. *Asperula*, Lob. odorata, Dod. Clus. *Hepatica stellata*, Tab. *Matrisylva*, Trag.

*Asphodelus albus ramosus mas*, C. B. \* *Aphodil mit ästen*. *Asphodelus primus*, Clus. major albus, Eyst.

*Asphodelus albus non ramosus*, C. B. *Aphodil ohne äste*. *Asphodelus Matth.* Ruell. Lon. alter, Clus. albus, Dod. Tab. major albus, Lob. *Hastula regia*, Trag.

*Asphodelus luteus & flore & radice*, C. B. *Gelber Aphodil*. *Asphodelus luteus*, Dod. luteus minor, Lob. Tab. *Asphodelus foemina five luteus*, Cam. epit. *Hastula regia minor*, Cast.

*Asphodelus folijs fistulosis*, C. B. *Holblättiger Aphodil*. *Asphodelus minor*, Clus. Dod. *Phalangium Narbonense*, Tab. *Phalangium Cretæ Salonenfis*, Lob.

*Aster luteus angustifolius*, C. B. \* *Gelb Sternkraut*. *Aster Conyzoides Gesneri*, Lob.

*Aster atticus caeruleus vulgaris*, C. B. *Blau Sternkraut* das gemeine. *Aster atticus*, Matth. Fuchl. Lon. primus, Dod. minor flore caeruleo, Eyst. *Caeruleus Italicus five octavus*, Clus. *Italorum purpurascens*, Lob.

*Aster atticus caeruleus major*. *Blau Sternkraut* das grosse. *Aster atticus major flore caeruleo*, Eyst. c. B. ad præcedentem retulit, cum ta-

men

men differentia inter utrumque sit notabilis admodum. Illi nimirum folia acuta & ferrata, huic obtusa & non ferrata: illi flores parvi, huic magni.

*Astragalus villosus floribus globosis*, C. B. Wirbelkraut. *Astragalus tertius* vel *Monspeliensium*, Clus.

*Atriplex hortensis alba sive pallide virens*, C. B. Garten Melde. *Atriplex domestica*, Matth. hortensis, Fuch. sativa, Trag. sativa alba, Lob. ic. alba viridis, Lon.

*Atriplex hortensio rubra*, C. B. & Lon. Rote Garten Melde. *Atriplex hortensis*, Dod. rubra, Tab. sativa, Lob. sativa folio rubicundo, Trag.

*Atriplex mori fructu*, C. B. Erdbeer Spinat. *Atriplex sylv. baccifera*, Clus. An *Atriplex baccifera Indica*, Hort. Leydens. & *Spinachia fragifera*, G. Viesch. p. 116. Hort. Floridi.

*Atriplex sylvestris folio sinuato candicante*, C. B. \* Waldmelde mit weißglänzenden blettern. *Atriplex sylvestris*, Tab. sylvestris secunda, Matth. vulgator sinuata, Lob.

*Atriplex sylvestris altera*, C. B. \* Kleine Waldmelde. *Atriplex sylvestris*, Fuch. Dod. Lon. sylvestris prima, Matth. agrestis, Trag.

*Atriplex sylvestris latifolia*, C. B. \* Breite Waldmelde. *Atriplex sylvestris tertia*, Matth. sylvestris laceris laciniis, Lob. *Chenopodium primum*, Tab. *Pes anserimus*, Fuch. Dod. Lon.

*Atriplex fatida*, C. B. \* Stinckende Melde.



*Atriplex olida*, Lob. canina, Trag. Lon. Vulvaria, Tab. Garosmuun, Dod. Futuarix nomen extat apud Lobelium, qui Adversar. pag. 97. ridiculum affert experimentum.

*Avena vulgaris seu alba*, C.B. Weisser oder glatter Haber. Avena, Matth. Fuch. Lon. Tab. vesca, Lob.

*Avena nigrum*, C. B. Schwarzer Haber. Avena altera, Anguill. sylvestrior nigra, Cæsalp. Bromos, Amati. Hæc præcedente vilior.

*Azedaracus, sive arbor fraxini folio flore ceruleo*, C. B. Azedarach. Pseudosycomorus, Matth. Tab. Eyf. Zizypha candida Monspeliensium, Lob. Azedarac, Clus. Azedarach, Dod. An Azedaraeth, Avicennæ.

*Balsamina rotundifolia repens sive mas*, C. B. Balsamkraut mit runden blettern / Momordica. Balsamina, Matth. cucumerina punicea, Lob. Tab. Charantia, Dod. Momordica fructu luteo rubescente, & Balsamina mas fructu puniceo, Eyf.

*Balsamina fœmina*, C. B. Balsamkraut mit länglichen blettern. Balsamina, Dod. fœmina, Tab. Eyf. fœmina persicifolia, Lob. Balsamine altera, Trag. Matth.

*Balsamina lutea*, C. B. \* Wild Balsamkraut. Noli me tangere, Tab. Eyf. Persicaria filiquosa, Lob. Impatiens herba, Dod. Hujus siliquæ maturæ si leviter tangantur, semen projiciunt. Simile quid



quid observatur in Cucumere sylv. asinino dicto, in Sio erucz folio, in Lathyri majori. Herba viva non quidem semine motum simulat, sed folia tacta contrahit: unde à quibusdam itidem Noli me tangere dicitur. At cavendum, ne ex generali illa & promiscua nominis impositione non sequatur stirpium diversarum confusio.

*Barba caprae floribus oblongis*, C. B. \* Geißbart mit flattrenden blumen. Barba capri, Fuch. caprae, Eyst. caprina altera, Lon. Drymopogon primus, Tab. Ulmaria flore sparso, Hort. Patav.

*Barba caprae floribus compactis*, C. B. \* Geißbart mit geschlossenen blumen. Barba caprina prima, Lon. Barbicapra, Lob. Regina prati, Dod. Ulmaria, Clus. flore collecto, Hort. Pat.

*Bellis sylvestris caule folioso major*, C. B. \* Wilde Maßlieben die grosse. Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Eyst. Bellium majus, Tab.

*Bellis sylvestris media caule carens*, C. B. \* Wilde Maßlieben ohn stengel. Bellis media, Matth. Tab. Clus. major sylvestris, Lob.

*Bellis sylvestris minor*, C. B. \* Wilde Maßlieben die kleine/ Gänseblumen. Bellis minor, Matth. minor sylvestris, Fuch. Tab. pratensis minor, Adv. Primula veris, Brunf.

*Bellis Indica fruticescens*. Staudige Maß-  
 Ca lie

lieben aus Indien. *Bellis Indica maxima frutescens*, Hort. Patav. & Leydens.

*Bellis hortensis flore pleno*, eoque magno vel parvo, C. B. Garten Maßlieben mit gefüllten blumen groß und klein / weiß / roht / gesprengelt. *Bellis minor*, Matth. *minor hortensis*, Tab. *hortensis multiplici flore*, Lob. *minor flore multiplici albo & rubro*, Eyst.

*Bellis lutea folijs profundè incisis major*, C. B.\* Maßlieben mit ganz gelben blumen. *Bellis major lutea*, Trag. *Chrysanthemum*, Dod. *segetum*, Lob. *arvense*, Tab.

*Berberis dumetorum*, C. B. Berberis. *Berberis*, Lob. *vulgaris*, Clus. *Spina acida quarta*, Dod. *Oxyacantha*, Ruell. Trag. Fuch. Eyst. *Oxyacantha Galeni*, Tab. Crespinus, Matth.

*Beta communis sive viridis*, C. B. Gemeine Bete oder Weißkohl. *Beta agrestis*, Trag. Cum sequenti multum convenit: est tamen inter ceteras vilissima.

*Beta alba vel pallescens*, quæ Cicla Officinarum, C. B. Weißer Weißkohl. *Beta*, Tab. *candida*, Trag. Fuch. Dod. *alba*, Matth. Lob.

*Beta rubra vulgaris*, c. B. Rother Weißkohl. *Beta rubra*, Trag. Lon. Dod. *nigra*, Matth. Fuch. *rubra vulgatio*. Lob.

*Beta rubra radice rapæ*, c. B. Weißrüben / rohte Rüben. *Beta rubra*, Matth. Lob. *rubra Romana*, Dod. *Rapum rubrum*, Fuch. Hæc condita assis apponitur.

Be-

*Beta major folijs latissimis*, C. B. Grosse weisse Winter-Bete. Hæc hyemem perfert, sicut & antecedens Beta alba: viridis vero & rubra hyeme percunt.

*Betonica purpurea*, C. B. \* Braune Betonie. Betonica, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Clus.

*Betonica alba*, C. B. & Tab. Weisse Betonie. Betonica candida, Lob. Trag. albo flore, Dod. Clus.

*Betula*, C. B. \* Bircke. Betula, Matth. Dod. Lob. Tab. & cæteris. Succus ex caudice perforato bibitur verno tempore contra Calculum: materies foco aptissima.

*Bistorta major radice minus intorta*, C. B. \* Natterwurk. Bistorta, Matth. Dod. major, Tab. Clus. britannica, Lob. Serpentaria foemina & colubrina, Fuch.

*Bistorta major radice magis intorta*, C. B. Sehr gekrümmete Natterwurk. Bistorta, Lon. minor, Tab. major, Eyst. Serpentaria mas seu Bistorta, Fuch.

*Blattaria lutea folio longo laciniato*, C. B. Mottenkraut mit gelben blumen. Blattaria, Matth. Dod. Tab. Lob. flore luteo, Eyst.

*Blattaria alba*, C. B. Mottenkraut mit weissen blumen. Blattaria flore albo, Lob. ic. Eyst. Cam. Adest etiam flore violaceo.

*Blitum album majus*, C. B. Weisser Meher der

grosse. *Blitum album*, Matth. majus, Dod. majus album, Lob.

*Blitum album minus*, C. B. \* Weisser Meyer der kleine. *Blitum*, Fuch. Lon. minus, Dod. minus album, Adv.

*Blitum rubrum majus* C. B. \* Roter Meyer der grosse. *Blitum*, Tab. Lob. rubrum, Matth. rubens, Dod.

*Blitum rubrum minus*, C. B. \* Roter Meyer der kleine. *Blitum nigrum*, Frag. rubrum minus, Advers. rubrum supinum, Lob. ic.

*Botrys ambrosioides vulgaris*, C. B. Traubenfraut. *Botrys*, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst. Patientia Italicorum, Cam.

*Botrys ambrosioides Mexicana*. Mexicanisch Traubenfraut.

*Brassica alba vel viridis*, C. B. Gemein grün Kohl. *Brassica laevis*, Matth. prima, Tab. sativa, Dod. Lob.

*Brassica rubra*, C. B. Gemein Braun-oder Rott-Kohl. Tab. Lon. Adv.

*Brassica simbricata*, C. B. & Lob. Krauser Braun-Kohl. *Brassica crispa & nigra*, Dod. tophosa, Tab.

*Brassica capitata alba*, C. B. Weisser Kopfkohl. *Brassica capitata*, Matth. Tab. Lob. capitata albida, Dod.

*Brassica alba capite oblongo non penitus clauso*, C. B. Wersich oder Sapphorenkohl. *Brassica Sabauda*, Tab. *Sabauda hyberna*, Lob. ic.

Bras-

*Brassica capitata rubra*, C.B. Dod. Tab. Kohler  
oder Branner Kopffkohl.

*Brassica gongyloides*, C. B. Rübenkohl. *Brassica rapicaulis*, Cam. caule rapum gerens, Dod. Caulorapum, Tab. Lob. ob. *Rapa brassica peregrina*, Lob. ic. Rapum autem figura variat, & est vel rotundum, vel longum.

*Brassica cauliflora*, c. B. Dod. & Tab. Blumenkohl. *Brassica prolifera florida*, Tab. florida botrytis, Lob. Pompejana aut Cypria, Cam.

*Brassica campestris perfoliata flore albo*, c. B. \* Feldkohl mit weissenblumē. *Brassica capestris prima*, Clus. *sylvestris perfoliata*, Dod. *Perfoliata siliquosa*, Lob. Invenitur quoq; apud nos flore luteo.

*Brassica sylvestris folijs integris & hispidis*, C. B. \* Wilder Kohl. *Turritis*, Lob. vulgator, Clus. *Vaccaria*, Tab.

*Brunella major folio nō dissecto*. c. B. \* Gottheil. *Brunella*, Dod. Lob. *Prunella*, Tab. *Officinarum*, Eyst. *Consolida minor*, Matth.

*Brunella ceruleo magno flore*, C. B. \* Gottheil mit grossen blauen blumen. *Brunella cærulea magno flore*, Eyst. *Prunella prima & major*, Clus. *An Prunella tertia*, Tab.

*Bryonia alba baccis nigris*, C. B. \* Jaunrübe/wilde Rüben. *Bryonia nigra*, Dod. *Vitis alba baccis nigris*, Cast.

*Buglossum latifolium*, Bormio, C. B. Borrase. *Buglossum*, Matth. Fuch. *latifolium*,



Lob. vulgare, Clus. hisp. Borrage, Dod. floribus albis, Tab.

*Buglossum angustifolium majus*, C. B. Grosse Ochsenzunge. *Buglossum angustifolium*, Lob. vulgare, Matth. Tab. Italicum flore cæruleo, Eyst. *Anchusa Alcibiadion*, Dod.

*Buglossum sylvestre minus*, C. B. \* Wilde Ochsenzunge. *Buglossum sylvestre*, Dod. *Echium*, Fuch. *Buglossa sylvestris altera*, Lon.

*Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus*, C. B. \* Wilde Ochsenzunge mit liegenden Stengeln. *Alyssum Germanicum echiodes*, Lob. *Aparine major Plinii*, Tab.

*Bupthalmum Dioscoridis*, C. B. Ochsenauge. *Bupthalmum*, Matth. Lob. Tab. vulgare, Clus. *Chrysanthemum tenuifolium*, Eyst.

*Bursa pastoris major folio sinuato*, C. B. \* Taschenkraut das grosse. *Bursa pastoris*, Matth. Lob. *Pastoria bursa*, Dod. major, Tab.

*Bursa pastoris media*, C. B. \* Mittel Taschenkraut. *Bursa pastoris minor*, Tab.

*Bursa pastoris minor, folijs incisjs*, C. B. \* Klein Taschenkraut. *Pastoris bursa minor*, Dod. minima, Lob. ic.

*Bursa pastoris minor loculo oblongo*, C. B. \* Taschenkraut mit länglichen schötlein. *Paronychia vulgaris*, Dod. *alsinefolia*, Lob. *Alsine minima*, Tab.

*Buxus arborescens*, C. B. Hoher Buxbaum.

Bu-



*Buxus*, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. vulgaris, Trag.

*Buxus arborescens luteis foliorū marginibus.*  
Bergöldeter Burbaum.

*Buxus folijs rotundioribus*, C. B. Niedriger Burbaum. *Buxus humilis*, Dod. Chamæpyxos, Trag. Tab. Hac utimur plerumq; ad areolas hor-  
torum muniendas.

*Calamintha vulgaris*, vel *Officinarum Germanie*, C. B. \*Acfermünze/Bergmünze. *Calamintha*, Matth. montana, Dod. montana vulgaris, Tab Lob. Eyft.

*Calamintha pulegij odore*, sive *Nepeta*, C. B. \*Polenmünze/Nepete. *Calamintha altera*, Matth. arvensis secunda, Tab. *Pulegium sylvestre*, Dod.

*Calamintha magno flore*, C. B. Acfermünze mit grossen blumen. *Calamintha montana præstantior*, Lob. Tab. Eyft.

*Calamintha arvensis verticillata*, C. B. \*Gewirbelte Acfermünze. *Calamintha arvensis*, Tab. aquatica, Matth. aquatica Belgarum, Lob. *Nepeta agrestis*, Trag.

*Caltha vulgaris*, C. B. Einfache Ringelblume. *Caltha*, Matth. Fuch. Lon. *Calendula*, Trag. Dod. sativa, Tab. simplici flore, Eyft. *Chrysanthemum*, Lob. Adest flore citrino, & aureo.

*Caltha polyanthos major*, C. B. Gefülte Ringelblume. *Calendula lutea flore pleno*, Eyft. Adest flore citrino, & flore aureo.

Cal-

*Caltha prolifera majoribus floribus*, C. B. Ringelblume mit grossen nebenblümlein / oder kleinen. *Calendula prolifera*, Tab. Eyst. *Chrysanthemum proliferum*, Lob. ic.

*Caltha prolifera minoribus floribus*, C. B. Ringelblume mit kleinen nebenblümlein. *Calendula prolifera* 2. Tab.

*Caltha pumila*. Zwerg-Ringelblume. *Caltha arvensis*, C. B. & Tab. *Calendula sylvestris minor*, Cæs. circa Monspelium sponte, Gesn. In Italia itidem spontaneam notavimus, foliis acutis: apud nos vero in viretis ex semine propagari capit, quod in Hispania ante hos decem annos legit, & inter alia valde rara ex longinqua peregrinatione redux secum attulit V. Exc. & in plantarum cognitione veratissimus D. D. Christianus Menzelius, Sereniss. Electoris Brandenburg. Archiater, & amicus ob communicationem aliquot stirpium liberalem non sine gratiarum actione hic nominandus.

*Caltha palustris flore simplici*, C. B. \* Einfache Dotterblume. *Caltha palustris*, Dod. Lob. *Populago*, Tab. *Tussilago altera*, Matth. Reperitur apud nos flore majori plerumque, rarius minore.

*Caltha palustris flore pleno*, C. B. Clus. Volle Dotterblume. *Caltha palustris flore multiplici*, Eyst. *Populago multiflora*, Tab.

*Campanula minor rotundifolia vulgaris*, C. B.

**C. B.\*** Waldglöcklein. *Campanula minor rotundifolia*, Lob. *sylvestris minima*, Dod. *minor sylvestris flore cæruleo*, Eyst. *minor alpina rotundioribus imis foliis*, Clus. *Rapunculus sylvestris minor*, Tab.

*Campanula hortensis folio & flore oblongo*, C. B. Gartenglöcklein/Marjetten. *Viola Mariana*, Lob. Dod. Tab. Clus. *Medium*, Matth. Eyst. Adest flore argenteo, cæruleo, & purpureo.

*Campanula vulgaris folijs urticae*, vel major & asperior, C. B. Glöcklein mit nesselbletiern/rauhe Marjetten. *Cervicaria major*, Dod. Tab. *hortensis*, Eyst. *Trachelium sive Cervicaria*, Lob. *Trachelium vulgare*, Clus. Colitur flore cæruleo & albo in hortis, flore cæruleo tamen etiam sponte nascentem inter fagos reperi.

*Campanula pratensis flore conglomerato*, C. B.\* Wiesen-glöcklein mit zusammen gedrungeenen blumen. *Trachelium minus*, Lob. Clus. *Cervicaria minor*, Tab. *tertia sive minor*, Dod.

*Campanula Americana flore albo*. Milch-glöcklein aus America. Ex America non ita pridem fuit allata, nomine *Trachelii Americani* fl. albo. Radix fibrosa protrudit folia crassa atrovirentia, unciam longa, mediam lata, per marginem leviter serrata: sequitur caulis rotundus, atrovirens, satis crassus, erectus: ipsi ima parte folia frequentia nulla ordine adherent, media & suprema fere nudus est: pediculos tamen

ali-

aliquot emittit digitum pene longos, quorum extremitatibus singulis singuli insident flores oblongi, quintuplici plica striati, colore exterius luteo-pallidi. Successu temporis ipsi se pandunt prorsus, & candorem intus niveum ostentant: & quamvis, ut cæteræ Campanulæ, unico folio constent, quin tamen segmentis singuli distinguuntur. Stamina singulis insident terna crassiora, & quina tenuia. Cæterum planta est perennis, & hyeme apud nos reponenda.

*Cannabis sativa*, C.B. Zahmer Hanff. Cannabis, Matth. Lob. Tab. major, Trag. fœcunda, Dod. mas, quorundam.

*Cannabis erratica*, C.B. \* Wilder Hanff. Cannabis fœmina, Trag. sterilis, Dod. erratica paludosa sylvestris, Lob.

*Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo*, C.B. Wahre Cappern. Capparis, Matth. Trag. Lon. secunda, Tab. retuso folio, Lob.

*Capparis portulacæ folio*, C.B. Falsche Cappern. Capparis leguminosa, Lob. Tab. Capparis fabago, Dod. sylvestris sive fabaginea, Cam. ep.

*Carduus pratensis latifolius*, C.B. \* Breitblättrige Wiesendistel. Carduus pratensis, Trag. Lob. ic. Adv. Brassica pratensis, Lon.

*Carduus pratensis polycephalus*, C.B. \* Vielköpffige Wiesendistel. Carduus sextus, in Prodr.

*Carduus in avena proveniens*, C.B. \* Haberdistel. Carduus arvensis, Tab. avenarius, Thal. sylvestris in avena, Trag. Car-

*Carduus albis maculis notatus vulgaris*, C. B. \* Mariendistel. *Carduus Mariæ*, Trag. Fuch. Lon. Marianus, Tab. Leucographus, Dod. lacteus, Matth. Silybum, Lob.

*Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris*, C. B. Ballendistel. *Carduus sphærocephalus*, Dod. Tab. Eyf. Spina alba altera, Matth. Crocodilium, Lob. obs.

*Carduus lanceatus latifolius*, C. B. \* Speerdistel. *Carduus lanceolatus*, Tab.

*Carlina acaulos magno flore*, C. B. Eberwurz. *Carlina humilis*, Dod. sessili flore, Cam. herbariorum, Lob. obs. Chamæleon albus, Matth. Clus. Natale solum ipsi Alpes, imprimis Helvetiæ: semen jactum apud nos ægre provenit.

*Caryophyllata vulgaris*, C. B. \* Lob. Clus. Benediktenwurz die gemeine / Negleinwurz. *Caryophyllata*, Matth. Tab. Garyophyllata, Trag. Lon.

*Caryophyllata aquatica nutante flore*, C. B. \* Wasser Benediktenwurz. *Caryophyllata palustris*, Tab. montana, Eyf. montana prima, Clus. Septentrionalium rotundifolia papposo flore, Lob.

*Caryophyllus maximus ruber*, C. B. Gar grosse rote Nägelein. *Caryophyllus maximus plenus flore rnbro*, Eyf.

*Caryophyllus maximus variegatus*, C. B. Gar grosse gesprengelte Nägelein. *Caryophyllus* mul-



*multiplex maximus*, Tab. *multiplex maximus variegatus*, Eyf. *major ruber & albicans flore pleno*, Lob. ic. Adfunt varietates aliquot.

*Caryophyllus altilis major*, C. B. *Grosse Nägelein vielerley farben*. *Caryophyllus*, Lob. *domesticus*, Matth. *multiplex*, Tab. *flore majore*, Eyf. *Betonica altilis*, Fuch. Adfunt varietates multæ.

*Caryophyllus altilis major flore pleno proliifero*. *Grosse Nägelein* / da eine aus der ander wächst: *Schwanger oder Mutter-Nägelein*. Ita hunc appellare visum est, cujus flores singuli singulos alios, tanquam matres filias includunt, & tandem quoque protrudunt. Notavi ejus quatuor varietates. Est enim albus, ruber, subruber, punctatus. Numerus foliorum in matribus ad septuaginta, ad viginti in filiabus solet ascendere.

*Caryophyllus altilis medius*, C. B. *Mittel Nägelein unterschiedlicher farben*. Adest cum aliquot varietatibus.

*Caryophyllus pleno flore minor*, C. B. *Kleine Nägelein unterschiedlicher farben*. *Caryophyllus hortorum multiplex minor*, Lob. ic. Etiam hujus nonnullæ varietates.

*Caryophyllus hortensis simplex flore majore*, C. B. *Einfache Nägelein mit grossen Blumen vielerley farben*. *Caryophyllus sylvestris major vulgarior*, Lob. ic. Adest albus, carneus, miniatus, varicolor.



*Caryophyllus simplex flore minore pallide rubente*, C. B. Einfache Nägelein mit kleinen blaß-roten blumen. *Caryophyllus hortulanus*, Tab. sylvestris tertius flore pallido suaverubente, Lob. ic.

*Caryophyllus simplex supinus angustifolius*, C. B. Jungfer-Nägelein. *Caryophyllus virgineus*, Tab. Adest colore albo.

*Caryophyllus barbatus hortensis latifolius*, C. B. Bart Nägelein mit breiten blettern. *Caryophyllus Carthusianorum primus*, Tab. Armeria altera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ic. Flos Armerius albus, ruber, variegatus, Eyft.

*Caryophyllus barbatus hortensis, angustifolius*, C. B. Bart Nägelein mit schmallen blettern. *Caryophyllus Carthusianorum secundus*, Tab. Armerius flos alter, Dod. Armeria altera suaverubente flore, Lob. ic.

*Hactenus* Caryophylli hortenses, quibus propria nomina hortulani Belgæ atque Galli imposuerunt. Ea Catalogus Groeningensis ordine elementorum recensuit: Joan: Georgius Krause Augustanus juxta colores digessit: & Exc. D. Leonhardus Ursinus Prof. Lipsiensis Publ. magnitudinem quoq; pictis sex circulis exprimere tentavit: id quod institutum & ad Anemonas, Ranunculos, Narcissos, forte etiam Tulipas, & alias stirpes floreas extendi utiliter posset. Interca autem

dum

dum aliquis digerendi hunc laborem plenius  
absolverit, primaria tantum nomina hic subji-  
cimus.

Achat Oriental.

Admiral Colbinger.

Admiral Coman.

Admiral von Seeland.

Admiral Suche.

Admiral Tromp.

Alexander Magnus.

Altesse.

Amarnylle.

Amelia.

Anglese.

Argenis.

Belle belle.

Bella Catharina.

Belle Clorinde.

Bella Helena.

Belle Madame.

Bella Margarita.

Belle Princesse.

Bella Susanna.

Belmüller.

Belresteau.

Bullion.

Buchbinder.

Cardinal.

Cedonulli.

Clarabella.

Columbin.

Constanzer Mars.

Concordia.

Cölnische.

Demelie.

Don Cordua.

Diana.

Englische Flagge.

Englische Morlyon.

Englische Rose.

Flämische Magd.

Florabella.

Franze Merveille.

General von Holland.

General Wigans.

Generalissimus.

Glorieuse.

Graff Floris.

Graff von Holland.

Graff von Mansfeld.

Grotius.

Güldenstück.

Hannibal.

Hautvester.

Hercules.

Hesse/

Hesse / Großer Hesse.	Massawer.
Holländer.	Neue Jama.
Hugenot.	Neuer Signor.
Jaspis.	Noblesse.
Jacobs-blum.	Orange von Clarmont.
Imperial.	Orange geflammt.
Incarnat.	Orange pantir.
Isabella.	Orange present.
Jubel von Holland.	Pallas.
Jupiter.	Patientia.
Kago.	Perle.
Keyser Cron.	Perlenfarbe.
Koch.	Pers Amelia.
König.	Petit Jean.
Königin.	Philoclea.
Kronbeck.	Piccolomini.
Latrepouze.	Prinz von Conde.
Madame Leonora.	Prinzen-jagt.
Leopoldus.	Princessin.
Lusthoff von Holland.	Purpur Wigans.
Lüttiger.	Puschke Rose.
Mahomet.	Rose.
Marcus Aurelius.	Rosabella.
Mazariini.	Rosa major.
Melander.	Rosalina.
Melville du monde.	Samtroht.
Morlyon vom Haag.	Sarenthaler.
Morlyon Nacre.	Scholler.
Müllerin.	Schöner Absolon.

Schwarz Imperial.	Ulmer Königin.
Scipio Africanus.	Walthen.
Sol.	Weisse Früzeitige.
Steinheimer.	Weisser Graff.
Sylvia.	Weisser Hirsch.
Trauriger Mars.	Weisser König.
Türkischer Kenser.	Weisser Kabe.
Türkische Kenserin.	Weisse Rose.
Venetianer.	Weisser Schwan.
Venus.	Wetterhan.
Viceroy.	Wittenberger.
Victoria.	Zarnetti.

*Caryophyllus sylvestris prolifer*, C. B. \* & Eyst. Feldnägelein mit nebenblumen. *Caryophyllus sylvestris minimus*, Tab. *Armeria prolifera*, Lob.

*Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius*, C. B. \* Feldnägelein mit breiten blettern. *Caryophyllus montanus primus*, Tab. minor sylvestris fl. simplici, & fl. pleno, Eyst. *Armerius flos primus*, Dod.

*Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius*, C. B. \* Feldnägelein mit schmallen blettern. *Caryophyllus montanus albus*, Tab.

*Caryophyllus sylvestris humilis flore unico*, C. B. \* Feldnägelein mit einer einzeln blume. *Caryophyllus repens humilis minimus vulgarissimus rubellus*, Lob. ic. sylvestris primus, Clus. *Armerius flos tertius*, Dod.



*Caryophyllus flore tenuissime dissecto*, C. B. \*  
 Federnägelein. *Caryophyllus plumarins albus*,  
 Tab. sylvestris flore albo picto, Eyst. Superba,  
 Trag. *Caryophyllæus minor*, Dod. Provenit flore  
 albo, carneo, & purpureo.

*Caryophyllus sylvestris alter flore laciniato odonatissimo*, C. B. \* Wolriechende Federnägelein. *Caryophyllus sextus*, Clus. minor alter,  
 Dod. sylvestris flore laciniato carneo, Eyst. Superba Austriaca, Lob. ic.

*Caryophyllus pratensis flore laciniato straplici*, C. B. \* Ruckucks Nägelein. *Caryophyllus pratensis*, Tab. Armerius sylvestris, Dod. Flos cuculi, Lon.

*Caryophyllus pratensis flore pleno*, C. B. Gesülte Ruckucks-Nägelein. *Odontitis Plinii*, Eyst. flore pleno, Clus. Cam.

*Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore*, C. B. \* Rauhe Hartnägelein. *Caryophyllus holosteus*, Lob. ic. *Holostium caryophyllæum*, Tab.

*Caryophyllus arvensis glaber flore majore*, C. B. \* Glatte Hartnägelein mit grosse blumen. *Holostium Ruellii*, Lob. *Gramen leucanthemon*, Dod. floridum majus, Tab.

*Caryophyllus arvensis glaber flore minore*, C. B. \* Glatte Hartnägelein mit kleinen blumen. *Holostii Ruellii diversitas*, Lob. ic. *Gramen floridum minus*, Tab.

*Caryophyllus montanus major flore globo-*



*fo, C. B.* \* Grosse Bergnägelein mit kuglicher blume. *Caryophyllus montanus*, Lob. *Armerium montanus tenuifolius major*, Clus. *Gramen polyanthemum majus*, Dod. *marinum majus*, Tab.

*Caryophyllus montanus minor*, C. B. \* Kleine Bergnägelein. *Caryophyllus marinus minimus*, Lob. *Armerius montanus tenuifolius minor*, Clus. *Gramen polyanthemum minus*, Dod. *marinum minus*, Tab.

*Castanea sativa*, C. B. Castanien. *Castanea domestica*, Matth. In eadem arbore crescunt tum grandiores illæ, quas Maronas Itali vocant: tum minores. Seliguntur verò postea à venditoribus, ut majores majore quoque pretio distrahere possint.

*Castanea folio multifido*, C. B. Roß-Castanien. *Castanea equina*, Matth. Dod. Lob. Clus. Tab.

*Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu*, C. B. \* Ackerflette. *Caucalis flore minuto*, Cam.

*Caucalis semine aspero flosculis rubentibus*, C. B. \* Ackerflette mit rothen blumen. Figuram exhibet in Prodr. *Daucoides minor*, Thal.

*Centurium majus folio in lacinias plures diviso*, C. B. Groß Tausendgülden-fraut. *Centaurium majus*, Lon. Lob. Tab. magnnm, Matth. Dod. *Rhapontica*, quæ hodie *Centaurea major*, Trag.

*Centaurium minus*, C. B. \* Klein Tausend-  
gülden-kraut / Erdgalle. *Centaureum minus*,  
Matth. Dod. Tab. parvum, Lob.

*Cepa vulgaris*, C. B. Zwiebel. *Cepa*, Matth.  
Fuch. Trag. rotunda, Dod. alba & rubra, Tab.  
Lon. Cepe, Lob.

*Cepa fissilis*, C. B. & Matth. Winter-Zwiebeln.  
Circa festum Jacobi semen est maturum, & feri de-  
bet sequenti mense Septembri, ut verno tempore  
culinæ mature serviant. Fissilis dicitur, quoniam  
bulbus parte superiore findi solet.

*Cepa sterilis*, C. B. Trag. Winter-Zwiebeln  
ohn saamen. *Cepa ascalonica*, Matth. i.e. Per bul-  
bos duntaxat propagatur, cum apud nos semen  
non producat. Autumno bulbi terræ mandantur,  
pro usu in ver proximū: circa festum Jacobi bulbi  
iterum eximuntur & siccantur per mensem, ut de-  
nuo terræ committi possint.

*Cepæa*, C. B. Matth. Lob. Tab. Clus. Cepee.  
Adest flosculis albis.

*Cerasa acida rubra*. Röhre saure Kirschen.  
*Cerasa sativa rotunda rubra & acida*, C. B. *Cerasus*  
*acida*, Matth. Tab. tertia, Dod. *Cerasia*, Lob. aci-  
da & vulgaris, Trag.

*Cerasa acida nigricantia*. Schwarze saure  
Kirschen. *Cerasa acidissima sanguineo succo*,  
C. B. austera, Matth. *Cerasiorum primum genus*,  
Trag. Tardius cæteris fere omnibus maturescunt,  
& per maturitatem fiunt obscure rubicunda, Ca-

stantienbraun. Confractis nucleis usurpantur pro conficiendo vino cerasino.

*Cerasa praeocia.* Manfirschen / quoniam prima omnium mense Majo maturescunt. Rubicunda sunt, danturque in hoc genere etiam duplo maiora, quæ propterea doppelte Manfirschen appellantur.

*Cerasa rhenana.* Rheinische Kirschen / & quidem colore tripliciter variante: tota rubra, ganz roht: tota flava, ganz gelb: rubra & media parte flava, halb roht halb, gelb.

*Cerasa fertilis Batava.* Woltragende Kirschen aus Holland. Hæ arbores alte non exsurgunt, sed copiosissimos fructus quotannis ferunt: fructus puniceus, lichtroht / & satis magnus est.

*Cerasa vitrea.* Glas Kirschen. Cerasa carne tenera & aquosa, c. r. aquea, Matth. Tab.

*Cerasa albicantia.* Eyer-Kirschen / a colore prorsus albido. Cerasa alb. dulcia, c. r. Cerasia dulcia, Trag.

*Cerasa Hispanica.* Spanische Kirschen. Cerasa lativa maiora, C. B. Cerasia Hispanica, Lob. Tab. In hoc genere alia sunt rotunda, Runde spanische Kirschen / quæ obscure rubent aut nigricant: alia angulosa, Eckigte spanische Kirschen / quæ parte media rubent, altera flavescent. Illorum quædam, etiam evulso pediculo, binas drachmas pondere multum superant.

*Cerasa palliata.* Mantel Kirschen. Nomen acceperunt, quod fructus majori ex parte non appareant, sed sub foliis, quasi palliolis tecta delitescant. Color ipsis rubicundus sive brunnus, braunroht: ossicula vero exigua.

*Cerasa racemosa.* Traubel-Kirschen / viel an einem stiel. *Cerasus hortensis racemosa*, c. B. *racemosa*, Matth. uno pediculo plura, Lob. Tab. *Cerasi* quintum genus, Dod.

*Cerasa cordata.* Herz Kirschen / quoniam cordis figuram referunt. *Cerasa crassa* carne dura, c. B. *Cerasus altera*, Dod. *Cerasa maroba & duracina*, Matth. *Cerasia Pliniana*, Tab. Horum alia *nigricant*, Schwarze Herzkirschen: alia *rubent*, sed intermixta flavedine, Rohle Herzkirschen. In utrisq; , sicut & in cæteris datur quædam ratione magnitudinis differentia. Maxima pendent ~~maxima~~ *sicilianum*.

*Cerasa volucrum.* Vogel-Kirschen. *Cerasus* major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente, c. B. prior, Dod. *Cerasia nigra*, Tab. Fructus est exiguus, & dulcis, colore duplex. Alia enim sunt *Cerasa volucrum rubra*, Rohle Vogel-Kirschen: alia *nigra*, Schwarze Vogelkirschen: ex quibus Aqua cerasorum nigrorum in Officinis parari solet.

*Cerasus hortensis pleno flore*, c. B. Kirschen mit gefülter blüht. *Cerasus vulgaris duplici flore*, Lob. multiflora prima, Tab. flore pleno, Eyst.



*Cerasus folio laurino*, C. B. Lorbeer-Kirschen.  
*Cerasus Trapezuntina*, Bellon. *Laurocerasus*, Clus.

*Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro*, C. B. Heckfirschen. *Periclymenum rectum*, Tab. rectum primum, Clus. *Allobrogum*, Lob. *Xylosteum*, Dod. floribus albis vulgatus, Eyst.

*Cerinthæ seu Cynoglossum montanum majus*, C. B. *Cerinthæ*. *Cerinthæ major*, Lob. Tab. Clus. *Maru herba*, Dod.

*Cherophyllum sativum*, C. B. Garten-Kerfel. *Cherifolium*, Dod. sativum. *Trag. Cerefolium*, Matth. Lob. Tab. *Gingidium*, Fuch.

*Cherophyllum sylvestre*, C. B. \* Wild Kerfel. *Cerefolium sylvestre*, Tab. *Daucus sepiarius*, Ges. de coll.

*Chamaedrys major repens*, C. B. \* & Dod. Großer Gamander oder Bathengel. *Chamaedrys*, Lob. major prima & secunda, Tab. *Trissago seu Chamaedrys*, Matth.

*Chamaedrys minor repens*, C. B. Kleiner Gamander. *Chamaedrys*, Tab. Eyst. vera, *Trag. major*, Lob. ic. repens minor, Dod. vulgaris, Clus.

*Chamaedrys spuria major angustifolia*, C. B. \* Falsch Gamander der grosse. *Chamaedrys sylvestris*, Dod. *Teucrium primum*, Matth. *Teucrii quarti species tertia*, Clus. *Veronica supina facie Teucrii pratensis*, Lob. ic.

*Chamaedrys spuria minor rotundifolia*, C. B. \* Falsch Gamander der kleine. *Chamaedrys sylvestris*,  
 itris,



stris, Clus. Teucrium pratense, Advers. tertium minus, Tab. spurium chamædryoides, Lob. ic.

*Chamamelum vulgare*, C. B. \* Gemeine Kamillen. Chamamelum Tab. vulgare, Dod. Leucanthemum, Diosc. Fuch. Anthemis, Matth. Anthemis vulgatiores sive Chamæmilla, Lob.

*Chamamelum nobile seu odoratus*, C. B. Römische Kamillen. Chamamelum Romanum, Tab. Romanum flore simplici, Eyf. Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob. Leucanthemum odoratum, Dod.

*Chamamelum nobile flore multiplici*, Römische Kamillen mit vollen blumen. Chamamelum Romanum flore multiplici, Tab. Leucanthemum niveum Anglorum flore simplici, Lob. ic.

*Chamamelum inodorum*, C. B. \* Karohn geruch. Cotula, Tab. non foetida, Chap. inodora, Adv. Camomilla fatua & quarta, Trag.

*Chamamelum foetidum*, C. B. \* Stinkende Kamillen. Cotula foetida, Lob. ic. Eyf. Lor. alba, Dod. Parthenium, Tab. Fuch. Chamomilla secunda, Trag.

*Chamaepitys lutea vulgaris, sive folio trifido*, C. B. Schlagkraut. Chamaepitys prima, Matth. Dod. major, Tab. Eyf. Ajuga sive Chamaepitymas Dioscoridis, Lob.

*Chamelea tricoccus*, C. B. Seidelbast / Ziland. Chamelæa, Matth. Dod. tricoccus, Lob. Mezerion Arabum tricoccus, Tab.

Chamaepitys

*Chelidonium majus vulgare*, C. B. \* Groß-Schellkraut. *Chelidonium majus*, Matth. Dod. Lob. Tab. vulgare. Clus.

*Chelidonia rotundifolia minor*, c. B. \* Klein-Schellkraut / Schorbucks-kraut. *Chelidonium minus*, Matth. Dod. Tab. Lob. Eyst.

*Chondrilla juncea viscosa arvensis*, C. B. \* Chondrille. *Chondrilla juncea*, Tab. viminalibus virgis, Clus. viminea viscosa vinearum, Lob. ic. Cichorium sylvestre luteum, Dod. Virgis prædita est plerumque sesquicubitalibus.

*Chondrilla verrucaria fol. intybaceis viridibus*, C. B. Warzen Chondrille. *Cichorium verrucarium*, Matth. Zacintha, Gefn.

*Chondrilla folijs laciniatis serratis purpurascente flore*, C. B. Crupine. *Chondrilla Hispanica Narbonensis*, Tab. rara purpurante flore semine nitido deciduo, Lob. ic. Crupina, vulgi.

*Chondrilla purpurea foetida*, C. B. Stinkende Chondrille. *Chondrilla rubra foetida*, Eyst.

*Chrysanthemum folijs matricariae*, C. B. Ganz gelbe Goldblume. *Chrysanthemum*, Matth. & Chalcitis, Tab. Tinctorius flos quartus, Trag.

*Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo*, C. B. Halb gelbe und halb weiße Goldblume. *Chrysanthemum creticum mixtum*, Eyst. *Buphthalmi altera species*, Gef. hor.

*Cicer sativum*, C. B. Kichererbsen. *Cicer*, Matth. Tab.

Tab. fativum, Lob. arietinum, Dod. rubrum & album, Lon.

*Cichorium fativum*, C. B. Garten Meerwart / Hindlauff. *cichorium domesticum*, Matth. fativū caruleum, Lob. ic. latioris folii, Dod. Seris fativa, Lob. Adest flore caruleo, & flore albo.

*Cichorium sylvestre sive Officinarium*, c. B. \* Wild Meerwart. *cichorium*, Tab. sylvestre, Dod. *cichorea sylvestris*, Matth. Seris sylvestris, Lob.

*Cicuta major*, c. B. \* Großer Schirling. *Cicuta*, Matth. Dod. Lob. Tab. *cicutaria vulgaris*, clus.

*Cicuta minor petroselino similis* C. B. \* Petersilgen-Schirling / Hundspetersilge. *Cicuta minor*, Cam. *Cicutaria fatua*, Lob. *Petroselinum caninum* Tab. *Petroselini vitium*, Trag.

*Cicutaria latifolia foetida*, c. B. \* Schirlingkraut mit breiten blettern. *Cicutaria foetida*, Tab. *latifolia foetidissima*, Lob. *Seseli Peloponense*, Matth.

*Cicutaria palustris tenuifolia*, C. B. \* Schirlingkraut mit kleinen blettern. *Cicutaria palustris*, Lob. Tab. *Phellandrium*, Dod. *Ligusticum sylvestre*, Trag.

*Cinara hortensis folijs non aculeatis*, C. B. Gemeine Artschocken. *cinara*, Eyst. *carduus non aculeatus*, Matth. *Scolymus non aculeatus*, Tab.

*Cinara maxima Anglica*, c. B. & Lob. ic. Groſſe Engliſche oder Kron-*Artschocken*. *Scolymus major*, Tab. *Scolymus* ſeu *Cinara maxima*, Eyſt.

*Cinara hortensis aculeata*, c. B. Stacheliche *Artschocken*. *Scolymus*, Frag. Lob. *Dioscoridis*, Cluſ. *Carduus hortensis foliis spinosis*, Gaſt.

*Cinara spinosa cujus pediculi eſtantur*, c. B. Winter *Artschocken* / *Cardonem*. *Carduus aculeatus*, Matth. *Scolymus aculeatus*, Tab. Quemadmodum tres antecedentes ob capita coluntur, quæ prius, quam floris purpura prorumpat, in uſum culinarium præſcinduntur: ita in hac foliorum pediculi terra obruantur, ut per hyemem ſtolones teneri cum ſale & pipere in cibos veniant.

*Cistus mas folio oblongo incano*, c. B. *Cistus* mit länglichen grauen blettern. *Cistus*, Dod. *mas*, Lob. *mas primus*, Cluſ. *mas latifolius*, Tab.

*Cistus ſœmiva folio Salviae*, c. B. *Cistus* mit Salbenblettern. *Cistus ſœmina*, Matth. Dod. Lob. Cluſ. Tab.

*Chamæcistus vulgaris flore luteo*, c. B. \*Zwerg-*Cistus*. *Chamæcistus primus*, Cluſ. *Flos ſolis*, Dod. *Helianthemum*, Lob. Eyſt. *Germanicum ſecundum*, Tab. *Panax chironium ſive Flos ſolis*, Matth.

*Cistus ledon folijs roriſmarini ferrugineis*, c. B. \*Poſt. *Ledum Sileſiacum*, Cluſ. *roriſmarini folio*, Tab. *foliis roriſmarini alterum*, Lob. *Rosmarinum ſylveſtre*, Matth. *Chamæpeuce*,  
cord.



Cord. Ad inebriandum fortius a quibusdam cerevisiæ incoquitur, sed fraudulenter, nec absque noxa potantium.

*Clematis daphnoides minor*, C. B. \* Kleiner Singrün. clematis, Matth. daphnoides, Dod. Lob. Tab. Clus. Pervinca, Trag. Flore est caruleo: in Horto etiam habetur flore candido.

*Clematis daphnoides major*, c. B. Dod. Großer Singrün. clematis sive Pervinca major, Lob. daphnoides latifolia, Clus. daphnoides major, Eyst.

*Clematis daphnoides flore pleno*, c. B. Singrün mit gefüllten Blumen. clematis altera flore pleno, Clus. daphnoides flore purpureo pleno, Eyst. Daphnoides polyflora, Lob.

*Clematitis sylvestris latifolia*, c. B. Breite Waldrebe. clematis tertia, Matth. Vitalba, Dod. Vitis nigra secunda, Tab. Viorna vulgi, Lob. Eyst. Atragene Theophrasti, Clus.

*Clematitis sive Flammula repens*, c. B. Kriechende Waldrebe mit weissen blumen. clematis urens, Tab. altera urens, Lob. Flammula, Dod. Viticella, Cæsalp.

*Clematitis sive Flammula erecta*, c. B. Aufrechte Waldrebe. Flammula, Matth. Tab. Clus. erecta, Eyst. altera, Dod. altera surrecta, Lob.

*Clematitis carulea erecta*, c. B. Aufrechte Waldrebe mit blauen blumen. Clematis carulea secunda, Tab. carulea Pannonica, Eyst. secunda,



da, Clus. pan. altera minor longifolia, Clymenum quorundam, Lob.

*Clematitis carulea vel purpurea repens*, C. B. Kriechende Waldrebe mit blauen oder purpur-blumen. Clematis altera, Matth. Dod. Clus. peregrina carulea & purpurea, Lob. Tab. Eyst.

*Clematitis trifolia flore roseo clavato*, C. B. Passion-blume. Flos passionis, vulgi & du Bry. Granadilla, Monard. & Ferrar. Maracot, Indorum.

*Clematitis Indica flore phœniceo*. Indische Waldrebe. Gelleminum Indicum maximum flore phœniceo, Ferrar. Clematis Indica Contareni, Hort. Patav. Prædita est foliis, quæ forma quam proxime ad folia Azedaraci accedunt.

*Clinopodium Origano simile*, C. B. \* Wirbeldost / oder Bettfuß. Clinopodium, Tab. vulgare, Matth. Acinos, Lob. Origanum quartum, Trag.

*Clinopodium arvense Ocimi facie*, C. B. \* Falscher Bettfuß. Clinopodium vulgare, Lob. Clus. alterum Matthioli, Tab. Pseudoclinopodium, Matth. Ocimum sylvestre sive Acinos, Dod.

*Cnicus sativus, sive Carthamum Officinarium*, C. B. Wilder Safran. cnieus, Matth. Dod. sativus, Eyst. Lob. vulgaris, Clus.

*Cnicus sylvestris hirsutior sive carduus benedictus*, C. B. Cardobenedicten. Carduus benedictus,

Clus, Matth. Lob. Tab. Eyf. Trag. *Carduus benedictus* & *Atractylis altera species*, Dod.

*Cochlearia folio subrotundo*, C. B. Löffelkraut.

*Cochlearia*, Dod. Matth. Batava, Lob.

*Cochlearia minor erecta*, C. B. Klein Löffelkraut. Semen ex Dania missum, nomine *Cochlearia Danica*.

*Colchicum commune*, C. B. Gemeine Zeitlosen.

*Colchicum*, Matth. Dod. vulgare, Eyf. masculinum & foemininum, Tab. *Colchicum* sive stragulatorium & *Ephemerum crocifolium*, Lob.

*Colchicum album strijs variegatum*, C. B.

Weisse Zeitlosen mit streiffen. *Colchicum mixtum autumnale*, Eyf.

*Colchicum latifolium variegatum*, C. B. Zeitlosen mit breiten blettern. C. B. *Colchicum quartum* sive *latifolium*, Clus. *Byzantinum polyanthos Frittlariae facie autumnale*, Eyf.

*Colchicum luteum majus*, C. B. Gelbe Zeitlosen.

*Colchicu luteu*, Lob. Tab. *Narciss. autumnalis major*, Dod. Clus. *autumnalis flore luteo*, Eyf.

*Colchici multiflori, pleniflori, verni*, aliquot spec.

*Colutea vesicaria*, C. B. & Eyf. Linsenbaum/ Deutsche Senßbletter. *Colutea*, Matth. Dod. Fuch. *Colutea Theophrasti*, Lob. Tab. Clus.

*Colutea siliquosa sive scorpioides major*, C. B.

Linsenbaum mit frummen schönstein. *Colutea scorpioides*, Lob. Cam. prima, Tab. prima elatior, Clus.

*Consolida media pratensis carulea*, C. B.\*

Gül.

Gulden Günsel mit blawen blumen. *Consolida media*, Matth. Tab. Eyft. Bugula, Dod. Clus. Bugula & Prunella quibusdam, Lob.

*Consolida media pratensis purpurea*, C. B.\*

Gulden Günsel mit purpur-blumen. *Consolida media purpurea*, Fuch. *media secunda*, Tab. Bugula *carnei coloris flore*, Clus.

*Consolida regalis hortensis flore majore & simplici*, c. B. Einfacher Kitterspor mit grossen blumen. *Consolida regalis sativa*, Tab. *regia sive alcaris flos recentiorum*, Lob. *Flos regius*, Dod. *Delphinium elatius flore cæruleo*, Clus. Adsunt aliquot coloris varietates.

*Consolida regalis hortensis flore minore*, c. B. Einfacher Kitterspor mit kleinen blumen. *Consolida regalis flore rubro*, Lob. ic. *regalis sativa flore rubro*, Tab. *Flos regius flore purpureo*, Dod. *Delphinium elatius simplici flore*, Clus.

*Consolida regalis flore majore & multiplici*, c. B. Gefülter Kitterspor. *Consolida regalis flore pleno*, Cam. *Delphinium elatius pleno flore*, Clus. Adsunt hujus quoque aliquot varietates.

*Consolida regalis arvensis*, C. B.\* & Tab. Wild Kitterspor. *Flos regius secundus vel sylvestris*, Dod. *Segetum consolida regia strigosior tota*, Lob. *Delphinium vulgare*, Clus.

*Convolvulus major albus*, C. B.\* Grosse Winde. *Convolvulus major flore albo*, Eyft. *Volubilis major*, Tab. *Smilax lævis*, Matth. *Smilax lævis major*, Dod. Lob.

Con-

*Convolvulus minor arvensis*, C. B. \*

Kleine Winde. *Convolvulus minor*, Clus. *minor purpureus*, Lob. *Volubilis arvensis*, Tab. *Smilax lavis minor*, Dod. *Helxine cissampelos*, Marth. Adest flore candido, & flore roseo.

*Convolvulus minor semine triangulo*, C. B. \*

Kleine Winde mit dreneckigen Samen. *Convolvulus niger*, Dod. *Volubilis nigra*, Tab. *Helxine cissampelos altera atriplicis effigie*, Lob.

*Convolvulus cæruleus hederaceo anguloso folio*, C. B. Himmelblawe Winde. *Convolvulus cæruleus*, Tab. *asureus seu cæruleus hederaceus*, Lob. *peregrinus vel Flos noctis*, Gesner. quoniam flores accedente sole constringuntur. *Campana cærulea*, Dod. *Nil Arabum*, Eyst.

*Convolvulus purpureus folio subrotundo*, C. B. Purpurblawe Winde. *Convolvulus Indicus flore violaceo*, Eyst. *Convolvuli species alia*, quæ ad *Nil Avicennæ* referri potest, Dod.

*Convolvulus peregrinus cæruleus folio oblongo*, C. B. Himmelblawe Winde mit länglichen blättern. *Convolvulus secundus*, in Prodr. *Campanula incognita cæruleo alba*, Bry. *Convolvulus non-convolvulus*, quoniam cauliculos non admodum convolvit, sed potius vinciri amat.

*Conyza major vulgaris*, C. B. Gemeine Dürrenwurz. *Conyza major*, Matth. *major altera*, Dod. *Baccharis*, Tab. *Baccharis Monspeliensium*, Lob.

*E* *Co-*



*Conyza major Dioscoridis, C.B.\** Grosse Dürrenwurz. *Conyza major, Dod. Cam. major vera, Lob. ic. Conyza mas, Theophr.*

*Conyza minor Dioscoridis, C.B.\** Kleine Dürrenwurz / Veruffkraut. *Conyza minor, Clus. minor vera, Lob. ic. minor altera, Dod. Conyza fœmina, Theophr.*

*Conyza media Asteris flore luteo, C.B.\** Mittel Dürrenwurz. *Conyza. Tab. tertia, Diosc. media, Matth. Dod. Lob. Eyst. media vulgaris, Clus.*

*Corchorus, C.B. Melochia / Egyptisch Mueßkraut.* *Corcoros Plinii, Lob. qui florentem pingit. Corcorus sive Melochia, Cam. qui barbulas foliorum & semen exprimit. Melochia Alpini, qui integram plantam exhibet. Melochia Egyptia, Velling. Hort. Patav. Olus Judaicum Avicennæ quibusdam, & Moluchi Arabum, Rauwolf.*

*Coriandrum majus, C.B. Coriander.* *Coriandrum, Matth. Lob. Tab. Dod. Fuch.*

*Cornus hortensis mas, C.B. Cornelbaum.* *Cornus, Trag. Matth. Dod. Lob. mas, Tab. vulgaris mas, Clus.*

*Cornus fœmina. C.B.\** Lob. Tab. Hartriegel. *Trag. Cornus sylvestris, Lon. Virga sanguinea, Matth. Dod. Ruell. Materies solidissima, & apta fabricandæ supellectili.*

*Coronopus hortensis, C.B. Ridenfueß.* *Coronopus, Trag. Lon. Matth. Tab. Cornu cervinum, Lob. Herba sive Cornu cervinum, Dod. Gräffine Belgarum.*

*Coro-*



*Coronopus repens*, C.B.\* Kriechend Krähenfuß/  
Schweinefresse. *Coronopus repens* aut *arvensis*,  
Tab. *Coronopus Ruellii* & *Cornu cervi alterum*,  
Lob. ic.

*Corylus sylvestris*, C.B.\* Wilde Haselnuß. *Corylus*,  
Dod. *sylvestris*, Lob. Matth. Clus. Ab hac  
sola cultura differt sequens.

*Corylus sativa fructu albo minore*, sive vul-  
garis, C. B. Gemeine weisse Haselnüsse. *Corylus*  
*domestica*, Clus. persimilis albo, Lob. *Nux avella-*  
*na fructu rotundo*, Matth.

*Corylus sativa fructu rotundo maximo*, C. B.  
Grosserunte Haselnüsse. *Avellana major* Lugdu-  
nensis, Cam. urbana rotunda circa Lugdunum,  
Gel. hort. Hæc apud nos minus frequens: fructus  
vero aliunde illati, inter bellaria apponuntur.

*Corylus sativa fructu oblongo rubente*, C. B.  
Rohrte Haselnüsse / Bart-oder Lamperts-Nüsse.  
*Corylus domestica oblonga*, Clus. *Nux avellana*  
*domestica oblonga rubra*, Matth. *Avellana Lom-*  
*bardica*, quorundam. Datur in hoc genere quæ-  
dam species, cujus nucleus non rubra, sed alba pel-  
licula integitur.

*Cotinus*, C. B. Matth. Tab. Färberbaum / Fär-  
berlaub Austriacis. *Cotinus coriaria*, Dod. Eyst.  
*Coccigria Theophr.* Lob. *Coggygia Plinii*, Clus.

*Cotyledon major*, C. B. Groß Nabelkraut. *Coty-*  
*ledon*, Dod. Lob. *Umbilicus Veneris*, Matth. Tab.  
*Cotyledon sive Umbilicus Veneris*, Clus.

*Cotyledon media folijs subrotundis*, C. B. Mittel Nabelkraut mit rundlichen blettern. *Cotyledon altera*, Dod. altera quarta, Clus. Umbilicus Veneris alter, Matth.

*Cotyledon media folijs oblongis serratis*, C. B. Mittel Nabelkraut mit länglichen blettern. *Cotyledon minus*, Eyft. minus sedi folio, Lob. Umbilicus Veneris minor, Tab. alter secundus, Matth.

*Crocus sativus*, C. B. Richter Safran. *Crocus*, Trag. Lob. Tab. Dod. sativus autumnalis, Eyft. *Crocum*, Matth. hortense, Cam.

*Crocus vernus latifolius albus variegatus*, C. B. Frühlings Safran. *Crocus sylvestris montanus* flore albo, Lob. *sylvestris vernalis* alter, Dod. *vernus major* alter, Clus.

*Crocus vernus latifolius purpuroviolaceus*, C. B. qui varietates aliquot sub se comprehendit.

*Crocus vernus minor albicans*, c. B. *Crocus sylvestris minor* prior, vel *sylvestris quartus*, Dod. *vernus serotinus primus*, Lob. ic. *vernus latifolius albus versicolore* flore secundus, Clus.

*Crocus vernus minor purpurascens*, C. B. *Crocus sylvestris quintus*, Dod. *vernus albus secundus*, Lob. *vernus latifolius albus versicolore* flore primus, Clus.

*Crocus vernus latifolius flavus*, c. B. *Crocus vernus polyanthos* flore luteo, Eyft. *vernus luteus primus*, Lob. *vernus latifolius flavo* flore, Clus.

Cro-

*Crocus vernus latifolius aureus*, c. B. *Crocus aureus*, Lob. *vernus latifolius flore aureo*, vel *Croci sexti alia species*, Clus.

*Crocus vernus angustifolius magno flore*, C. B. *Crocus vernus minor primus*, Tab. *vernus angustifolius primus*, Clus. *sylvestris minor Hispanicus flore patulo*, vulgo *Nozilicha minor*, Lob.

*Crocus vernus angustifolius parvo flore*, c. B. *Crocus vernus minor tertius*, Tab. *vernus angustifolius tertius*, Clus. *sylvestris vernalis sextus*, Dod. *sylvestris Hispanicus*, vulgo *Nozilicha major*, Lob.

*Crocus vernus angustifolius variegatus*, c. B. *Crocus aureus variegatus*, Eyst.

*Crocus alpinus autumnalis*, c. B. *Später Saffrau*. *Crocus montanus autumnalis*, Lob. *sylv. autumnalis*, Dod. *montanus vernus*, Eyst. *Crocum montanum*, Clus.

*Cruciata hirsuta*, c. B. \* *Krusette*. *Cruciata*, Dod. *minor*, Lob. *Gallii secundum genus*, Trag.

*Cucumis sativus vulgaris*, C. B. *Rufumern / nostratibus Gurken /* quamvis hæc vox corrupta possit videri ex *Anguria*, quæ alia species. *Cucumis*, Tab. *sativus*, Matth. *sativus & esculentus*, Lob. *vulgaris*, Dod.

*Cucumis sativus major*, C. B. *Grosse Gurken*. *Cucumis Turcicus*, Fuch. ex *Hispanico semine natus*, Tab.

*Cucumis flexuosus*, C. B. Schlangen-Gurcken. *Cucumis longus*, Matth. *oblongus*, Dod. *anguina*, Tab. *flexuosus* sive *anguinus*, Lob.

*Cucumis sylvestris asininus dictus*, C. B. Spring-gurcken. *Cucumis asininus*, Tab. Eyft. *sylvestris*, Matth. Dod. *Cucumer Elaterii sylvestris*, Lob. *Fructus maturos si tangas*, semina ejaculantur: sicut *Balsamina lutea* sive *Noli me tangere*.

*Cucurbita major sessilis flore albo*, C. B. Grosser platrunter Kürbis mit weissen blumen. *Cucurbita latior*, Dod. *sessilis*, Matth. ep. *Zuccha rotunda*, Anguill.

*Cucurbita major rotunda flore luteo, folio aspero*, C. B. Grosser runter Kürbis mit gelben blumen und rauhen blettern. *Cucurbita Indica*, Matth. *Indica major & minor*, Tab.

*Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli*, C. B. Flaschen-Kürbis mit weichen blettern. *Cucurbita lagenaria*, Lob. *lagenaria major & minor*, Tab. prior, Dod. *Adfuerunt colore toto viridi, toto albo, viridi & albo medio*.

*Cucurbita oblonga flore albo, folio molli*, C. B. Lange oder Trompeten-Kürbis. *Cucurbita longior*, Dod. *longa*, Tab. *tubularis*, quorundam. *Cucurbita* sive *Zuccha omnium maxima anguina*, Lob.

*Cucurbita capitata*, C. B. Tab. Kopff-kurbis. *Cucurbita stellata* sive *sessilis*, Cam.



*Cucurbita verrucosa*, C. B. Warzen Kürbiß.  
Quibus addantur, quæ adfuerunt: *Cucurbita ca-*  
*seiformis*, *cydoniformis*, *citriformis*, *aurantifor-*  
*mis*, *limoniformis*, *spongifera*, *compressa*, *clypea-*  
*ta*, & *similes*.

*Cuminum semine longiore*, C. B. Kümmel.  
*Cuminum sativum*, Matth. Lob. *Cyminum*,  
Tab.

*Cuminum pratense*, Carvi Officinarum, C. B.  
Garbe. Carvum, Matth. Lob. Dod. Tab. *Radix a-*  
*licubi* etiam in usum culinæ cedit.

*Cupressus*, C. B. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst.  
Eypressenbaum. *Cyparissus*, Cast.

*Cuscuta major*, C. B. \* Filzkrant / Glachsseide.  
*Cuscuta*, Matth. Clus. Cassytha, Lob. Tab. Cassu-  
tha, Dod. Implicando sese adnascitur Lino, Rubo,  
*Urticæ*, *Lupulo*, *Tanaceto*, & aliis.

*Cyanus segetum*, C. B. \* Wilde Kornblume/  
Koggeblume. *Cyanus flos*, Dod. major, Matth. vul-  
garis, Lob. *cæruleus*, Tab. *arvensis cæruleus*, Eyst.

*Cyanus hortensis flore simplici*, C. B.  
Garten Kornblume die einfache. Ad sunt aliquot  
varietates.

*Cyanus hortensis flore pleno*, C. B. Garten Korn-  
blume die gefülte. *Cyanus multiflorus*, Tab. *flore*  
*multiplici*, Lob. ic. *Floris color variat*.

*Cyanus flore pleno, odore Zibethi*. Gefülte  
Kornblume nach Zibeth riechend. In colore floris  
triplicem notavi varietatem. Est enim totus  
balus



albus, totus purpureus, albus cum fundo purpureo. Communiter dicitur Cyanus Orientalis, aut Indicus, aus Turcicus odoratissimus.

*Cyanus repens latifolius*, C. B. \* Kriechende Kornblume mit breiten blettern. Cyanus repens, Lob. ic. minor altera, Tab. peramarus lupinus capitulis squamosis, Adv.

*Cyanus repens angustifolius*, C. B. \* Kriechende Kornblume mit schmalen blettern. Cyanus minimus repens, Lob. ic. Cyanoides minor, Tab.

*Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens*, C. B. Schweinebrodt mit runten blettern unten purpurfarbe. Cyclaminus, Matth. Tab. orbicularis rotundifolius, Dod. flore odorato, Clus. Cyclamen vulgare, Eyst. Panis porcinus & Arthanita, Off.

*Cyclamen radice maxima folijs inferne rubentibus*, C. B. Schweinebrodt mit runten blettern/unten roht. Cyclamen Romanum, Eyst.

*Cyclamen folio anguloso*, C. B. Schweinebrodt mit eckigen blettern. Cyclamen vernum, Lob. ic. Eyst. cyclaminus verno tempore florens, Clus. Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.

*Cyclamen vernum album*, C. B. Frühlings Schweinebrodt mit weissen blumen. Cyclamen vernum flore albo, Lob. clus. & quidem extant in Catalogo veteri MS. nomina quoque sequentia: Cyclamen Persicum majus. Cyclamen Persicum vernum flore albicante, corolla purpurea odoratum.

tum. Cyclamen Monspeliense venum flore albo, & flore rubro. Cyclamen de Alepo venum Cyclamen autumnale Pisanum. Cyclamen autumnale Africanum flore purpureo odoratum.

*Cymbalaria*, C. B. Matth. Zymbelfraut. *Cymbalaria Italica* hederaceo folio, Lob. foliis hederaceis flore cæruleo, Eyst.

*Cynoglossum majus vulgare*, C. B. \* Grosse Hundsjung. *Cynoglossum*, Dod. Tab. vulgare, Matth. Lob. Clus Eyst.

*Cynoglossum medium*, C. B. Mittel Hundsjung. *Cynoglossum pumilum*, Clus. pan. Narbonense, Eyst. pusillum Narbonense, Lob. ic.

*Cytisus incanus siliquis falcatis*, C. B. Beißflee. *Cytisus*, Dod. tertius cornutus, Tab. Maranthæ, Matth. Lob. Galeni Maranthæ cornutus, Eyst.

*Cytisus incanus folio oblongo Austriacus*, C. B. Beißflee mit länglichen blettern. *Cytisus quintus* Clus. undecimus, Tab. incanus, Ger.

*Dens canis latiore rotundioreq. folio*, C. B. Breitblettriger Hundsjahn. *Dens caninus*, Dod. purpurascende flore, Clus. Satyrium & *Dens caninus*, Lob. *Dens canis* flore rubro, Eyst. *Pseudohermodactylus*, Matth. Tab. Adest etiam flore albo.

*Dens canis angustiore longioreque folio*, C. B. Schmallblettriger Hundsjahn. *Dens caninus* albo flore, Clus. Eyst. *Erythronium* fl. albo angustioribus foliis, Lob.

*Dens leonis latiore folio*, C.B.\* Breit Löwen-  
zahn/Pfaffenröhrlein. *Dens leonis*, Matth. Lob.  
Dod. Tab. *Hieracium majus*, Trag. Caput mona-  
chi, quorundam.

*Dens leonis angustiore folio*, C.B.\* Schmall  
Löwenzahn. *Aphaca angustioris folii*, Cæf.

*Dictamnus albus vulgo sive Fraxinella*, C.B.  
Weisser Diptam. *Dictamnus album*, Matth. Fra-  
xinella, Dod. Clus. Eyf. *Polemonium*, Tab.

*Pseudodictamnus verticillatus inodorus*, C.B.  
Falscher Diptam. *Dictamnus*, Matth. floribus  
verticillatis, Lob. Eyf.

*Digitalis purpurea folio aspero*, C.B. Braun  
Fingerhut. *Digitalis rubra*, Dod. Lob. Tab. folio  
verbasci, quibusdam.

*Digitalis alba folio aspero*, C.B. Weiß Finger-  
hut. *Digitalis alba*, Lob. Eyf. secunda, Dod.

*Digitalis lutea magno flore*, C.B. Gelb Fin-  
gerhut. *Digitalis lutea*, Tab. flore luteo, Eyf. ter-  
tia, Dod.

*Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major*,  
C.B.\* Kartendistel. *Dipsacus*, Tab. sylvestris, Dod.  
*Labrum Veneris*, Lob. alterum, Matth.

*Dipsacus folio laciniato*, C.B.\* Kartendistel mit  
gelaſchten blettern. *Dipsacus secundus*, Tab.

*Doronicum radice scorpij*, C.B. Gemenſenwurz.  
*Doronicum*, Eyf. primum, Tab. latifolium, Clus.  
*Doronici tertii varietas*, Lob.

*Doronicum Americanum*, C.B. Americani-  
sche

ſche Gemenſenwurꝝ. Descriptio habetur in appendice Pinacis.

*Draba filiquosa cerulea.* Blawe Draba. Solo floris colore differre videtur a Draba alba filiquosa repente, C.B. quæ est Draba tertia succulento folio, Clus. Arabis seu Draba altera, Lob. Obs.

*Dracunculus hortensis*, C.B. Matth. Tab. Eyft. Garten-Dragune. Draco, Lob. Draco herba, Dod. Tragum vulgare, Clus.

*Dracunculus pratensis serrato folio*, C.B.\* Wiesen Dragune. Ptarmica, Matth. Lob. Clus. vulgaris, Eyft. Draco sylvestris sive Ptarmica, Dod. Pyrethrum sylvestre, Cord.

*Dracunculus pratensis flore pleno*, C.B. Wiesen Dragune mit vollen blumen. Ptarmica vulgaris pleno flore, Clus.

*Dracunculus polyphyllus*, C.B. Schlangenfraut. Dracunculus minor, Matth. Tab. Dracontium majus, Dod. Eyft. Anguina dracontia & Serpentaria colubrina, Lob.

*Dracunculus palustris, sive radice arundinacea* Plinij, C.B.\* Wasser Schlangenfraut. Dracunculus aquaticus, Matth. Dod. Eyft. Anguina aquatica sive Dracunculus, Lob.

*Echium vulgare*, C.B.\* & Clus. Echium das gemeine. Echium, Matth. Dod. floribus purpurantibus rubellis, Lob. Flore apud nos ceruleo provenit.

Echi

*Echium scorpioides arvense*, C. B. \* Scorpion-  
Echium/ so auff den äckern wächst. *Scorpioides*  
*tertium*, Dod. *tertium minus*. Dodonæi, Eyst. *Au-*  
*ricula muri cærulea*, Tab. *Myosotis hirsuta re-*  
*ptans*, Lob.

*Echium scorpioides palustre*, C. B. \* Scorpion-  
Echium/ so in sumpffen wächst. *Scorpioides*  
*foemina*, Dod. *tertium majus*. Dodonæi, Eyst.  
*Euphrasia cærulea*, Tab. Flore apud nos inveni-  
tur & cæruleo & niveo.

*Epimedium*, C. B. Dod. Lob. Cam. Anguill.  
Bischoffshut. *Lunaria Vicentinorum*, in quo-  
rum agris frequens nascitur. Magnitudine admo-  
dum variat.

*Equisetum palustre longioribus setis*, C. B. \*  
Sumpffiger Roßschwan; mit langen borsten. *E-*  
*quisetum primum*, Matth. *majus*, Lob. *secundum*,  
Tab. *Hippuris major*, Do l.

*Equisetum palustre brevioribus setis*, C. B. \*  
Sumpffiger Roßschwan; mit kurzen borsten.  
*Equisetum palustre*, Lob. ic. Foliorum extremita-  
tes in hoc fissas quoque inveni. ob quam varieta-  
tem vocari posset *Equisetum palustre setis bifidis*.

*Equisetum palustre brevioribus foliis polysper-*  
*mon*, C. B. \* Roßschwan; so viel samen trägt.  
*Polygonum foemina*, Matth. Dod. Tab. *semine vi-*  
*dua*, Lob. ic.

*Equisetum pratense longissimis setis*, C. B. \*  
Wiesen Roßschwan; / Schaffthew / Rannekraut.  
Equis-



*Equisetum alterum*, Matth. palustre majus, Tab. Hippuris fontalis, Lob.

*Equisetum arvense longioribus setis*, C. B.\* Acker-Rosßschwanz. *Equisetum alterum*, Lob.

Hippuris minor, Dod. arvensis major, Tab.

*Equisetum folijs nudum non ramosum, sive junceum*, C. B.\* Rosßschwanz ohn bletter. *Equisetum junceum*, Trag. Hippuris sine foliis & nuda, Tab.

*Equisetum foetidum sub aqua repens*, C. B.\* Stinckend Wasser-Rosßschwanz. *Equisetum quintum* in Prodromo, cum icone.

*Erica vulgaris glabra*, C. B.\* Heidekraut. Erica, Tab. prima, Matth. Dod. Myricæ folio, Lob. Clus. Invenitur flore tum dilute purpureo, tum albescente.

*Eruca latifolia alba*, C. B.\* Garten-Kraut. *Eruca sativa*, Matth. Lob. Dod. Italica corrupte Ruchetta vocatur, cujus folia acetariis admiscunt. A Sinapi hæc diversa planta est, quamvis apud Matthiolum Germanice vertatur, weisser Garten-Senff.

*Eruca sylvestris minor, luteo parvoq. flore*, C. B.\* Kleine wilde Kraut. *Eruca palustris minor*, Tab. Sinapi primum genus sylvestre, Fuch.

*Eruca lutea latifolia, sive Barbarea*, C. B.\* Breitblettrige wilde Kraut/ Winterkresse. *Barbarea*, Dod. Lob. Tab. Herba S. Barbaræ, Trag. Lon. Seritur etiam in hortis.

*Eruc-*

*Eruca maritina Italica siliqua haste cuspidi simili*, C.B. Meerrauce. *Eruca Kackile dicta*, Colum. *Cakile Serapionis*, Lob.

*Eryngium vulgare*, C.B.\* & Clus. Manß-trew/ blawe Distel. *Eryngium*, Tab. campestre, Dod. campestre mediterraneum, Lob. montanum sive campestre, Matth.

*Eryngium montanum amethystinum*, C.B. Manßtrew blau als ein Amethyst. *Eryngium totum caeruleum*, Eyst. Cam.

*Eryngium latifolium planum*, C.B. Manßtrew mit breiten blettern. *Eryngium planum*, Matth. spurium primum, Dod. caeruleum primum & secundum, Tab. pannonicum latifolium, Clus. pan. Eyst.

*Eryngium arvense folijs serrae similibus*, C.B.\* Manßtrew mit sägenformigen blettern. *Eryngium quartum*, Dod. montanum recentiorum, Lob. *Crithmum quartum*, Matth. Tab.

*Erysimum vulgare*, C.B.\* Wegesenff/ Dottertraut. *Erysimum primum*, Tab. Irio, Matth. Irio sive *Erysimum*, Lob. Dod.

*Erysimum cereale*, C.B. Buchweize. *Erysimum Theophrasti*, Lob. *Fagopyron*, Dod. *Ocimum cereale*, Tab. Clus. pan. *Fru mentum Sarracenicum*, Matth. *Fagotriticum quorundam*.

*Evonymus vulgaris granis rubentibus*, C.B.\* Spilbaum. *Evonymus*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Tetragonia*, Theophr. *Quadratoria*, Gazz. Ma-

Materies flavet, & ob duritiem ad varia opera expetitur.

*Eupatorium cannabinum*, C.B. \* Wasserdoſt.  
*Eupatorium vulgare*, Matth. Dod. Cannabina aquatica mas, Lob. Herba S. Kunigundis prima, Tab.

*Eupatorium seu Cannabina aquatica folio non diviſo*, C.B. \* Wasserdoſt mit unzerſchnittenen blettern. *Eupatorium cannabinum chryſanthemum*, Tab. *cannabinum foemina Septentrionalium*, Lob. ic. *Conyza paluſtris*, Eyſt.

*Eupatorium veterum ſive Agrimonia*, C.B. \* Odermennige. *Eupatorium*, Matth. Tab. *Dioſcoridis & aliorum Græcorum*, Lob. *Agrimonia*, Dod.

*Eupatorio veterum ſive Agrimoniae ſimilis*. Ein ſtraut der Odermennige ähnlich. *Agrimonia ſimilis*, C.B. *Agrimonoides*, Column. Diverſa tamen ab hac planta eſt *Pimpinella agrimonioides Horti Patavini*, quæ Bauhino indiſta videtur.

*Euphrasia officinarum*, C.B. \* Augentroſt. *Euphrasia*, Matth. ramaſa & minus ramaſa, Eyſt. *Euphrasia & Euſragia*, Dod. Lob. Tab. Flos ex luceo albicat, rarius ex caruleo purpuraſcit.

*Euphrasia pratensis rubra*, C.B. \* Koſter Augentroſt. *Euphrasia altera*, Dod. Lob. *Odontites*, Tab.

*Faba*, C.B. & Matth. Bone. *Faba major recentiorum*, Lob. *Boona ſive Phaſelus major*, Dod.

*Fagus*, C.B. \* Matth. Dod. Lob. Tab. & cate-

rorum. Büche. Fructus castaneis parvis similes, in cibum porcis gratissimum veniunt.

*Ferrum equinum siliqua singulari, C.B.* Hufeisenkraut / Höffelsutteral. Ferrum equinum, Matth. Lob. Hedysarum sive ferrum equinum, Tab. Sferrocavallo, Cam.

*Festuca graminea glumis hirsutis, C.B.\** Graßsulch / Draspe. Festuca altera, Dod. Lolium, Lon. Bromos sterilis altera, Lob. Bromos herba, Tab. Vitium est frumentorum, præcipue Secalis.

*Festuca avenacea sterilis elatior, C.B.\** Haberulch. Ægilops prima, Matth. prima & Avena fatua, Tab. Bromos sterilis, Lob. ic. Bromos herba, Dod.

*Ficus communis, C.B.* Hoher Feigenbaum. Ficus, Matth. Dod. Lob. Tab.

*Ficus humilis, C. B.* Niedriger Feigenbaum. Ficus pumila, Matth. Dod. Chamæficus sive humilis ficus, Lob.

*Ficus Indica folio spinoso fructu majore, C.B.* Grosse Indianische Feigen. Ficus Indica, Matth. Dod. Lob. Eyst. Indica spinosa, Tab. Opuntia, Lon.

*Ficus Indica minor.* Kleine Indianische Feigen. An Ficus Indica folio spinoso fructu minore, C. B. quæ Indorum ferruminatrix, Lob.

*Filipendula vulgaris, C.B.\** Roter Steinbrech. Filipendula, Dod. Matth. Tab. vulgaris, Eyst. Oenanthe, Lob. Fuch,



*Filix non ramosa dentata*, C.B.\* Fahrenkraut  
ohn zweige. Filix mas, Matth. Dod. Lob. Tab.

*Filix ramosa major pinnulis obtusis non den-  
tatis*, C.B.\* Fahrenkraut mit zweigen. Filix fœmi-  
na, Matth. Dod. Lob. Tab. Hujus radix non  
transverso ductu, sed calamitum incisa aquilam  
mentitur.

*Filix Americana*. Americanisch Fahrenkraut.  
Ita nominatur in Horto Parisiensi. Filix Virgini-  
ana, Hort. Lugd. Batav. & Grœning.

*Filix querna*, C. B. \* Eidsfaren. Dryopte-  
ris, Matth. Lob. Cam. ep. Filicula petræa fœmina  
secunda, Tab. Osmundula, Lon.

*Fœniculum vulgare Germanicum*, C.B. Sen-  
chel. Fœniculum, Trag. Fuch. Tab. commune,  
Gefn. hort.

*Fœniculum dulce*, C.B. Matth. Weisscher Sen-  
chel. Fœniculum Romanum, Tab. vulgatus dul-  
ce, Lob.

*Fœnum græcum sativum*, C.B. Beckshorn. Fœ-  
num græcum, Matth. Lob. Dod. Lon. Fœno-  
græcum, Fuch.

*Fragaria vulgaris*, C. B.\* Erdbeer / Besing-  
kraut. Fragaria, Matth. Dod. Lob. Fragum & Tri-  
folium fragiferum, Tab. Fraga fructu rubro, Eyst.  
In hortis culta majores fructus producit, & inter-  
dum florem plenum.

*Fragaria fructu albo*, C.B. Weiss Erdbeer. Fra-  
gum album, Tab. Fraga candida, Trag.



*Fragaria sterilis*, C.B.\* & Gesn. Erdbeerfraut ohn frucht. *Fragaria sylvestris* minime vesca sive sterilis, Lob. ic.

*Fraxinus excelsior*, C.B.\* Esche. Fraxinus, Matth. Dod. Lob. Tab. Materia levis est, enodis, recta: unde ad hastas & perticas expetitnr.

*Fritillaria praecox purpurea variegata*, C.B. Früzeitige Fritillarie mit purpurgescheckten blumen. *Fritillaria*, Eyst. dilutior, Clus. sive Lilionarcissus purpureus variegatus, Lob. Meleagris, Dod.

*Fritillaria alba praecox*, C.B. Früzeitige Fritillarie mit weissen blumen. *Fritillaria alba*, Clus. Eyst. alba altera, Lob.

*Fritillaria polyanthos flavoviridis*, C.B. Gelbgrüne Fritillarie mit vielen blumeu. *Fritillaria polyanthos lutea*, Eyst.

*Fritillaria flore magno pleno*, C.B. Volle Fritillarie. *Fritillaria flore pleno*, Eyst. Cam.

*Fritillaria serotina floribus ex flavo virentibus*, C.B. Späte Fritillarie die gelbgrüne. *Fritillaria Aquitanica*, Clus. minor obsoleto colore inodora, Eyst.

*Fritillaria flava rubris maculis distincta*, C.B. Gelbe Fritillarie mit rohten schecken. *Fritillaria lutea* Someri, Lob. Suert. *Fritillariae tertium genus*, Clus.

*Fritillaria flore minore*, C.B. Kleine schwarze Fritillarie. *Fritillaria Pyrenæa*, Clus. nigra *Pyrenæa*, Lob. *Pyrenæa* obsoleto luteo colore, Eyst.

Variat

Variat admodum, & in Hort. Berolinensi prove-  
niebat flore ex purpureo plane nigricante, sine  
tessulis, anno 1661.

*Frumentum Indicum Mays dictum*, C. B.  
Türkischer Weizen. *Frumentum Indicum*, Matth.  
*Turcicum*, Dod. *Milium Indicum Plinianum*,  
Lob.

*Fumaria officinarum*, & *Dioscoridis*, C. B. \*  
Erdrauch / Alpraute. *Fumaria*, Matth. Dod. Ca-  
puos, Lob.

*Fumaria lutea*, C. B. Erdrauch mit gelben blu-  
men. *Fumaria lutea montana*, Lob. *Fumaria co-  
rydalis*, Matth. *Fumaria montana*, Tab. In nostra  
floris pars antica flavet, postica purpurascit.

*Fumaria bulbosa radice cava major*, C. B.  
Knollig Erdrauch mit holer wurzel / oder Hol-  
wurz. *Fumaria altera*, Matth. *Aristolochia rotun-  
da vulgaris*, Trag. Fuch. *Radix cava major*, Dod.  
*Radix cava herbariorum*, Lob. Clus. pan.

*Fumaria bulbosa radice non cava major*, C. B.  
Knollig Erdrauch / an welchen die wurzel nicht  
holl. *Aristolochia rotunda vulgaris radice solida*,  
Trag. rotunda, fl. albo, Eyst. licet pingant fl. pur-  
purante & luteo.

*Fungorum vescorum*, & *noxiorum* plurimæ  
species. E vescis quatuor cum primis genera 2-  
pud nos sunt usitata. Morcheln / Meitscher / Pül-  
ze / Psifferlinge. Inter non vescos celebres sunt,  
& usitati:

*Fungus rotundus orbicularis*, C. B. \* Posist.  
 Fungus orbicularis, Dod. ovatus & Crepitus lupi,  
 Trag. Lon. glomeratæ rotunditatis, Lob. belg. Lu-  
 picrepitus, Cast. Hunc maturum confringunt, a  
 pulvere contento liberant, & exsiccatum pro si-  
 stendo sanguine in vulneribus Chirurgi usur-  
 pant.

*Fungus membranaceus auriculam referens si-  
 ve Sambucinus*, C. B. \* Judasohr / Gliederschwam.  
 Fungus ad Sambucum, Trag. Fungorum pernici-  
 osorum primum genus, Clus. Auricula Judæ vul-  
 go, a figura: macerant autem in aqua rosacea, &  
 oculis inflammatis pro refrigerio imponunt.

*Galega vulgaris*, C. B. \* Ziegenraute / Geißraute.  
 Galega, Lob. Dod. Ruta capraria, Tab. Gale-  
 ga sive Ruta capraria, Matth. In horto floribus  
 quoque candicantibus colitur, aut cinereis, cum  
 iponte nascenti flos sit cæruleus.

*Galega Ægyptiaca siliquis articulatis*, C. B.  
 Geßban. Sesban, Alpin. Clus. Seban & Sesban  
 Indicum, Cam. Seysban, Belli.

*Galega affinis Sophora dicta*, C. B. Sophora.  
 Sophora, Alp. Sofera lentisci foliis, Belli. Hoxo-  
 coquomaclit, Cam. Clus. cur. post.

*Gallium luteum*, C. B. \* Wallstroch mit gelben  
 blumen. Gallium, Dod. Fuch. Lon. primum, Tab.  
 Galium, Marth. luteum, Lob.

*Gallium album minus*, C. B. \* & Tab. Wall-  
 stroch mit weissen blumen.

*Gallium palustre album*, C. B. \* Sumpffig  
Wallstroh. *Gallium palustre*, Dod. album, Tab.  
Lon.

*Genista angulosa & scoparia*, C. B. \* Ginst/  
Pfrimmkraut. *Genista*, Trag. Dod. Tab. vul-  
garis, Clus. *scoparia vulgi*, Lob. Eyf. Sunt, qui  
flores hujus nondum apertos muria condiunt, &  
Capparum loco utuntur.

*Genista tinctoria Germanica*, C. B. \* Berber-  
pfrimmen. *Genista tinctoria*, Dod. tinctoria vul-  
garis, Clus. *Genistella tinctoria*, Tab. Eyf.

*Genista humilis sive Chamægenista sagittalis*,  
C. B. Erdpfrimmen. *Genista sagittalis pannonica*,  
Cam. *Genistella montana*, Lob. *Chamægenista*  
*altera*, Clus. *Chamæspartium*, Trag. Lon. Tab.

*Gentiana cruciata*, C. B. \* Kreuz Genian. *Gen-*  
*tiana minor*, Matth. Lob. Tab. *Cruciata*, Trag.  
Fuch. Dod. Lon. Eyf.

*Gentianella alpina verna major*, C. B. Genzia-  
nelle. *Gentiana alpina*, Lob. *verna minor*, Clus. mi-  
nima *verna flore cæruleo*, Eyf.

*Geranium batrachoides folio Aconiti*, C. B.  
Storchschnabel mit Eisenhut blettern. *Geranium*  
*sive batrachium cæruleum*, Tab. secundum vel ba-  
trachiodes alterum, Clus. Adest flore cæruleo, flo-  
re albo, flore albo lineis cæruleis variegato.

*Geranium sanguineum maximo flore*, C. B.  
Storchschnabel mit blutrohten blumen. *Geraniū*  
*sanguinarium*, Eyf. septimum hæmatodes, Clus.

Gruinum sanguinale hæmatodes supinum radice reptrice, Lob. ic.

*Geranium batrachoides*, Gratia Dei Germanorum Lobelij, C.B. \* Storchschnabel / Graze de genant. *Geranium batrachoides*, Dod. sanguinarium, Tab. quartum, Matth.

*Geranium batrachoides flore variegato*, C.B. Storchschnabel mit geschleckten blumen. *Geranium Anglicum variegatum*, Eyft.

*Geranium montanum fuscum*, C. B. Berg Storchschnabel mit braunischwarzen blumen. *Geranium montanum*, Dod. fuscum, Lob. Eyft. maculatum, Tab.

*Geranium tuberosum majus*, C.B. Storchschnabel mit knolliger wurzel. *Geranium tuberosum*, Dod. primum, Matth. bulbosum Matthioli, Tab. bulbosum, Dio. coridis primum, Lob.

*Geranium folio Malve rotundo*, C.B. Storchschnabel mit pappelblettern. *Geranium alterum*, Trag. Matth. columbinum, Tab. Pes columbinus, Dod. Lob.

*Geranium folio Althææ*, C.B. Storchschnabel mit Althe-blettern. *Geranium sextum*, Matth. inalaoides, Lob. Monspeliacum, Tab. a Calceolario missum, Dod.

*Geranium cicutæ folio moschatū*, & inodorū C. B. \* Storchschnabel mit Schirlingsblettern / Die semfraut. *Geranium supinum*, Dod. moschatum, Eyft. myrrhinum, Tab. Myrrhida Plinii, Lob. ic. &



rostrum ciconiæ, Adv. Plerumque moschum olet, nonnunquam odore caret: odoratum solet in hortos quoque transferri.

*Geranium Cicutæ folio minus & supinum*, C.B.\* Kleiner Storchschnabel mit Schirlingsbletern. *Geranium septimum sive gruinum*, Dod. minus vel arvense, Tab. moschatum inodorum, Eyst. Myrrhida vulgatum Plinii, Lob. ic.

*Geranium Robertianum primum*, C.B.\* Gemein Storchschnabel / Ruprechtskraut. *Geranium tertium*, Matth. Lon. Fuch. Robertianum, Lob. Dod. Tab.

*Geranium latifolium longissima acu*, C.B. Cretischer Storchschnabel. *Geranium Creticum*, Cam. Tab. Clus. Creticum annuum hæmatodes, Lob.

*Gladiolus floribus uno versa dispositis*, C.B. Schwertel, *Gladiolus*, Dod. Narbonensis, Lob. Germanicus, Tab. Victoralis rotunda, Eyst. *Gladiolus bulbosus*, quorundam. Adest procerior, & humilior: flore rubro, candicante, & purpureo.

*Gladiolus foetidus*, C.B. Stinckend Schwertel. *Spatula foetida*, Tab. Dod. Trag. Fuch. *Xyris*, Matth. Lob. *Gladiolus tuberosus*, aut geniculatus, quorundam.

*Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica*, C.B. Süßholz / Leckrize, *Glycyrrhiza*, Fuch. siliquosa, Lob. altera, Matth. vulgaris, Dod.

*Glycyrrhiza sylvestris floribus luteopallescentibus*, C. B. \* Wild Süßholz. *Glycyrrhiza sylvestris*, Cam. Fœnum græcum sylvestre, Trag. sylvestre primum, Dod. Glaux vulgaris, Lob. Clus.

*Gnaphalium vulgare majus*, C. B. \* Groß Kührkraut. *Gnaphalium vulgare*, Matth. Lob. Tab. Filago, Dod.

*Gnaphalium medium*, C. B. \* & Tab. Mittel Kührkraut. Filago minor, Dod. Lob. ic.

*Gnaphalium latifolium Americanum*, C. B. Americanisch Kührkraut. *Gnaphalium Americanum argyrocome*, Clus. latifolium peregrinum, Eyf. Centunculus Americanus, & Centuncularis, quorundam.

*Gnaphalium montanum flore rotundiore*, C. B. Berg-Kührkraut. *Gnaphalium montanum album*, & purpureum, Lob. Tab. montanum variegatum, Eyf. Lagopus secundus, Trag.

*Gossypium frutescens semine albo*, C. B. Baumwoll. Gossypium, Dod. Lob. Tab. Xylon sive Gossypium, Matth. Bombax officinarum.

*Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis*, C. B. \* Hundsgras/ Pehden/ Quecken/ Graswurz. Gramen, Dod. Ruell. caninum, Tab. canarium medicatum, Lob.

*Gramen caninum supinum minus*, C. B. \* Liegend Hundsgras. Gramen caninum supinum, Lob. ic. caninum supinum secundum, Tab.

*Gramen tremulum majus*, C. B. Zitter Gras.  
Gra-

Gramen leporinum & tremulum, Tab. Phalaris pratenfis minor, Lob. ic. Amourettes tremblantes, Clul.

*Gramen pratense paniculatum molle*, C. B.\* Weich wiefen Straußgras. Gramen paniculatum molle, Lob. adv. part alt.

*Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio*, C. B.\* Groß wiefen Straußgras. Gramen pratense primum, Dod. pratense vulgatus, Lob. alterum & vulgare, Tab.

*Gramen panicula multiplici*, C. B.\* Wiefengras mit vielfachen strauße. Gramen minus duriusculum, Tab. Describitur etiam in Prodr.

*Gramen segetum altissimum panicula sparsa*, C. B.\* Hoch Ackergras mit flattrigem strauße. Gramen segetum panicula speciosa latiore, Lob. ic. Gramen segetale, Tab.

*Gramen segetum panicula arundinacea*, C. B.\* Ackergras mit einem Rohrstrauße. Gramen pratense tertium, Dod. harundinaceum arvense, Tab. Agrorum venti spica, Lob. ic.

*Gramen paniculatum folio variegato*, C. B. Straußgras mit gestreiften oder bunten blettern. Gramen Hispanicum, vulgi. striatum, Lon. pictum, Tab. sulcatum, Lob. ic.

*Gramen aquaticum fluitans multiplici spica*, C. B.\* Schwimmend Wassergras. Gramen fluviatile, Tab. aquis innatans, Lob. ic.

*Gramen typhoides molle*, C. B.\* Kolbengras.

Gramen alopecuroides, Lob. ic. alopecurinum primum, Tab.

*Gramen phalaroides spica molli, sive Germanicum, C.B.* \* Graß mit weichen Canarien ähren. Est vigesimum septimum in Prodr.

*Gramen alopecuros minor spica longiore, C.B.* \* Fuchschwanz. Alopecuros, Tab. Cauda vulpina Monspelienſium, Lob. ic.

*Gramen pratense tomentosum panicula sparsa, C.B.* \* Flachßgras. Gramen tomentosum & Linagrostis, Tab. eriophorum, Dod. Juncus bamybycinus, Lob. ic.

*Gramen sparteum pennatum, C.B.* \* Sedergras. Gramen nonum vel junceum, Dod. plumeum, vulgi. Spartum Austriacum pennatū, Clus. Juba in nostrate est candida. pennarumq; manucodiatæ æmula adeo, ut primū aspicientibus imponat. Prope urbem extra portam S. Georgii sponte nascitur: ob elegantiam tamen colitur etiam in hortis.

*Gramen junceum folio articulato sylvaticum, C.B.* \* Wald Binsengras. Gramen junceum primum vel sylvaticum nemorosum, Tab.

*Gramen junceum folio articulato aquaticum, C.B.* \* Wasser Binsengras. Gramen aquaticum, Tab. aquaticum alterum, Lob. ic.

*Gramen cyperoides latifolium spica rufa, sive caule triangulo, C.B.* \* Breit Cypergras. Gramen cyperoides, Lob. Tab. Graminis quartum genus, Trag.



*Gramen cyperoides angustifolium spinis longis erectis*, C.B. \* Schmall Cypergras. *Gramen palustre majus*, Lob. ic.

*Gramen cyperoides palustre majus spica divisa*, C.B. \* Sumpffig Cypergras. *Gramen cyperinum palustre minus*, Tab. cyperinum parvum aquaticum, Lob. ic.

*Gramen cyperoides mitaceum*, C.B. \* Hirsen Cypergras. *Cyperus graminea*, Lob. ic.

*Gramen arundinaceum spica multiplici*, C.B. \* Rohrgras. *Gramen arundinaceum majus*, Tab. Calamagrostis, Lob.

*Gramen hirsutum latifolium majus*, C. B. \* Haaricht Gras. *Gramen hirsutum nemorosum* Lob. ic. sylvaticum quartum sive pilosum, Tab.

*Gramen dactylon esculentum*, C.B. \* Schwadengras. *Gramen mannae*, Matth. mannae primū, Dod. Tab. mannae esculentū, Lob. Copiose in paludosis, praesertim circa Culstrinum & Spandoviā provenit: Seri tamen potest quoq; in usum culinæ, siquidem semen vulgo Schwaden dictū, si cum lacte coquatur, optimi saporis pulmentū præbet, & nostratib; admodū familiare. Spontanei nostri semen flavet: culti vero semen, quod ex Misnia quandoq; adfertur, albicat, & bonitate saporis alteri tantillū cedit.

*Gramen dactylon folio latiore*, C.B. \* Falsch Schwadengras. *Ischaemon primum*, Tab. vulgare Lob. Plinii, Clus. Sanguinaria Nevenaræ, Trag.

*Gramen paniceum spica aristis longis armata*, C.B.



C. B. \* Senichgras. Gramen paniceum secundum, Tab. Panici effigie gramen aristis circumvalatum, Lob. ic.

*Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa,*  
C. B. \* Baldgras mit flattrigem Hirsenstrauße.  
Gramen miliaceum, Lob. ic. Tab. pratense quartum, Dod.

*Gramen Sorghi panicula erectum,* C. B. \* Sorghengras. Gramen sorghinum, Tab. sorghi effigie, Lob. ic. pratense quintum, Dod.

*Gramen hordeaceum minus & vulgare,* C. B. \* Gerstengras. Hordeum spurium, Tab. spontaneum spurium, Lob. sive triticum murinum, Dod.

*Gramen loliaceum spica longiore,* C. B. \* Sulchgras. Lolium, Matth. Dod. Tab. Lolium & triticum temulentum, Lob. Zizanium, Constant.

*Gramen Parnassi albo simplici flore,* C. B. \* Leberblümlein. Gramen Parnassi, Dod. Eyst. hederaceum, Tab. Gramen Parnassi hederaceum recentiorum, Lob.

*Gratiola centauroides,* C. B. \* Wild Aurin/Grazede. Gratiola, Matth. Dod. Lob. Tab. Gratiola Dei, quorundam.

*Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris,* C. B. Kleine Stachelbeer. Grossularia vulgaris, Clus. Uva crispa, Dod. Lob. Tab. Uva spina, Matth.

*Grossularia spinosa sativa,* C. B. Grosse Spina

nische Stachelbeer. *Grossularia majore fructu*, Clus. Fructus maturi flavent.

*Grossularia spinosa sativa altera folijs latioribus*, C. B. Braune Stachelbeer. *Grossularia fructu obscure purpurascente*, Clus.

*Grossularia acinis hirsutis*. Saußbeer. C. B. videtur hanc ad priorem retulisse.

*Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra*, C. B. Röhre Johannesbeer. Ribes, Officin. vulgaris domestica, Matth. Arabum, Lob. vulgaris fructu rubro, Eyst. Ribesium fructu rubro, Dod.

*Grossularia hortensis majore fructu rubro*, C. B. Eine grosse art röhre Johannesbeer. Ribes major fructu rubro, Eyst. rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus.

*Grossularia hortensis fructu margaritis simili*, C. B. Weisse Johannesbeer. Ribes fructu albo, Eyst. vulgaris fructu albo, Clus.

*Grossularia vulgaris fructu dulci*, C. B. & Clus. Süsser Johannesbeer / Kleine Rosinen vulgo: non tamen sunt Passulæ minores, quippe quæ in Vite nascuntur. Ribes minor fructu dulci, Eyst. candidioribus foliis, Lob.

*Grossularia non spinosa fructu nigro*, C. B. Albesinger / Allandbeer / ob odorem Helenii æmulum. Ribes nigra, Lob. ic. Tab. vulgaris nigro fructu, Clus. fructu nigro, Eyst. Ribesium fructu nigro, Dod. Rustici in vino ardente macerant baccas. & contra calculum utuntur. Ha-

*Halimus seu Portulaca marina*, C.B. Meer-Portulac. *Halimus vulgaris*, Matth. Eyft. *Portulaca marina*, Dod. Lob. Tab.

*Hedera arborea*, C.B. Ephew/Alaub. *Hedera*, Dod. *arborea*, Matth. *corymbola communis*, Lob. Tab.

*Hedera terrestris*, C. B. \* Matth. Dod. Tab. Gunderman/Gundelrebe/Snueddrage. *Humilis hedera* & *Corona terræ*, Lob. *Chamæcissos*, Trag. Fuch. Hujus foliis frequenter adnascitur Excrementum pilulare passim quidem, sed nominatim ad fundamenta ædiculæ, in qua ardeæ aluntur in vivario urbi vicino. Pilularum aliæ nucem juglandē parvam æquant, aliæ sunt minores, non raro binæ coaluerunt. In singulis ramis unicum, quandoque duo folia occupantur ab hoc excremento. Continent vero in se pilulæ singulæ binas aut ternas aliæ per filamenta duriuscula connatas, quarum singulæ cultro apertæ includunt singulos vermiculos sive tarmites. Color pilularum exterior est ex viridi albescens, interdū rufescens: interior ex albidus. *Hederam* hanc cum suo excremento delineari, & forsan primus curavit Leonhardus Turneisserus; quam iconem videre licet sub numero 709. *Herbarii Portatilis*, quod non ita pridem in lucem produxit Exc. D.D. Thomas Pancovius Collega noster perquam honorandus.

*Helenium vulgare*, C. B. \* Aland/Alaunwurzel. *Helenium*, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. *Inula*, & *Enula campana*, vulgi. He.

*Helenium Indicum maximum*, C. B. Grosse Sonnenblume. Corona Solis secunda, Tab. Solis flos Peruvianus, Lob. Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Flos Solis major, Eyst.

*Helenium Indicum ramosum*, C. B. Sonnenblume mit äſten. Corona Solis quinta, Tab. Flos Solis proliſer, Eyst. Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.

*Helenium Indicum flore parvo*. Kleine Sonnenblumen. Id nomen indidimus plantæ, quæ apud nos jam vulgaris, & Bauhino prætermiſſa videtur. Facie externa ſequens Helianthemum reſert, at in cacumine flores luteos exiguos plures gerit, & radice tuberoſa deſtituitur. Folia ſunt anguſta, rigidiuſcula: caulis rubet.

*Helenium (Helianthemum) Indicum tuberoſum*, C. B. Knollen/Erdaartſchrecken. Chrysanthemum latifolium Braſilianum, Eid. in Prodr. Flos Solis Farnesiaſus ſive Aſter Peruvianus tuberoſus, Columnæ. Adenes Cadanenſes ſeu Flos ſolis glanduloſus, Lauremb.

*Helichryſum ſeu Stæchas citrina anguſtifolia*, C. B. \* Rheinblumē/Winterblumen/ gelbe Katzenpoten. Stæchas citrina, Matth. Dod. Coma aurea, Lob. ic. Chryſocome prima vulgaris, Cluſ.

*Helleborus niger hortenſis flore viridi*, C. B. Schwarz Nieſewurz mit grünen blumen. Helleboraſtrum, Lob. Elleborus niger alter, Matth. Veratrum nigrum ſecundum, Dod. Tab. Cluſ.



Clus. Circa festum Nativitatis Domini, aut Januario subsequente flores promit.

*Helleborus niger flore roseo*, C. B. Schwarz Niesewurz mit rosenblumen. Heleborus niger, Lob. niger legitimus, Eyst. Elleborum nigrum Matth. Elleborus niger legitimus, Clus. Veratrum nigrum primum, Dod. Stiriacum, Tab.

*Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore*, C. B. \* Schmalblettrige Niesewurz. Helleborus Hippocratis, Tab. niger ferulaceus Theophrasti, Lob. Pseudohelleborus niger, Eyst. Pseudoelleborum, Matth. Buphthalmum, Dod. Clus. Copiose prope Francofurtum auff den Sebusischen bergen.

*Helleborus albus flore subviridi*, C. B. Weiße Niesewurz. Helleborum album, Matth. Lob. Elleborus albus, Clus. floribus herbaceis, Eyst.

*Helleborine latifolia montana*, C. B. \* Wilde Niesewurz mit breiten blettern. Helleborine, Dod. Lob. prima, Tab. recentiorum secunda, Clus. Epipactis latifolia, Eyst.

*Helleborine flore rotundo, sive Calceolus*, C. B. \* Wilde Niesewurz oder Frauenfuch. Elleborine recentiorum prima, Clus. Calceolus Mariæ, Lob. Eyst. Marianus, Dod.

*Herba mimosa, viva, sensitiva*. Süßlindes Kraut/ quoniam manu contacta marcescit: ablata manu revirescit. Sationem hujus frustra superioribus annis tentavimus: meliorem hoc ipso successum speramus.

He-



*Hesperis hortensis*, C.B. Abendviolen. *Hesperis* tertia, Clus. *Viola matronalis*, Dod. five *Damalcena*, Lob. Adelt flore albo, & dilute purpureo.

*Hesperis montana pallida odoratissima*, C.B. Fremde Abendviolen. *Hesperis* prima & montana, Clus. *pannonica*, Cam. Floris color in nostra obsoletus, crebris venis ex atro purpureis discurrentibus. *Viola noctis* in specie dicitur Hortulanis, quia odor sub vesperam magis intenditur.

*Hieracium majus folio Sonchi vel sonchites*, C.B.\* Habichkraut mit Hasenfohl blettern. *Hieracium majus*, Matth. Lob. *Taraxacon majus*, Lon.

*Hieracium dentis leonis folio obtuso majus*, C.B.\* Habichkraut mit Pfaffenblats blettern. *Hieracium macrorrhizon*, Tab. longius radicatum, Lob.

*Hieracium Chondrilla folio glabro radice succisa majus*, C.B.\* Habichkraut mit Chondrillen blettern. *Hieracium minus*, Matth. Tab. minus præmorsa radice, Lob. quartum, Dod.

*Hieracium capitulum inclinans semine adunco*, C.B. Habichkraut mit hangendem gipffel. *Hieracium facie hedypnois*, Lob. ic.

*Hieracium filiqua falcata*, C.B. Habichkraut mit sichelformigen schoten. *Hieracium Narbonense falcata filiqua*, Lob. *Monspeliacum* & *Narbonense*, Tab. *Cichorium stellatum Creticum*, Hort. Pat.

*Hieracium proliferum falcatum*, C. B. Habichkraut mit sichelformigen schoten und nebenblumen. *Hieracium calyce barbato*, Col. Flos luteus fusca macula in medio notatur.

*Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti*, C. B. Rauch Habichkraut mit knöpflein als Cardobenedicten. *Hieracium echioides*, Tab. Buglossum luteum, Cam. echioides luteum Hieracio cognatum, Lob. ic.

*Hieracium murorum folio pilosissimo*, C. B. \* Harichtes Habichkraut. Auricula muris major, Trag. Pulmonaria Gallorum flore Hieracii, Lob. Claf. Pulmonaria Gallica mas aut aurea, Tab.

*Holosteio affinis, Cauda muris*, C. B. \* Meuse-schwanz. Cauda muris, Dod. Lob. Tab. Myosuros, quorundam, Coronopus sylvestris, Trag.

*Hordeum distichon*, C. B. Grosse Gerste. Hordeum trimestre minus, Tab. binis versibus, Matth. quod spica binos ordines habet. Huic grana majora, aristæ vero breviores.

*Hordeum polystichum vernum*, C. B. & Lob. ic. Kleine Gerste. Hordeum polystichum æstivum, & trimestre polystichum, Tab. Spica quaternis, quinis, vel senis ordinibus est instructa: aristæ longiores, grana vero minora sunt, quam in precedente: pro cerevisia quoque coquenda magis apud nos expetitur, quam illa. *Præcox & serotinum*, Frühl. uñ späte Gerste/non differunt nisi sationis diverso tempore, nimirum circa festum Annunciationis, &

Ur.

Urbani: Hordeum vero *hybernū* Winter-Gerste/ quod scilicet ante hiemem seritur, in quibusdam locis Poloniæ vñinæ coli consuevit, apud nos vero non item. Hordeum *mistum*, Mang-Gerste/ dicitur mistura ex granis Hordei distichi & polystichi confusis.

*Horminum Sclarea dictum*, C. B. Gemeine Scharley. Horminum hortense, Eyf. sylvestre primum, Clus. Scarlea, Lob. Sclarea, Matth. Orvala, Dod.

*Horminum sativum*, C. B. Garten Scharley. Horminum, Matth. Lob. Dod. Tab. minus, Lon. Huic coma foliorum purpurascit plerumque: interdum cærulea est, aut carnei coloris.

*Horminum pratense folijs serratis*, C. B. \* Wiesen Scharley. Horminum sylvestre, Lob. Hormini quarti species prima, Clus. Sclarea sylvestris, Tab. Orvalæ sylvestris species quarta, Dod. Salvia agrestis flore purpureo, & Colus Jovis, Eyf.

*Hyacinthus comosus major purpureus*, C. B. Flattriger Hyacinth. Hyacinthus, Matth. maximus, Tab. comosus major, Lob. comosus spurius, Eyf. Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

*Hyacinthus racemosus cæruleus major*, C. B. Grosser blauer Trauben-Hyacinth. Hyacinthus botryoides major, Eyf. botryoides cæruleus major, Tab. botryoides cæruleus amœnus, Lob. ic.

*Hyacinthus racemosus albus*, C. B. Weißer Trau-

**Trauben-Hyacinth.** *Hyacinthus botryoides lacteus*, Tab. *botryoides flore albo*, Clus. Eyst. *Dipcadi candidis floribus*, Lob.

*Hyacinthus racemosus caeruleus minor juncifolius* C. B. Kleiner blauer Trauben-Hyacinth. *Hyacinthus racemosus*, Dod. *botryoides vulgaris*, Lob. ic. *botryoides primus & minor*, Clus. *caeruleus minor vel sextus*, Tab.

*Hyacinthus racemosus moschatus*, C. B. Moschriechender Trauben-Hyacinth. *Hyacinthus spurius recentiorum alter*, Dod. *botryoides Chalcedonicus muscatus*, Tab. *Muscari obsoletiore flore*, Clus. *Muscari majus obsoleto albo flore*, Eyst. *Dipcadi Chalcedonicum & Italorum*, Lob. *Bulbus vomitorius*, Matth.

*Hyacinthus corniculatus flore muscoso*. Schönerer Hyacinth. Flores sunt valde exigui, dense positi, & fere muscosi, coloris ex caeruleo albicantis, aut obsoleti. Extenduntur tandem in spicas, aut cornua quasi: unde corniculata hæc species merito appellari potest, quam C. B. præterisse videtur.

*Hyacinthus oblongo flore caeruleus major*, C. B. Hyacinth mit länglichen blauen blumen. *Hyacinthus Hispanicus*, Clus. non scriptus, Dod. *Anglicus*, Eyst. *Anglicus & Belgicus*, Lob.

*Hyacinthus orientalis caule maculato*, C. B. Orientalischer Hyacinth mit fleckigem stengel. *Hyacinthus orientalis*, Matth. Dod. Clus. *caeruleus*, Tab. Eyst. *orientalis Græcus*, Lob.

Hy-

*Hyacinthus orientalis caule folioso*, C. B. Orientalischer Hyacinth mit blettrigem stengel. *Hyacinthus Asiaticus phyllophoro caule*, Clus. cur. post.

*Hyacinthus orientalis maximus*, C. B. Großer Orientalischer Hyacinth. *Hyacinthus Orientalis major*, Dod. *orientalis major polyanthos*, Lob. Tab. *orientalis polyanthos*, Clus. *orientalis alter*, Matth.

*Hyacinthus orientalis albus primus*, C. B. Orientalischer Hyacinth mit weissen blumen. *Hyacinthus orientalis albus*, Lob. ic. *niveus*, Clus. Eyft.

*Hyacinthus orientalis flore duplici*, C. B. & Eyft. Orientalischer Hyacinth mit gedoppelten blumen. *Hyacinthus flore duplici ex albo virecente*, Clus. cur. post.

*Hyacinthus orientalis flore ceruleo pleno*, C. B. & Eyft. Orientalischer Hyacinth mit gefüllten blumen.

*Hyacinthus orientalis serotinus*, C. B. Später Orientalischer Hyacinth. *Hyacinthus orientalis serotinus mixtus*, Eyft.

*Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus*, C. B. Gestirneter Hyacinth mit zwey blettern. *Hyacinthus albicans seu fœmina*, Fuch. *Hyacinthi Germanici liliflori minor species*, Lob. *Narcissus cæruleus*, Trag. *Bulbus vomitorius*, Lon.

*Hyacinthus stellaris trifolius*, C. B. Gestirneter Hyacinth mit drey blettern. *Hyacinthus Fuchsii*,



Dod. stellatus, Clus. stellatus flore cæruleo, Eyst. Germanicus liliflorus stellaris vel Flos Martius stellatus Germanicus, Lob.

*Hyacinthus stellaris autumnalis major*, C. B. Gestirneter Herbst Hyacinth der grosse. Hyacinthus autumnalis major, Clus. Lob. Dod. stellatus autumnalis angustifolius major, Eyst.

*Hyacinthus stellaris autumnalis minor*, C. B. Gestirneter Herbst Hyacinth der kleine. Hyacinthus autumnalis, Lob. autumnalis minor, Dod. Clus. Eyst.

*Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus*, C. B. Indianischer Hyacinth mit zwiebllicher wurzel. Hyacinthus stellatus Peruanus, Clus. Eyst. Lob. adv. part. sec. Adest flore cæruleo, & flore albo.

*Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi*, C. B. Indianischer Hyacinth mit knolliger wurzel. Hyacinthus Indicus tuberosa radice, Robin. major Indicus tuberosa radice, Swertii. Flos albicans mense demum Octobri aut Novembri prodit, gratissimum spirans odorem.

*Hyoscyamus vulgaris vel niger*, C. B. \*Bilsenfraut. Hyoscyamus, Matth. vulgaris, Eyst. niger, Dod. Lob. niger vulgaris, Clus. primus, Tab.

*Hyoscyamus albus major*, C. B. Weiß Bilsenfraut. Hyoscyamus tertius, Diosc. quartus, Plin. albus, Matth. Dod. Lob. Eyst. secundus, Tab.

*Hyoscyamus Creticus luteus*, C. B. Gelb Bilsenfraut aus Creta. Hyoscyamus Creticus, Clus.

Hy-

*Hypericum vulgare*, C.B.\* Johanneskraut.  
Hypericum, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. Herba  
perforata, Trag.

*Hypericum bifolium glabrum non perfora-  
tum*, C. B.\* Harthem. Hypericum in dumetis  
nascens, Trag. Alcyrum, Matth. ep. Androsæ-  
mum, Fuchf.

*Hyssopus officinarum cærulea, sive spicata*,  
C.B. Blauer Ysop. Hyssopus, Tab. flore cæruleo,  
Eyft. vulgaris, Dod. Clus. Arabum, Lob. Hyssop-  
um, Matth.

*Hyssopus vulgaris alba*, C. B. Weisser Ysop.  
Hyssopus flore albo, Cam. Eyft. albis floribus u-  
trinque digestis, Lob. ic.

*Hyssopus flore rubro*, C.B. Rother Ysop. Hyf-  
sopus Arabum, Tab. Arabum flore rubro, Lob.  
Cam. Eyft.

*Hyssopifolia*, C.B.\* Gras-Ysop/Gras-Polen/  
Cord. ob. Hyssopoides, Cam. Gratiola minor,  
Ges.col. Nostræ flores cærulei.

*Jacea nigra pratensis latifolia*, C.B.\* Schwar-  
liche Glockblume mit breiten blettern. Jacea nigra,  
Tab. nigra flore purpureo, Eyft.

*Jacea nigra laciniata*, C. B.\* Schwärzliche  
Glockblume mit außgeschweifften blettern. Jacea  
nigra, Dod. vulgaris, Lob. Austriaca sexta, Clus.

*Jacea incana cyani capitulis*, C. B. Grawe  
Glockblume. Jacea incana altera Cyani aut Jaceæ  
capitulis, Adv. Stœbe incana altera, Lob. ic.

*Jacea olea folio capitulis simplicibus*, C. B. Glockblume mit oel-blettern. *Parmica altera*, Matth. *Austriaca*, Lob. Clus. Dod. Cam.

*Jacobaea vulgaris laciniata*, C. B. \* Jacobs-  
fraut. *Jacobæa*, Dod. *vulgaris*, Clus. *Jacobæa Senecio*, Lob. *Herba Jacobæa*, Tab. *Senecio major si-  
ve Flos S. Jacobi*, Matth.

*Jacobaea maritima*, C. B. Wollich Jacobs-  
fraut / Aschfraut. *Jacobæa Pannonica prima*,  
Clus. *Erigerum tomentosum alterum*, Lob. Ci-  
neraria, Dod.

*Jasminum vulgatius flore albo*, C. B. Gemeis-  
ner Jasmin. *Jasminum*, Dod. *album*, Tab. *flore  
albo*, Eyst. *Gelseminum*, Matth. *vulgatius*, Lob.

*Jasminum humilius magno flore*, C. B. Spa-  
nisch Jasmin mit grossen blumen. *Jasminum can-  
diflorum*, Tab. *Gelseminum Catalonicum*, Eyst.  
*Chamægelseminum grandiflorum*, Lob.

*Jasminum luteum odoratissimū*, C. B. Jasmin  
mit gelben blumen. *Jasminum luteum*, Tab. Lob.  
ic. *flore luteo*, Eyst. *Gelseminum luteum*, Adv.

*Jasminum humilius luteum*. Gelber wolrie-  
chender Jasmin. *Gelseminum Indicum luteum  
odoratissimum*, Ferrar.

*Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum*,  
C. B. Rauten-Jasmin. *Polemonium Monspelien-  
sium*, Lob. Cam. *Trifolium fruticans*, Dod. Tab.

*Jasminum folijs laciniatis flore cæruleo*. Bla-  
wer Jasmin. *Jasminum Persicum flore cæruleo*  
leu

feu Lillach folio inciso Cornuti, Hort. Lugd. & Grœning. An Ligustrum foliis laciniatis, C. B.

*Jasminum millefolij folio*, C. B. Quamoclit, Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Ponæ Ital. Quamoclit, Cam. sive Jasminum Americanum, Clus. cur. post. Sub climate nostro difficulter educatur.

*Ilex aculeata cocciglandifera*, C. B. Chermesbaum, Scharlachbaum. *Ilex coccifera*, Tab. coccigera, Clus. minor coccigera, Dod. Coccus insectoria, Lob. Coccum insectorium, Matth. Elegan-tem & ante hæc non visam his locis arbusculam inter alia rariora ex Brabantia accipiebat Ao. 1658. Hortus Elect. Berolinensis aulicus.

*Ilex aculeata baccifera folio sinuato*, C. B. \* Hüßl/Steckpalmen. *Ilex aquifolia*, Lon. Aquifolium, Matth. Lob. Tab. Agrifolium, Dod. Viret perpetuo, & ad sepimenta horti aptissima.

*Imperatoria major*, C. B. Meisterwurz. Imperatoria, Matth. Lob. Tab. Astrantia, Dod. Clus. Ostrutium, Lon.

*Intybus sativa latifolia*, sive Endivia vulgaris, C. B. Breite Endivien/Winter-Endivien. Intybus major, Matth. Intybum sativum, Dod. sativum latifolium, Lob. Intybus major sativa, sive Cichorium domesticum, Tab. Seritur circa festum Joannis, & circa Jacobi transplantatur: at Sommer-Endivien est species Lactucæ.

*Intybus sativa angustifolia*, C. B. Schmale



**Endivien.** Intubus sive Endivia minor, Matth. Intybus minor prima, & Intybum minus album, Tab. Seriola aut Endiviola, Adv. Hæc est Scariola Off. cujus semen recensetur inter quatuor femina frigida minora.

*Intybus crispa*, C. B. Matth. Tab. Krause Endivien. Seris sive Intybus crispa, Adv. Endivia Romana crispa, Cam.

*Iris vulgaris Germanica sive sylvestris*, C. B.\* Blauwe Wald Iris mit gekneltzter wurzel / sive radice geniculata cujusmodi etiã sunt novem subsequentes. Iris sylvestris, Matth. Tab. cerulea, Dod. latifolia major vulgaris, Chus. nostras, Offic. Hujus in Medicina usus ad subducendas aquas. Sponte quidem crescit: sed in hortos translata, cultura speciosior redditur.

*Iris hortensis latifolia*, C. B. Garten Iris mit breiten blettern. Iris, Tab. Dod. domestica, Matth. vulgaris, Lob. latifolia vulgaris. cærulea, Eyst.

*Iris hortensis pallide cærulea*, C. B. Garten Iris mit blaßblauen blumen. Iris latifolia major obsoleta, Chus. dilute cærulea involucro albo, Tab. cujus flores aquæ cyaneum colorem referunt, Dod.

*Iris hortensis alba Germanica*, C. B. Garten Iris mit weissen blumen. Iris alba, Tab. candida, Dod. vulgaris candidis floribus, Lob. ic.

*Iris Sufiana flore maximo ex albo nigricante*,  
C. B.



*C.B. Susianische Iris. Iris latifolia major prima.*  
*Clus. Chalcedonica variegata, Lob. Tab. Chalcedonica latifolia, Eyst.*

*Iris Asiatica cerulea polyanthos, C.B. Asiatische Iris. Iris latifolia major secunda, Clus. Dalmatica major, Tab. Lob. ic.*

*Iris biflora flore minore, odore lilij convallium,*  
*C. B. Zweymahl blühende Iris. Iris biflora Lusitanica, Lob. Dod. latifolia major, 22. Clus.*

*Chameiris flore purpureo flavescente, C. B. Zwercf Iris mit purpurgelben blumen. Chamæiris latifolia minor octava, Clus. Eyst.*

*Chameiris flore pallido & albo, C. B. Zwercf Iris mit blaß und weissen blumen. Chamæiris latifolia minor quarta, Clus. Huic similis Chamæiris latifolia minima, Eyst.*

*Chameiris flore luteo, vel candido, C. B. Kwerck Iris mit gelben oder glanzweissen blumen. Chamæiris lutea altera, Lob. ic. Iris minor lutea, Dod. Huc referenda Chamæiris flore argenteo, & flore candido, Eyst.*

*Iris bulbosa latifolia caule donata, C. B. Zwiebliche Iris mit breiten blettern. Iris Anglicana major flore violaceo, Eyst.*

*Iris bulbosa latifolia candida, C. B. Iris bulbosa Anglicana major flore candido, Eyst.*

*Iridis bulbosa angustifolia variorum colorum.*  
*Zwiebliche Irides mit schmallen blettern / vielerley farben.*

*Iris*

*Iris tuberosa folio anguloso*, C. B. Knollige Iris mit eckigen blättern. *Iris tuberosa*, Lob. Eyst. *bulbosa præcox*, Clus. *tuberosa obscure viridi colore*, Suert. *Hermodystylus verus*, Matth. Tab.

*Juncus acutus panicula sparsa*, C. B. \* Scharffe Binsen. *Juncus acutus*, Dod. *acutus vulgatus*, Lob. ic.

*Juncus maximus sive Scirpus major*, C. B. \* Grosse glatte Binsen. *Juncus palustris major*, Trag. Tab. *grandis Holoscheenos*, Dod. *aquaticus maximus*, Lob. ic.

*Juncus levis panicula sparsa major*, C. B. \* Glatte Binsen mit flattrigem strauße. *Juncus levis*, Dod. *lævis vulgaris panicula sparsa*, Lob. ic.

*Juncus levis panicula non sparsa*, C. B. \* Glatte Binsen mit gedrungenem strauße. *Juncus*, Matth. *lævis glomerato flore*, Lob. ic. *palustris minor*, Tab.

*Juncus floridus major*, C. B. \* Blumen-Binsen. *Juncus floridus*, Matth. *cyperinus floridus*, Tab. *cyperoides paludosus*, Eyst. *cyperoides floridus paludosus*, Lob. *Gladiolus aquaticus*, Dod.

*Juniperus vulgaris fruticosa*, C. B. \* Wachholder staude. *Juniperus*, Matth. Dod. Lob. *vulgaris*, Clus. *baccifera*, Tab.

*Juniperus vulgaris orbor*, C. B. \* Wachholderbaum. *Juniperus vulgaris celsior & arborescens*, Clus. *major sativa*, Cast.

*Lactuca sativa*, C. B. Dod. Tab. Gemeine Lactuse. *Lactuca florescens*, Matth. La-

*Lactuca crispa*, C. B. Matth. Dod. Krause Lactuse. *Lactuca crispa prima & secunda*, Tab. tertia, Trag. *crispa non capitata*, Lob.

*Lactuca folijs Endiviae*, C. B. Weiß Sommer Endivien. *Lactuca intybacca*, Endivien=Lattig/Tab. *Lactucæ quartum genus*, Matth. *Endivia major*, Trag. Lon.

*Lactuca folio obscurius virente, semine nigro*, C. B. Braun Sommer Endivien. *Lactuca secunda*, Dod. *Romana dulcior, nigriore & Scariolæ hortensis folio*, Lob. *adv. nigra*, Cæsalp. *Folia colligata, ut intybi albescunt*.

*Lactuca folio oblongo. Lange Lactuse. An Lactuca folio oblongo acuto*, C. B. *Vincienda hujus quoque folia, sicut Intybi. Vulgo vocatur Carpentini oder Capuzin=Lactuse.*

*Lactuca capitata*, C. B. Matth. Dod. Tab. Kopff=Lactuse. *Lactuca sessilis*, Lon Gesn. *capitata crispis bassicæ foliis*, Lob. *obs. caputia*, Cæsalp. Variat colore foliorum triplici: unde *Lactuca capitata alba*, Weiße Kopff=Lactuse: *flava*, Gelbe Kopff=Lactuse: *viridis*, Grüne Kopff=Lactuse. Illis semen album, huic nigricans est.

*Lactuca capitata spadicea. Braune oder Spanische Kopff=Lactuse. Lactuca maculosa*, C. B. *Romana*, Matth. *rubra*, Cæsalp. *fusci ac rubente purpurei coloris*, Dod.

*Lactuca prolifera. Vielsöpffige Lactuse. Unicauli duo, tria aut quatuor capita innascuntur. Polycephalos vocari posset.* La-

*Lactuca sylvestris costa spinosa*, C. B. \* Wilde lactuse. *Lactuca sylvestris*, Matth. Dod. Seris domestica, Lob.

*Lamium purpureum fœtidum*, folio subrotundo, C. B. \* Taube Nessel mit rundlichen blettern. Galeopsis, Diosc. secunda, Tab. Urtica non mordax, Lob. iners altera, Dod. Floris color variat.

*Lamium purpureum vel album non fœtens folio oblongo*, C. B. \* Taube Nessel mit länglichen blettern. *Lamium purpureum* & *album*, Tab. Galeopsis, Matth. vera Dioscoridis, Clus. Urtica iners sive *Lamium primum*, Dod. Flos colore variat.

*Lamium folio oblongo luteum*, C. B. \* Taube Nessel mit gelben blumen. *Lamium luteum*, Tab. Lob. ic. Adv. Galeopsis flore croceo, Trag. Urtica iners tertia, Dod.

*Lamium maximum sylvaticum fœtidum*, C. B. \* Grosse stinckende taube Nessel. Urtica herculea, Tab. sylvana, Lon. Galeopsis legitima, vel vera Dioscoridis, Clus.

*Lamium montanum Melissæ folio*, C. B. Taube Nessel mit Melissen blettern. *Melissa Fuchsi*, Cam. Eyst *Melissophyllum Fuchsi*, Lob.

*Lamium peregrinum sive Scutellaria*, C. B. Fremde taube Nessel/Scutellaria genandt. *Scutellaria*, Cortusi. Cassida, Columnæ. In Prodomo describitur.



*Lapathum hortense seu Spinachia semine spinoso*, C. B. Spinat mit stachlichem samen. *Spinacia*, Matth. Lob. *Spinachia*, Dod. Tab.

*Lapathum hortense seu Spinachia semine non spinoso*, C. B. Spinat mit glatten samen. *Spinachia nobilis & prima*, Trag. Hæc priore præstantior. Iconem exhibet Mattioli Bathini pag. 362. *Spinachia* verò *fragifera* est species *Atriplicis*.

*Lapathum folio acuto plano*, C. B. \* Spitzes Mangolt oder Grindwurz / mit flachen blettern. *Lapathum acutum*, Lob. Dod. *Oxylapathum*, Matth.

*Lapathum folio acuto crispo*, C. B. \* Spitzes Mangolt mit krausen blettern. *Lapathum acutum crispum*, Tab.

*Lapathum folio acuto rubente*, C. B. \* Spitzes Mangolt mit rothen blettern. *Lapathum sanguineum*, Lob. *rubens*, Dod. *Sanguis Draconis herba*, Lon.

*Lapathum minimum*, C. B. \* & Tab. Gar fleiner Mangolt. *Lapathum acutum minimum*, Lob. ic.

*Lapathum unctuosum*, C. B. \* Smierig Mangolt / Guter Heinrich. *Bonus Henricus*, Matth. Tab. Trag. *Tota bona*, Lob. Dod.

*Lapathum folio subrotundo*, C. B. \* Mangolt mit rundlichen blettern. *Lapathum folio minus acuto*, Lob. ic. *Hippolapathum sylvestre*, Tab.

*Hip.*



*Hippolapathum latifolium*, C.B. Münchrhä-barbar. Hippolapathum, Matth. fativum, Tab. fativum latifolium, Lob. sive Rhabarbarum Monachorum, Dod. Cam. Patientia, vulgi. Adest forma foliorum tum longa, tum rotunda.

*Lapathum Ægyptiacum lactescens siliqua Asclepiadis*, C.B. Grosse Esula Indica. Apocynum Syriacum, seu Palæstinum, sive Ægyptiacum, Clus. Beidelsar, Alpin. Esula Indica communiter.

*Lapathum Ægyptiacum sive Esula Indica minor*. Kleine Esula Indica. Apocynum flore rubro umbellato, forte dici quoque posset. An hyemem apud nos, sicut antecedens ferat, nondum fuit tentatum.

*Lapathum aquaticum folio cubitali*, C.B.\* Groß wasser Mangolt. Lapathum palustre prius, Tab. Hydrolapathum majus, Lob. Rumex palustris, Trag.

*Lapathum aquaticum minus*, C.B.\* Klein wasser Mangolt. Hydrolapathum minus, Lob. Tab.

*Lappa major*, Arcium Dioscoridis, C.B.\* Große Kletten. Personata, Lob. major, Matth. Bardana sive Lappa major, Dod. descr.

*Lappa minor*, Xanthium Dioscoridis, C.B.\* Kleine Kletten. Xanthium, Matth. Dod. Tab. sive Strumaria, Lob.

*Lathyris major*, C.B. Springförner/quoniam semen maturum facile exsilit. Lathyris, Matth. Dod.

Dod. Catapauca minor, Lob. Tab. Cataputia minor secunda, Trag. vulgaris, Tartago Hispanorum, Eyst.

*Lathyrus sativus flore fructuq; albo*, C. B. Same Platt-erbsen mit weissen blumen. *Lathyrus leguminosa angustifolia*, Tab. angustiore gramineo folio, Lob. Aracus alter sive *Lathyrus minor*, Dod. *Cicerula*, Lon.

*Lathyrus sativus flore purpureo*, C. B. Same Platt-erbsen mit purpurblumen. *Lathyrus flore purpureo*, Cam. Aracus sive *Cicera*, Dod.

*Lathyrus sylvestris major*, C. B. \* Grosse wilde Platt-erbsen. *Lathyrus sylvestris*, Dod. Clus. *Lathyrus sylvestris*, Eyst.

*Lathyrus angustifolius semine maculoso*, C. B. Aegyptische Platt-erbsen mit scheckichten samen. *Cicerula Aegyptiaca*, Clus. Aracus Hispanicus sive *Lathyrus Aegyptiacus*, Cam. Huc referri debet *Lathyrus gramineus Montis Baldi*: semen enim huic similiter variegatum, licet paullo rotundius.

*Lathyrus arvensis repens tuberosus*, C. B. \* Knollige Platt-erbsen. Glandes terrestres, Clus. Terræ glandes, Dod. Lob. Chamæbalanus, Tab. Apios, Trag. Pseudapios, Matth. Glans terræ & Pseudapios, Eyst. An *Cicerula subterranea*, quorundā.

*Lathyrus sylvestris luteus foliis Viciae*, C. B. \* Wilde Platt-erbsen mit wicken-blettern und gelben blumen. *Vicia*, Tab. Legumen terræ glandibus simile, Dod.

*Lavandula latifolia*, C.B. Spica oder Spicanarde/Trag. Layandula, Dod. mas, vulgo. flore cæruleo, Eyst. altera longiore folio & spica, Clus. Nardus Italica, Matth. Lob.

*Lavandula angustifolia*, C.B. Lavendel/Trag. Lavendula, Matth. Lon. fœmina, vulgo. brevior folio & spica, Clus. Spica lavendula, Lob. Pseudonardus fœmina, Matth. Spica vulgaris flore cæruleo, Eyst.

*Lavandula folio dissecto*, C.B. Lavendel mit zerschnittenen bletteren. Lavandula secunda, Tab. multifido folio, Clus. Lob.

*Laureola sempervirens flore viridi*, C.B. Kellershals mit grünen blumen. Laureola, Dod. mas, quibusdam. Daphnoides, Tab. sive Laureola, Lob. Hæc hyeme reponenda, sequens in horto perdurat.

*Laureola folio deciduo flore purpureo*, C.B. Kellershals mit purpur blumen. Laureola fœmina & Mezereum, Off. Mesereum Germanicum, Lob. Daphnoides flore purpureo, Tab. Chamælea Germanica, Dod. Laureola, Eyst. Flores edit circa festum Nativitatis Dominicæ, aut menle Januario.

*Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente*, C.B. Zapffenfraut. Hippoglossum, Matth. Dod. Lob. Eyst. Uvularia, Lon.

*Laurus vulgaris*, C.B. Lorbeerbaum. Laurus, Trag. Lob. Eyst. tenuifolia, Matth. mas, Tab. altera species, Dod.

Lau-

*Laurus sylvestris Corni fœminæ folijs hirsutis*,  
C.B. *Laurus Tinus*. *Laurus tinus cœrulea bacca*,  
Adv. Lob. ic. *Tinus primus*, Tab. Clus.

*Laurus Americana*. Americanischer Lorbeer-  
baum. In Brabantia vulgo Caneelboom appellant.  
Superioribus annis alebatur quoque in Horto  
Patavino, dicebaturque à Præfecto Excell. D. Ge-  
orgio a Turre *Laurus Mexicana*. Mexicanam au-  
tem vocari partem Americæ septentrionalem, no-  
tum est satis.

*Lens vulgaris*, C. B. *Linsen*. *Lens*, Tab. minor,  
Lob. Dod. *vulgaris sive agrestis*, Trag.

*Lens major*, C. B. & Tab. *Grosse Linsen*. *Lens*,  
Matth. Lob. *Italica*, Cam. *fativus* & *Lenticulæ* al-  
terum genus, Trag.

*Lenticula palustris vulgaris*, C. B. \* *Wasser*  
*Linsen*. *Lenticula palustris*, Tab. Trag. *Lens pala-*  
*ustris*, Dod. Matth. Lob.

*Lenticula aquatica trifulca*, C. B. \* *Wasser*  
*Linsen mit dreyspitzigen blettern*. *Hederula palu-*  
*stris*, Tab. *aquatica*, Lob. ic.

*Lentiscus vulgaris*, C. B. *Mastrirbaum*. *Len-*  
*tiscus*, Matth. Dod. Clus. Lob. Lon.

*Lepidium latifolium*, C. B. *Breites Pfeffer-*  
*fraut*. *Lepidium sive Piperitis*, Trag. Matth. *Lepi-*  
*dium Aeginetæ*, Tab. Plinii, Lob. Dod.

*Lepidium Dentellaria dictum*, C. B. *Dentella-*  
*ria* oder *Bleyfraut*. *Dentaria sive Dentillaria*,  
Lob. Plumbago, Clus. Tab. *Molybdæna Plinii*,  
Cam. & *Crepanella Italorum*. H 2 *Leu-*

*Leucoium bulbosum vulgare*, C. B. Schneetropffen. *Leucoium bulbosum primū*, Tab. hexaphyllon, Dod. minus, Eyft. præcox majus, Clus. *Leuconarcissolirion paucioribus floribus*, Lob.

*Leucoium bulbosum majus sive multiflorum*, C. B. Grosse Schneetropffen. *Leucoium bulbosum serotinum*, Eyft. polyathemum, Dod. multiflorum, Tab. *Leuconarcissolirion pratense vernum*, Lob.

*Leucoium bulbosum trifolium majus*, C. B. Drenblettrige Schneetropffen die grossen. *Leucoium bulbosum secundum*, Tab. præcox Byzantinum, Clus.

*Leucoium bulbosum trifolium minus*, C. B. Drenblettrige Schneetropffen die kleinen. *Leucoium bulbosum triphyllen*, Dod. præcox minus, Clus. *Leuconarcissolirion minimum*, Lob.

*Leucoium incanum majus*, C. B. Graubleittrige Leucoje die grosse. *Leucoium album*, Matth. Lob. Tab. candidum majus, Dod. flore albo simplici, Eyft. *Viola candida*, Trag.

*Leucoium incanum purpureum vel rubrum*, C. B. Graubleittrige Leucoje mit Purpurblumen. *Leucoium purpureum*, Tab. Matth. Flore rubro simplici, Eyft. *Viola purpurea*, Lob. Trag.

*Leucoium incanum majus multiplex*, C. B. Graubleittrige Leucoje die gefüllte. *Leucoium multiplici flore*, Dod. *Leucoium sive Viola purpurea flore pleno*, Lob. ic.

Leu-



*Leucoium incanum majus variegatum pleno flore*, C. B. Graubleittrige Leucoje mit gesprengter voller blume. *Leucoium sive Keyri viola purpurea variegata*, Suert.

*Leucoium folio viridi album odoratissimum*, C. B. Grünbleittrige Leucoje mit wolriechenden weissen blumen. *Leucoium fruticosum folio viridi flore albo odorato* Camerarii, Eyst.

*Leucoium luteum vulgare*, C. B. Einfache gelbe Viole. *Leucoium luteum*, Dod. *Lob. aureum*, Matth. *sativum luteum*, Clus. *Flos Cheiri simplex minor*, Eyst.

*Leucoium luteum magno flore*, C. B. Einfache gelbe Viole mit grossen blumen. *Flos Cheiri simplex medius*, Eyst.

*Leucoium luteum pleno flore maj9*, C. B. Grosse gefülte gelbe Viole/Gulden sacken. *Leucoium flore luteo pleno majus*, Eyst.

*Leucoium luteum pleno flore minus*, C. B. Kleine gefülte gelbe Viole. *Leucoium luteum flore multiplici*, Dod. *flore luteo pleno minus*, Eyst. sive *Keiri duplici flore*, Lob. ic.

*Libanotis latifolia altera*, C. B. Hirschkraut/Hirschwurzel. *Libanotis Theophrasti*, Lob. *alba major*, Cervaria quorundam.

*Lichen petraeus latifolius*, sive *Hepatica fontana*, C. B. \* Breiter Steinmoß. *Lichen*, Matth. Dod. *primus*, *Hepatica prima*, Tab.

*Lichen petraeus stellatus*, C. B. \* Gestirnter Steinmoß. *Lichen secundus*, Lob. *Hepatica secunda*, Tab.

*Lichen petraeus umbellatus*, C. B. \* Steinmoß mit dolden. *Lichen tertius*, Lob. *Hepatica tertia*, Tab.

*Ligusticum vulgare*, C. B. Liebstöckel / Lebstock. *Ligusticum*, Tab. *sativum*, Trag. *Levisticum*, Lob. *vulgare*, Matth. Dod. *Laserpitium Germanicum quorundam*.

*Ligustrum Germanicum*, C. B. Hartriegel / Rheinwende. *Ligustrum*, Matth. Lob. Tab. Eyst. *vulgare*, Trag. *Phyllirea*, Dod.

*Ligustrum folio obtusiore*. Rheinwende mit stumpffen blettern. A præcedenti non differt, nisi foliis minus acutis: potestque haberi pro illius solummodo varietate.

*Lilium album flore erecto & vulgare*, C. B. Weiße lilie. *Lilium*, Matth. *album*, Trag. Fuch. Tab. Eyst. *candidum*, Lob. Dod.

*Lilium album flore pleno spicato*. Weiße lilie mit gefülten blumen. Elegantissimi hujus lilii primum bulbum huc misit ante decennium Roma, deinde Argentoratum. Oneratur autem spica tot foliis, ut in cacumine posita explicari nequeant.

*Lilium purpureo croceum majus*, C. B. Purpursaffran lilie die grosse. *Lilium purpureum majus*, Lob. Dod. Eyst. *aureum majus*, Tab. *Hemerocallis Dioscoridis*, Matth.

*Lilium purpureocroccum minus*, C. B. Purpursaffran Lilie die kleine. *Lilium purpureum minus*, Lob. *Dod. puniceum non bulbiferum minus*, Clus.

*Lilium bulbiferum minus*, C. B. Zwiebeltragende Lilie. *Lilium ctuentum bulbiferum*, Eyst. *purpureum tertium*, Dod. *cruentum quartum secundum caulem bulbulis donatum*, Lob.

*Lilium floribus reflexis montanum*, C. B. Purpurfarben Türckischer Bund. *Lilium sylvestre*, Dod. *montanum*, Lob. *montanum flore purpurascente punctatum*, Eyst. Martagon, Matth. Hoc in sylvis circa Furstenwalde etiam sponte provenit: magnitudine tamen hortensi multum cedit.

*Lilium floribus reflexis albis non punctatis*, C. B. Weiß Türckischer Bund. *Lilium montanum minus album non punctatum*, Eyst. *montanum albo flore*, Clus. Martagon imperiale niveum sine maculis, Bry.

*Lilium Byxantinum miniatum polyanthos*, C. B. Lichtrohter Türckischer Bund. *Lilium Byxantinum miniato saturatiore flore polyanthos*, sive Zufiniare, Clus. Chalcedonicum miniatum præcox, Lob. adv. part. 2. Byzantinum ferotinum, Eyst.

*Lilium floribus reflexis flavum angustifolium*, C. B. Gelber Türckischer Bund. *Lilium montanum flavo flore*, Lob. adv. part. 2. *montanum flore luteo punctatum & non punctatum*, Eyst. monta-

num flavo flore maculis distinctum & non distinctum, Clus.

*Lilium sive Corona imperialis*, C. B. & Lob. Kayserkrone mit einer reihe blumen. Corona imperialis, Dod. Tab. Eyst. Tufai sive Lilium Persicum primum, Clus. Flos communiter rubet: adest tamen etiam Corona imperialis flore luteo aut citrino potius, die gelbe Kayserkrone.

*Lilium sive Corona imperialis flore pleno*. Gefülte Kayserkrone. Singuli flores duodecim & pluribus foliis constant.

*Lilium sive Corona imperialis multiflorum latog; caule*, C. B. Kayserkrone mit einem platten breiteren stengel und vielen blumen. Corona laticaulis, Lob. adv. part. alt. imperialis polyanthes, Eyst. Tufai polyanthes, Clus. Talis proveniebat in horto Elect. Berolinensi aulico A. 1661. eratq; prorsus similis illi, quam pingit Hortus Eystetenensis. Nostræ caulis duos transversos digitos latitudine æquabat: flores in vertice viginti perfecti, & quatuor imperfecti. P. Lauremberg l. 1. Horticult. c. 19. tales per artem fieri posse Coronas asserit. Ex observatione Clusii l. 2. Hist. plant. c. 1. istiusmodi Coronæ sequente anno ad ingenium redeunt, proferuntque caulem rotundum, cum ternis, senis, octonisve floribus: id quod & nostræ usu venit. Unde colligere licet, monstrum potius esse, ex abundantia materiæ natum, quam peculiarem speciem.

*Lilium sive Corona imperialis duplici corona,* C. B. Keyserkrone mit zwey reihen blumen übereinander. Corona imperialis florum classe duplici, Eyf. phoenicea duplici corona aut serie florum, Lob. ic.

*Lilium persicum,* C. B. Dod. Lob. Tab. Eyf. Persische Lilie. *Lilium Sufianum,* Clus.

*Lilium luteum asphodeli radice,* C. B. Gelbe Aphodil-Lilie. *Lilium non bulbosum luteum,* Dod. *Asphodelus liliaceus,* Eyf. *liliaceus luteus,* Tab. *Liliasphodelus luteo flore,* Clus. *Liriosphodelus luteus liliflorus,* Lob.

*Lilium rubrum asphodeli radice,* C. B. Rote Aphodil-Lilie / Tage-Lilie. *Hemerocallis quorundā.* *Lilium fatuum,* Eyf. non bulbosum obsoleto colore rubens, Dod. *Liliasphodelus puniceus,* Clus. *Liriosphodelus phoeniceus,* Lob. *Asphodelus liliaceus rubeus,* Tab.

*Lilium convallium album,* C. B. \*Weisse Ma-Mayenblümlein / Lilien-Convallien. *Lilium convallium,* Trag. Matth. Dod. Tab. Clus. vel vernum Theophrasti, Lob. Copiosissime im Blumenthal.

*Lilium convallium flore rubente,* C. B. Rötliche Ma-Mayenblümlein. *Lilium convalliū flore incarnato,* Eyf. rubrum, Tab. floribus sive verubentibus, Lob. ic.

*Lilium convallium minus,* C. B. \*Kleine Ma-Mayenblümlein / Einblat. Unifolium, Trag. Dod. Tab. Eyf. Monophyllon, Lob. Gramē Parnassi, Matth.



*Limonium maritimum majus*, C. B. Limonenfraut. Limonium, Matth. Lob. primum, Tab. Valerianæ rubræ similis, Dod. Behen rubrum, quorundam.

*Limonium peregrinum folijs asplenij*, C. B. Syrisch Limonium. Limonium peregrinum, Clus. cur. post. Syriacum, Eyst. Limonii elegans genus, Rauwolfii.

*Linaria vulgaris lutea flore majore*, C. B. \* Gemein Glachsfraut / Leinfraut. Linaria vulgaris, Trag. Eyst. prima, Dod. Osyris, Matth. Fuch. Lob. major, Tab.

*Linaria folioso capitulo luteo major*, C. B. Glachsfraut mit blettrigen Knöpflein. Linaria aurea Tragi, Lob. Tab. Eyst. papposa, quorundum. Linosyris nuperorum, Lob. Osyris Austriaca, Clus.

*Linaria purpurea major odorata*, C. B. Glachsfraut mit purpurblumen. Linaria carulea, Cam. altera purpurea, Dod. purpurea elatior, Eyst. Linariæ purpureæ varietas, Lob. Nostræ flos violaceus.

*Linaria pumila supina lutea*, C. B. \* Klein niederliegendes Glachsfraut. Linaria Hispanica quinta, Clus. Osyris minor, Tab. flava sylvestris, Lob. ic.

*Linaria triphylla minor lutea*, C. B. Dreyblettrig Glachsfraut mit gelben blumen. Linaria Valentina, Dod. Lob. Hispanica prima, Clus.

Lin-

*Lingua cervina officinarum*, C.B. Hirschjung. Scolopendria vulgaris, Trag. Phyllitis, Matth. Dod. Lob. vulgaris, Cam. Clus. sive lingua cervina, Tab. Folia huic plana: sed invenitur etiam foliis per marginem crispatis.

*Lingua cervina multifido folio*, C.B. Gespalte-  
ne Hirschjung. Phyllitis laciniata, Dod. Clus. foliis  
laciniatis, Tab. multifido folio, Lob. mucronata,  
Cam.

*Linum sativum*, C. B. Dod. Trag. Flachs. Li-  
num, Matth. Fuch. Lon. vulgare cæruleum, Lob.

*Linum sylvestre minus*, C. B. \* Wilder Flachs.  
Linum sylvestre octavum, Clus. Chamælinum,  
Lob. Chamælinum cæruleum, Tab.

*Lithospermum majus erectum*, C.B. Perlkraut/  
ob formam seminis. Lithospermum legitimum,  
Clus. arvense, Tab. minus, Matth. Dod. Lob. Mili-  
um solis sativum, Trag.

*Lithospermum arundinaceum*, C. B. Rohrig  
Perlkraut/quoniam folia ipsi arundinacea. Litho-  
spermum majus, Trag. Lachryma Jobi, Clus. Dod.  
Lob. Cam. Eyst.

*Lithospermum arvense radice rubra*, C. B. \*  
Perlkraut mit rohter wurzel. Lithospermum syl-  
vestre, Trag. tertium, Dod. Anchusa arvensis mi-  
nor facie Milii Solis, Tab. Anchusa degener facie  
Milii Solis, Lob. ic.

*Lotus hortensis odora*, C. B. Siebenzeit/ Gar-  
tenflee. Lotus sylvestris, Matth. urbana, Eyst. hor-  
to

torum odora, Lob. Melilotus vera, Tab. Trifoliū Dioscoridis, Trag. odoratum alterum, Dod. Ex femine deciduo annuatim se propagat: folia plantæ prorumpentis ad rotunditatem vergunt fere sine erenis, florētis vero sunt oblōga margine crenato.

*Lotus pentaphyllos minor glabra*, C.B. \* Sünffblettriger Lotus der glatte. Melilotus coronata, Lob. Trifolium corniculatum primum, Dod. siliquolum minus, Tab.

*Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliqua angustissima*, C. B. \* Sünffblettriger Lotus der rauhe. Trifolium corniculatū minus pilosū, Eid. in Prodr.

*Lotus siliquosus glaber flore rotundo*, C. B. \* Eysischer Lotus. Lotus Lybica Dalechampii, Lugd. an Oxytriphylli genus, Clus. hisp.

*Lotus ruber siliqua angulosa*, C.B. Rothblühender Lotus mit eckigen schoten. Lotus siliquosus rubro flore, Clus. pulcherrima tetragonolobus, Cam. Eyst.

*Lotus pentaphyllos vesicaria*, C.B. Sünffblettriger Lotus mit blasen. Tritolium vesicarium, Clus. pan. halicacabum sive vesicarium, Cam.

*Loto affinis Vulneraria pratensis*, C. B. \* Wundkraut dem Loto verwand. Anthyllis leguminosa, Lob. Clus. lenti similis, Dod. Lagopodion tertium, Tab.

*Lotus Africana latifolia*, C.B. Lotusbaum/vulgo Franzosen-holz. Lotus Africana altera, Matth. Pseudolotus Matthioli, Tab. Guajacana, Eyst. Guajacum Patavinum Fallopii, Lob. Lu

*Lunaria racemosa minor vel vulgaris, C.B.\**

Mondkraut/Mondraute. *Lunaria*, Trag. Dod. minor; Matth. Lon. racemosa, Lob. botryitis, Cam. Thal. Eyf. botryitis minor, Clus. *Ruta lunaria vel jecoraria*, Tab.

*Lupinus sativus flore albo, C.B.* Weiße Feigbonen. *Lupinus*, Trag. Matth. sativus, Lob. Dod. albo flore, Clus. vulgaris, Eyf.

*Lupinus sylvestris flore caruleo, C.B.* Blaue Feigbonen. *Lupinus sylvestris*; Matth. Dod. sylvestris legeū flore purpureo, Lob. minor, Tab. sylvestris angustifolius flore cæruleo, Eyf. *Lupinum* flore cæruleo, Clus.

*Lupinus sylvestris flore luteo, C.B.* Gelbe Feigbonen / Gelänger je lieber. *Lupinus luteus*, Tab. flore luteo, Lob. flavo flore, Clus. sylvestris luteus odoratus, Eyf.

*Lupulus mas, C.B.* Hopffe. *Lupulus*, Matth. Dod. Clus. Tab. *Lupus salictarius*, & *Vitis septentrionalium*, Lob.

*Lupulus femina, C.B.\** Cam. ep. & hort. Wilder Hopffe. Hæc flores profert steriles, illa fructus folliculares.

*Luteola salicis folio, C.B.* Streichkraut. *Luteola*, Lob. *Lutum herba*, Dod. Catanance, Tab. *Pseudostrophium*, Matth. Eyf.

*Lychnis hirsuta flore coccineo major, C.B.* Scharlach-Lychnis. *Lychnis Chalcedonica*, Tab. *Byzantina miniato flore*, Clus. *Constantinopolita*,

na miniata, Lob. Flos Constantinopolitanus, Dod. miniatus, Eyft. Adest flore simplici, & flore pleno.

*Lychnis coronaria Dioscoridis sativa*, C. B. Einfache Kranz-*Lychnis*. *Lychnis*, Matth. coronaria, Lob. Dod. Rosa mariana sativa, Trag. Adest flore rubente, & flore albo.

*Lychnis coronaria sativa multiplex*, C. B. Volle Kranz-*Lychnis*. *Lychnis coronaria* floris foliolis multiplicatis, Dod. flore rubro pleno, Eyft. *Lychnis altera rubra*, Lob. ic.

*Lychnis sylvestris alba multiplex*, C. B. Weiß gefülter Wiederstoß. *Lychnis sylvestris* flore pleno albo, Eyft. alba sylvestris, Lob. ic. *Ocymastrum multiflorum*, Tab.

*Lychnis sylvestris purpurea multiplex*, C. B. Purpur gefülter Wiederstoß. *Lychnis sylvestris* flore pleno rubro, Eyft. agrestis multiflora, Lob. ic. *Ocymoides* flore pleno, Cam. ep.

*Lychnis segetum major*, C. B. \* Rade. *Lychnis arvensis*, Tab. *Nigellastrum*, Dod. *Pseudomelanthium*, Matth. Lob. Vitium est frumentorum, præcipue Hordei.

*Lychnis sylvestris*, quæ Becn album vulgo, C. B. \* Wald-*Lychnis* mit pausenden Kelchen/ Sphspettel & Herba articularis, Tab. *Lychnis sylvestris*, Lon. Eyft. *Papaver spumeum*, Lob. *Melandrium Plinii* quorundam, Clus.

*Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis*, C. B. \* Breitblettrige Wald-*Lychnis* mit  
ge-



gestreiffen pausenden feldchen. *Lychnis sylvestris secunda*, Clus. *sylvestris tertia caliculis striatis*, Lob. Tab.

*Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis*, C. B.\* Schmallblettrige Wald-Lychnis mit gestreiffen pausenden feldchen. *Lychnis sylvestris altera incana cauliculis striatis*, Lob.

*Lychnis maritina repens*, C. B. Kriechende Meer Lychnis. *Lychnis marina Anglica*, Lob. Tab. Flos ipsi carneus.

*Lychnis viscosa montana alba latifolia*, C. B. Breite Kleblychnis mit weissen blumen. *Lychnis sylvestris*, Tab. nona, Clus. flore albo, Eyft. Floris cuculi *sylvestris genus*, Trag. Folia cochleata sunt, & subhirsuta: caules admodum viscosi.

*Lychnis viscosa rubra angustifolia*, C. B.\* Schmale Kleblychnis. *Lychnis sylvestris purpurea*, Tab. viscosa *sylvestris flore incarnato*, Eyft. *sylvestris quarta*, Clus. Adfuit etiam flore pleno.

*Lychnis viscosa purpurea latifolia levis*, C. B.\* Breite Kleblychnis. *Lychnis sylvestris prima*, Clus. Viscaria fativa, Tab. Mulcipula flore rubro, Eyft. sive *Armoraria altera*, Lob. Adest etiam flore albo.

*Lychnis viscosa flore muscoso*, C. B.\* Kleblychnis mit Moßblumen. *Mulcipula altera flore muscolo*, Lob. Selamoides magnum *Salmanticum*, Clus. Otites, *Lychnidis sylvestris genus*, Tab.

*Lysimachia lutea major*, C. B.\* Gelber Wendrich

rich der groſſe. *Lyſimachia*, Matth. lutea, Trag. Lob. Tab. Eyſt. lutea communis, Cluſ.

*Lyſimachia lutea minor folijs nigris punctis notatis*, C.B. Gelb Wenderich der kleine. *Lyſimachia lutea altera*, Cluſ. lutea pannonica major, Eyſt. flore luteo majore, Cam.

*Lyſimachia lutea corniculata*, C.B. Gelber Wenderich mit hörnern. *Lyſimachia Virginia-na*, vulgi.

*Lyſimachia ſiliquosa hirsuta parvo flore*, C.B.\* Schoten Wenderich. *Lyſimachia ſiliquosa ſecunda*, Tab. Describitur etiam in Prodr.

*Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia*, C.B.\* Chamænerion. *Lyſimachia vulgo altera*, Cam. Chamænerion, Eyſt. Filius ante patrem maximus, Gef. hor.

*Lyſimachia ſpicata purpurea*, C.B.\* Aehren Wenderich mit purpurblumen. *Lyſimachia altera*, Matth. Eyſt. purpurea, Lob. Tab. purpurea communis major, Cluſ. *Pseudolyſimachium purpureum alterum*, Dod.

*Lyſimachia ſpicata cærulea*, C.B.\* Aehren Wenderich mit blawen blumen. *Lyſimachia cærulea hortensis*, Lob. cæruleo flore, Cluſ. *Veronica recta cærulea*, Eyſt. In noſtrate flos ex cæruleo rubet.

*Lyſimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea*, C.B.\* Helm Wenderich mit blawen blumen/Sieberkraut. *Lyſimachia galericulata*, Lob. Cluſ. *Tertianaria*, Tab. Ma-

*Majorana vulgaris*, C.B. Majoran. Majorana, Dod. five Amaracus major, Tab. Amaracus Matth. vulgator, Eyst. Sampsuchus, Lob. Lata admodum folia interdum profert, quæ est Majorana latifolia, Eyst.

*Majorana hyemalis*. Winter Majoran/ quoniam hyemem perfert. Majorana sylvestris, Trag. sylvestris perennis, C.B. Origano cognata majorana major, Ges. hor.

*Mali hortensis varia genera*. Garten Aepffel. Als: Borgstörffer/ Grünäpffel/ Härtinge/ Johannes-äpffel/ Jungfer-äpffel/ Klapper-äpffel/ Kant-äpffel/ Kreid-äpffel/ Peppinger/ Quitten-äpffel/ Rabauen aus Engeland/ Reinetten aus Frankreich/ Rosenhagener/ Rostocker/ Scheib-äpffel/ Striem-äpffel/ Süß-äpffel/ Weiden-äpffel/ und andere mehr arten. Est etiam genus malorum, quod vulgo Mala decembria, Weinacht-äpffel nominant, rati hanc arborem nocte Nativitati Dominicæ sacra, non obstante gelu, florere simul, & fructus ferre. Hac de re interrogatus à me per literas Excell. Vir Mauritius Hofmannus Professor Altorfinus, respondit: Mitto simul in scatula ejusmodi aliquot Mala, quorum quidem proventus superiori anno 1662. ob intentissimum frigus fuit solito parcius. Habeo autem illa non nisi pro fructibus serotinis: siquidē etiam in Horto nostro Medico adest Pyrus serotina, quæ mense Octobridemum floret, fructus autem sub finem Novembris

bris, adeoque circa Solstitium perficit. Cæterum Mala illa transmissa nihil habebant speciosi, sed erant sicca, corrugata, & tam exigua, ut nucem avellanam vix æquarent.

*Mala sylvestria*. \*Wilde Aepffel/ Holz-Aepffel. Fructus sunt exigui, acerbi: arbusculæ vero juniores insitioni aptissimæ.

*Mala armeniaca maiora*, C. B. Grosse Marel-  
ellen / Aprifosen / quasi præcocia, vel Bara-  
cocca, Cæsalp. Malus Armeniaca major, Lob. Ar-  
meniaca malus, Matth. Armeniaca majora, Tab.  
Eyst. Horum magnitudo ex insitione.

*Malus armeniaca minor*, C. B. Kleine Marel-  
len. Malus armeniaca, Dod. Lob. Armeniaca mi-  
nora, Matth. Tab.

*Mala cotonea minora*, C. B. Kleine Quitten. Ma-  
lus cotonea, Trag. Matth. cydonia, Tab. Mala ro-  
tunda minora nonnullis chrysomela, Dod. Coto-  
nea & Cydonia mala, Lob.

*Mala cotonea majora*, C. B. Grosse Quitten.  
Mala cotonea oblongiora & majora, Dod. Stru-  
thia & Pyra cotonea, Cast. Horum alia pyris,  
alia malis assimilantur: inde nomina, Birnen-quit-  
ten/ Aepffel-quitten.

*Malus aurantia major*, C. B. Pomeranze. Ma-  
lus anarantia, Dod. Aurantia mala, Matth. Tab.  
Arantia, Lob. Aureum malum, Clus. Pomum aran-  
tium, Trag. Eyst.

*Malus aurantia humilis*, C. B. Zwerg-  
Po

Pomeranzen. Aurea malus pumilio, Clus. Poma aurantia Nana dicta, Eyft.

*Malus Adami*, C. B. Adams Nepffel. *Malus Assyria*, Dod. Tab. Pomum Adami, Matth. Assyrium, Lob. Poma Adami quæ Gallis Ponzires, Clus. Lumia, Ferrar.

*Malus limonia acida*, C. B. Limonen. *Malus limonia*, Matth. Dod. Tab. Limones, Lob.

*Malus medica*, C. B. Matth. Lob. Dod. Citronen. *Malus medica seu citria*, Eyft. Citrus, Tab.

*Malus medica maxima*, pulpa plurima, C. B. Citronat. Ponzires, Cæsalp.

*Malus punica sativa*, C. B. Fruchtbar Granatenbaum. *Malus punica*, Trag. Matth. Dod. flore simplici, Eyft. granata, Tab. Malum punicum, Lob.

*Malus punica sive Balaustia flore pleno minore*, C. B. Balaustien. *Balaustium flore minore Romanum*, Eyft.

*Malva sylvestris folio rotundo*, C. B. \* Pappefraut mit runten blettern / Käse-Pappel / Hasen-Pappel. *Malva*, Matth. *sylvestris minor*, Tab. *sylvestris pumila*, Dod. *sylvestris repens pumila*, Lob. Radix in bacillos scinditur digitorum longos: illis nonnulli vino intinctis dentes post pastum fricando purgare solent.

*Malva sylvestris folio sinuato*, C. B. \* Pappe-



pelfkraut mit gebüßelten blettern. *Malva sylvestris major*, Tab. *sylvestris procerior*, Dod. *vulgaris procerior*, Lob.

*Malva folijs crispis*, C. B. Pappelfkraut mit krausen blettern. *Malva crispa*, Dod. Tab. Eyst. *crispatis oris*, Lob.

*Malva folio vario*, C. B. Pappelfkraut mit mancherley blettern. *Malva trimestris vel pumila*, Clus.

*Malva rosea folio subrotundo*, C. B. Einfache Rosenpappel/Herbst-rosen. *Malva rosea fruticosa*, Lob. *hortensis*, Trag. Dod. *major unicaulis* Matth. *arborea*, Tab. Adest flore candido, rubete, nigricante,

*Malva rosea folio subrotundo, flore pleno*, C. B. Gefülte Rosenpappel. *Malva rosea multiplex*, Lob. Tab. *hortensis multiplici flore*, Dod. Adest flore albo, incarnato, atrorubente.

*Marrubium album vulgare*, C. B. \* Weißer Andorn/Gotteshülff. *Marrubium*, Matth. Dod. Lob. Tab. *vulgare*, Clus. Eyst.

*Marrubium Cardiaca dictum*, C. B. \* Herzgespan. *Cardiaca*, Matth. Lob. Tab.

*Marrubium palustre glabrum*, C. B. \* Glatt Wasser Andorn. *Marrubium aquaticum*, Trag. Dod. Lob. *Sideritis prima*, Matth. *Lancea Christi*, Ges. hor.

*Marrubium palustre hirsutum*, C. B. \* Rauch Wasser Andorn, Primum est in Prodromo.

Mer-

*Marrubium nigrum foetidum*, C. B. \* & Adv. Schwarz stinckender Andorn. *Marrubium majus* vel *primum*, Trag. *Marrubialtrum*, Tab. Ballote, Diosc. Matth. Fuch. Dod. Lob.

*Marum mastichen redolens*, C. B. Mastich-  
fraut. *Marum*, Tab. peregrinum, Eyst. vulgare si-  
ve *Clinopodium*, Dod. Mastic Gallorum & An-  
glorum, Lob. *Sampsuchum verum*, quorundam.

*Matricaria vulgaris*, C. B. Mutterfraut. *Ma-  
tricularia*, Trag. Dod. nostras, Lob. flore simplici,  
Eyst. *Parthenium*, Matth. *Artemisia tenuifolia*,  
Tab.

*Matricaria flore pleno*, C. B. Gefült Mutter-  
fraut. *Matricaria duplici flore*, Lob. ic. pleno flo-  
re, Eyst. *Parthenium pleno flore*, Clus. *Artemisia  
tenuifolia flore pleno*, Tab.

*Melampyrum purpurascence coma*, C. B. \*  
Rühweizen mit purpurfarbenem gipffel. *Me-  
lampyrum*, Lob. Tab. *Triticum vaccinum*, Trag.  
Dod. Lon. *Parietaria sylvestris tertia*, Clus.

*Melampyrum cerulea coma*, C. B. \* Rühweizen  
mit blawen Gipffel. *Parietaria sylvestris*, Cam. syl-  
vestris prima, Clus. Lipsensium, Trag.

*Melampyrum luteum latifolium*, C. B. \* Gel-  
ber Rühweizen. *Parietaria sylvestris*, Eyst. secun-  
da, Clus. *Milium sylvaticum primum & secun-  
dum*, Tab. *Cratægonon*, Lob.

*Melilotus officinarum Germania*, C. B. \* Stein-  
flee weiß/gelb/und purpurblaw. *Melilotus Ger-*

manica, Lob. flore luteo, Eyst. Lotus urbana, Matth. sylvestris, Tab. Sponte provenit apud nos flore luteo, rarius albo: in Horto vero colitur flore purpureo cæruleo inodoro, quæ est differentia tertia Dodonæi.

*Melilotus Italica folliculis rotundis*, C. B. Welscher Steinflee der grosse. *Melilotus Italica*, Camer.

*Melilotus angustifolia repens folliculis rotundis*, C. B. Welscher Steinflee der kleine. An *Melilotus* Frisia flore luteo pusillo, quorundam.

*Melilotus corniculis reflexis minor*, C. B. Aegyptischer Steinflee. *Melilotus Aegyptia*, Alchimelech, Alpin. Hæc crescendo repit.

*Melilotus folliculis utrinque acuminatis*, Cretischer Steinflee. Semen eleganti folliculo non rotundo, sed utrinque acuminato includitur: missum nomine *Meliloti Creticæ sericæ*.

*Melissa hortensis*, C. B. Melisse/Winter-Melisse. *Melissa*, Dod. officinarum, Eyst. *Melissophyllum*, Tab. *Apiastrum*, Matth. Lob.

*Melissa peregrina folio oblongo*, C. B. Sommer Melisse mit länglichen blettern. *Melissa Moldavica*, Matth. Eyst. *Turcica Dalechampii*, Tab. *Melissophyllum Turcicum*, Lob. flore cæruleo, & flore albo.

*Melissa Moluccana odorata*, C. B. Wohlriechende Moluckische Melisse. *Melissa Constantinopolitana*, Matth. *Molucalævis*, Dod. *Cardiaca Syriaca*,

ca, Tab. Cardiacamelica sive Moluca minus aspera, Lob. Moluca odorata spinosa, Eyft.

*Melissa Moluccana foetida*, C. B. | Stinckende Moluckische Melisse. Molucca spinosa, Dod. laevis inodora, Eyft. | Moluca asperior Syriaca, Lob. Cardiac Syriaca aspera, Tab.

*Melo vulgaris*, C. B. Melone. Melo, Trag. Tab. sive Melo pepo vulgi, Dod. Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Lob. Pepo, Fuch. Variat fructus figura, cortice, pulpa, odore, duratione, loco natali: unde mira oritur melonum varietas. Semen ad nos apportatur ex Galliis, Batavia, Hispania, Italia, atque Hungaria.

*Melo rotundus parvus*, C. B. Kleine Zucker-Melonen. Melo saccharatus, Lob. ic. saccharinus, Tab.

*Mentha hortensis corymbifera*, C. B. Frauenmünze / Balsmte & Balsamita, Brunf. Mentha Sarracenicæ, Off. & Eyft. Græca, Matth. Costus hortorum, Lob.

*Mentha rotundifolia crispa spicata*, C. B. Krause Münze. Mentha crispa, Off. sativa altera, Matth. Dod. rotundifolia altera flore spicato, Lob.

*Mentha angustifolia spicata*, C. B. Spize Münze. Mentha acuta, Off. & Tab. prima, Matth. sativa vel hortensis tertia, Dod. Romana sive præstantior angustifolia, Lob.

*Mentha spicata folio variegato*, C. B. Spize Münze mit geschleckten blettern. Men-

tastrum alterum, Dod. nivcum Anglicum, Lob.  
Eyst. Tab.

*Mentha sylvestris longiore folio*, C. B. \* Pferde  
Münze. Menthastrum, Trag. Matth. Dod. Lob.  
Offic. sylvestre, Eyst.

*Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica  
major*, C. B. \* Wassermünze. Calamintha aquati-  
ca, Tab. Sisymbrium, Dod. sylvestre, Matth. A-  
quatica sive Sisymbria mentha, Lob. Balsamita  
Officinarum, Eyst.

*Mentha cataria vulgaris*, C. B. \* Katzenmünze.  
Nepeta, Off. vulgaris, Trag. Menta cataria, Lob.  
felina, Tab. Eyst. Herba gattaria, Matth. Cattaria  
herba, Dod.

*Mercurialis testiculata*, C. B. \* Mänlich Bin-  
gelfraut. Mercurialis mas, Matth. Dod. Lob.  
Tab.

*Mercurialis spicata*, C. B. \* Weiblich Bingel-  
fraut. Mercurialis foemina, Matth. Dod. Lob.  
Tab.

*Mercurialis montana spicata*, C. B. \* Berg-  
Bingelfraut. Mercurialis sylvestris foemina, Cord.  
hilt. canina foemina, Colum. Cynocrambe foemi-  
na, Matth. Cam. ep.

*Mespilus Germanica folio laurino non serrato*,  
C. B. Gemeiner Mespelbaum. Mespilus, Trag.  
Lob. Dod. vulgaris, Clus. Cam. ep.

*Mespilus folio laurino major*, C. B. Großer  
Mespelbaum. Mespilus fructu præstantiore,  
Trag.



Trag. domestica, Lob. ic. oxyacantho insita, Dod.

*Mespilus apij folio sylvestris spinosa*, C. B.\*

Hagedorn. Oxyacantha, Matth. Lob. Tab. Spina appendix Plinii, Clus. Fructus non est vescus: ad vivas autem sepes frutex usurpatur. Huc pertinet singularis differentia, quam nuncupant vulgo Weisßdorn à colore corticis.

*Meum folijs anethi*, C. B. Bårdille. Meum, Matth. Dod. Lob. Tab. vulgare tenuifolium, Clus. Daucus Creticus, Trag. Seleli Creticum, Lon.

*Milium semine luteo, vel albo*, C. B. Gelber Hirse. Milium, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Fuch. Lon.

*Milium semine nigro*, C. B. Schwarzer Hirse. Milium nigrum, Tab. juba subinde coloris nigricantis, Dod. semine nigro & latiore juba, Lob.

*Millefolium vulgare album*, C. B.\* Weiße Schaffgarbe. Millefolium vulgare, Trag. flore albo, Eyst. terrestre majus, Tab. sive Achillea, Dod.

*Millefolium purpureum majus*, C. B. Purpurfarbene Schaffgarbe die grosse. Millefolium majus, Matth. rubro flore, Clus. Eyst.

*Millefolium vulgare purpureum minus*, C. B.\* Purpurfarbene Schaffgarbe die kleine. Millefolium minus, Matth. terrestre purpureis floribus, Lob. purpureum, Tab. purpurei floris, Dod. Nostras florem admodum dilutæ purpuræ gestat.

*Millefolium aquaticum caule nudo*, C. B.\*

Wasser Schaffgarbe mit blossen stengel. Myriophyllum alterum, Matth. equisetifolium fluviatile, Lob. Viola aquatilis, Dod. Fœniculum aquaticum secundum, Tab.

*Millefolium aquaticum folijs fœniculi, ranunculi flore & capitulo, C.B.\** Wasser Schaffgarbe mit fenchel-blettern. Peucedanum aquaticum, Tab. Myriophyllum maratrichyllum palustre alterum, Lob. ic.

*Mollugo montana latifolia ramosa, C.B.\** Breit Meyerkraut. Mollugo, Clus. montana, Dod. Tab. Belgarum, Lob.

*Mollugo montana angustifolia, C.B.\** Schmal Meyerkraut. Mollugo prima, Dod. Tab. vulgarior herbariorum, Lob. Gallion tertium, Trag. album, Cam.

*Moly latifolium liliflorum, C.B.* Moly mit Lilienblumen. Moly latifolium, Dod. liliflorum, Lob. Theophrasti, Clus.

*Moly latifolium Indicum, C.B.* Indianisch Moly. Moly Indicum, Clus. Caucason, Lob. ic. Recto prorsus caule assurgit.

*Moly latifolium Hispanicum, C.B.* Spanisch Moly. Moly Hispanicum purpureum, vel Moly montanum latifolium purpureum Hispanicum, Clus. eur. post. Quo pertinet Moly latifolium, Eyst.

*Moly latifolium luteum odore allij secundum, C.B.* Knoblauch-Moly mit gelbgrünen blumen. Moly latifolium flore flavo, Eyst.

*Morus fructu nigro*, C. B. Maulbeerbaum.  
*Morus*, Trag. Matth. Dod. Fuch. Tab. celsa officinis, Lob.

*Morus fructu albo*, C. B. Weiße Maulbern,  
*Morus alba*, Matth. Tab. candida, Dod. Lob. Hujus folia à bombycibus cumprimis expetuntur.

*Musculus vulgarissimus*, C. B.\* Gemeiner Erdmoß. *Musculus terrestris vulgaris*, Dod. Lob. ic. hortensis, Trag.

*Musculus filicinus major*, C. B.\* Fahrenmoß. *Musculus filicinus*, Tab.

*Musculus denticulato similis*, C. B.\* Zahnmoß. *Musculus montanus*, Tab.

*Musculus terrestris clavatus*, C. B.\* Gürtelkraut. *Musculus terrestris*, Matth. Dod. Trag. clavatus, Lob. Clavatus procumbens, Eyst. Lycopodium, Tab. Cingularia quibusdā. Pulvis fulgurans ex hoc colligitur. Nimirū mense Julio aut Augusto clavæ hujus Musci pulvisculo flavo scatent, qui canula vel alio instrumento comodo exceptus, si per flammā candelæ exsuffletur, cum strepitū incenditur, & quasi fulgurat. Ad ignes ludicros noctu utitur Moscovitæ, & vernacule *Plauen* nominant, teste Adamo Oleario Itiner. Persic. part. 2. p. 331. Pulverē hunc odoratū solemus reddere, addito Olibano, Mastiche, Benzoe, Succino, sed subtilissimè tritis: ita per instrumentū efflatus simul oculos fulgure, aures strepitu, nares odore replet gratissimo.

*Musculus clavatus folijs expressi*, C. B.\* Cypressenmoß.

moß. Chamæcyparissus, Tab. Sabina sylvestris, Trag. Savina Tragi sylvestris seu Selaginis Plinianæ prima specirs, Thal. Noster in vicinis sylvis circa arcem Grünenwald proveniens, moschi gratissimum odorem, etiam siccatus retinet: qualem suo cæteri Auctores non tribuunt, Tabernæmontanus vero plane inodorum prædicat.

*Muscus ramosus erectus major*, C.B.\* aut ei similis. Auffrichter Moß mit ästen. Reperitur itidem in querceto arcis Grünenwald.

*Muscus pyxiodes terrestris*, C.B.\* Erdmoß mit fleinen büchßlein. Muscus terrestris pyxidiatas alabastriculos imitatus, Lob. belg.

*Muscus terrestris coralloides sive cornutus montanus*, C.B.\* Erd Corallen-moß. Muscus corallinus sive Corallina montana, Tab.

*Muscus arboreus*, *Usnea officinarum*, C.B.\* Baummöß. Muscus arboreus, Trag. Matth. Dod. arborum, Tab. quernus, Lob.

*Muscus arboreus denticulato similis longissimus*. \*Langer Baummöß dem Zahnmöß ähnlich. Pinastro adnatum reperi.

*Muscus arboreus cum orbiculis*, C.B.\* Baummöß mit runten scheiblein. Muscus ramosus, & ramosus floridus, Tab. Quercui & Fago potissimum innascitur, umbellisque majoribus & minoribus variat.

*Muscus pulmonarius*, C.B.\* & Lob. Lungenmöß. Pulmonaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon.

Lon. Tab. Adest laciniis tam *latioribus*, quam *angustioribus*.

*Myrrhis major*, C. B. Myrrhis. Matth. Lob. Dod. sativa, Cam. Cerefolium Hispanicum, Tab. Cicutaria odorata, quorundam.

*Myrtus minor vulgaris*, C. B. & Lob. Gemeiner Myrtenbaum. Myrtus, Tab. Tarentina, Matth. Clus. Eyst.

*Myrtus folijs minimis & mucronatis*, C. B. Krauser Myrtenbaum. Myrtus domestica fructu albo, Clus. nona angustifolia, Lob. Stipantur rami numerosis foliis, ut ceteris multo desior appareat.

*Myrtus latifolia Romana*, C. B. Breitblettri-ger Myrtenbaum. Myrtus latifolia, Clus. Romana, Matth. altera, Dod. laurea maxima, Lob.

*Myrtus latifolia flore duplici*. Myrtenbaum mit gedoppelter blüht. Myrtus latifolia flore pleno, Hort. Pat.

*Napus sativa*, C. B. Same Steckrüben. Napus, Matth. Lon. Dod. sive Napus, Lob. Rapum sativum alterum & Napus veterum, Trag.

*Napus sylvestris*, C. B. \* & Dod. Wilde Steckrüben. Napus secunda, Lon. Bunias sylvestris, Lob. ic. Bunium & Napus sylvestris, Matth. Napus bunias sylvestris, uch. Rapum sylvestre, Trag.

*Narcissus albus circulo croceo vel luteo*, C. B. Weiße Narcisse mit gelben Circel. Narcissus veterum, Trag. decimus roseoluteus major, Tab. poeticus mediocroceus, Lob.

Nar-



*Narcissus Indicus totus ruber*, C. B. Ganz rothe Narcisse aus Indien. *Narcissus Indicus rubro flore*, Lob. ad. part. 2. flore sanguineo, Sueit. Jacobaeus, Clus.

*Narcissus orientalis albus calice stellato*, S. B. Weis Orientalische Narcisse mit gestirnetem kelche. *Narc. orient. albus odoratus calyce stellato*, Eyst.

*Narcissus totus albus major*, C. B. Ganz weisse Narcisse die grosse. *Narcissus totus albus*, Dod. Lob. quintus albus; Tab latifolius simplici flore prorsus albo, Clus. *orientalis polyanthos minor totus albus*, Eyst.

*Narcissus totus albus minor*, C. B. Ganz weisse Narcisse die kleine. *Narcissus latifolius niveus alter*, Clus. *totus albus paucioribus floribus*, Lob. *albus minor*, Cam.

*Narcissus orientalis albus calice luteo medius*, C. B. Weisse orientalische Narcisse mit gelben kelche. *Narcissus polyanthos orientalis medioluteus odoratus medius*, Eyst.

*Narcissus pallidus medio croceus*, C. B. Narcisse mit blassen blumen in der mitte saffran gelbe. *Narcissus medioluteus Pisanus*; Lob. ic. Suert.

*Narcissus pallidus medio aureus*, C. B. Narcisse mit blassen blumen in der mitte goldgelbe. *Narcissus praecox sulphurei coloris minor*, Clus. sur. post.

*Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus*, C. B.

Gelbe vielblümige Narcisse aus Portugal. *Narcissus d' Argiers aut Aegyptius*, Lob. adv. part. 2. de Argiers polyanthos totus luteus, Eyst.

*Narcissus luteus polyanthos Africanus*, C.B. Gelbe vielblümige Narcisse aus Africa. *Narcissus Africanus flavus polyanthos*, Clus. add. cur. post. *Africanus multiflorus coronatus*, Suert.

*Narcissus juncifolius oblongo calyce luteus major*, C.B. Gelbe Binsen-Narcisse die große. *Narcissus juncifolius major*, Dod. *luteus juncifolius vel Africanus præcox*, Lob. *major juncifolius*, Eyst.

*Narcissus juncifolius luteus minor*, C.B. Gelbe Binsen-Narcisse die kleine. *Narcissus juncifolius minor*, Dod. Clus. Eyst. *juncifolius serotinus*, Lob.

*Narcissus juncifolius flore pallidiore, calice flavo*, C.B. Blasser Binsen-Narcisse mit gelben Kelche. *Narcissus juncifolius minor*, Clus. Lob. ad. part. 2. *juncifolius minimus*, Eyst.

*Narcissus autumnalis albus*, C.B. Weiße Herbst-Narcisse. *Narcissus juncifolius albus autumnalis medio obsoletus*, Suert.

*Narcissus major totus luteus calice prælongo*, C.B. Ganz gelbe Narcisse mit langem Kelche. *Narcissus totus luteus montanus major*, Eyst. *totus luteus montanus Theophrasti Hispanicus*, Lob.

*Narcissus albus oblongo calice*, C.B. Weiße Narcisse mit langem Kelche. *Narcissus oblonga tuba*

tuba totus albus, Suert. Pseudo narcissus albo flore, Clus. totus albus, Eyst.

*Narcissus montanus juncifolius calice flavo*, C. B. Vinsen-Marzisse mit gelbem kelche. *Narcissus montanus juncifolius minimus*, Lob. Pseudo-narcissus juncifolius primus, Clus.

*Narcissus orientalis flore multiplici & pleno alboluteo*, C. B. Orientalische Marzisse mit weißgelben gefüllten blumen. *Narcissus orientalis polyanthos mixtus*, Eyst.

*Narcissus latifolius albus medioluteus*, C. B. Breitblettrige volle Marzisse mit weissen blumen in der mitten gelb. *Narcissus multiplex*, Dod. albus polyanthos, Lob. primus polyanthos, Matth. Tab. major flore multiplici, Eyst.

*Narcissus totus niveus multiplex*, C. B. Ganz schneeweiße volle Marzisse. *Narcissus pleno flore sextus*, Clus. albus pleno flore, Suert.

*Narcissus albus multiplex ex Virginea*, C. B. Volle weiße Marzisse aus Virginien. *Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice*, Suert.

*Narcissus sylvestris multiplex calice carens*, C. B. Volle Marzisse ohn kelch. *Narcissus sylvestris multiplex*, Dod. luteus multiplici flore, Lob. sylvestris stellatus, Eyst. Pseudonarcissus pleno flore, Clus. luteus polyanthos, Tab.

*Narcissus flore pleno variegato*, C. B. Volle gescheckte Marzisse. *Narcissus septentrionalis flore pleno luteo*, Eyst.

Nar-

*Narcissus maritimus*, C. B. Meer-Marcisse.  
*Narcissus marinus*, Dod. *Hemerocallis Valentina*,  
 Clus. Tab. *Pancratium floribus rubris*, Lob. ic.

*Narcissus Illyricus liliaceus*, C. B. Lilien-  
 narcisse aus Dalmatien. *Narcissus Constanti-*  
*nopolitanus*, Tab. Matth. *Lilionarcissus orient-*  
*alis Plateau*, Clus. *Lilionarcissus Hemerocallidis*  
 facie, Eyst.

*Narcissus Indicus autumnalis*, C. B. Herbst-  
 Marcisse aus Indien. *Pancratium Indicum*, aut  
*Narcissus Indicus maximus autumnalis* quorun-  
 dam, Lob. ad. part. 2.

*Nasturtium hortense vulgatum*, C. B. Gar-  
 tenfresse. *Nasturtium*, Matth. Tab. *hortense*, Trag.  
 Lob. Dod. Fuch.

*Nasturtium pratense magno flore*, C. B. \* Wie-  
 senfresse mit grossen blumen. *Nasturtium praten-*  
*se*, Trag. *aquaticum simplici flore*, Eyst. Car-  
 damine altera, Lob. altera simplici flore, Clus.  
 prima & *Sisymbrium alterum Dioscoridis*,  
 Tab.

*Nasturtium aquaticum supinum*, C. B. \*  
 Brunnefresse. *Nasturtium aquaticum*, Trag. Dod.  
 Lon. *Sisymbrium aquaticum*, Matth. primum,  
 Tab. Sion *Cratevæ crucæfolium*, Lob.

*Nasturtium aquaticum minus*, C. B. \* Kleine  
 Brunnefresse. *Sisymbrium aquaticum alterum*  
 vel minus, Cam. epit.

*Nasturtium sylvestre tenuissime divisum*, C. B. \*

Wellsamen. *Seriphium Germanicum*, Trag. *Sophia Chirurgorum*, Lob. Dod. *Thalictrum*, Tab.

*Nasturtium Indicum majus*, C.B. Indianische Kresse. *Nasturtium Indicum*, Dod. Lob. Eyst. Camer.

*Nerion floribus rubescentibus*, C.B. Roter Oleander. *Nerion*, Trag. Lob. Tab. flore rubro, Eyst. *Nerium*, Matth. Fuch. Oleander, & *Laurus rosea*, Lob. ic.

*Nerion floribus albis*, C.B. Lob. Tab. Cam. Weisser Oleander. *Nerion* sive *Rhododendron flore albo*, Eyst.

*Nicotiana major latifolia*. C.B. Grosser Taback mit breiten blettern. *Nicotiana major*, Tab. mas, Jo. Neandr. *Tabacum latifolium*, Eyst. *Petum latifolium*, Clus. *Hyoscyamus Peruvianus*, Dod. Sana Sancta Indorum, Lob. Hæc omnium præstantissima, ejusque semen ex Batavia accersunt hortulani nostri, qui *Nicotianæ* colendæ, & in funiculos ducendæ operam navare cæperunt.

*Nicotiana major angustifolia*, C.B. & Eyst. Grosser Taback mit schmalen blettern. *Tabacum angustifolium*, Cam. Herba Sancta sive *Tabacum minus*, Lob. *Hyoscyamus Peruvianus alter*, Dod. *Petum angustifolium*, Clus. ad Monard. *Nicotiana foemina*, Jo. Neandr.

*Nicotiana minor*, C.B. & Eyst. Kleiner Taback. *Hyoscyamus luteus*, Dod. *Peruvianus*, Tab. dubius luteolus *Solanifolius*, Lob. niger vel tertius, Matth. Priapeja, Ges. hor.

Ni-



*Nigella arvensis cornuta*, C. B. Schwarzkümmel. *Nigella sylvestris*, Trag. *Melanthium sylvestre*, Dod. sylvestre alterum, Matth. capitulis reflexis aquilegiæ, Lob. agreste, Tab. arvense, Clus. *Pseudomelanthium*, Eyft.

*Nigella latifolia flore majore simplici ceruleo*, C. B. Breitblettrige Nigelle mit einfacher blauer blume. *Melanthium Hispanicum majus*, Eyft.

*Nigella angustifolia flore majore simplici ceruleo*, C. B. Schmalblettrige Nigelle mit einfacher blauer blume. *Melanthium sylvestre*, Matth. Lob. *Damascenum*, Dod. Tab. sylvestre *Damascenum*, Clus. *sativum flore simplici*, Eyft.

*Nigella flore majore pleno ceruleo*, C. B. Nigelle mit gefüllter blauer blume. *Melanthium Damascenum pleno flore*, Clus. Eyft.

*Nigella flore minore simplici candido*, C. B. Nigelle mit weisser einfacher blume. *Melanthium sativum*, Matth. Dod. Tab. *sativum simplici flore*, Clus. sive *Nigella Romana odora*, Lob.

*Nigella flore minore pleno & albo*, C. B. Nigelle mit gefüllter weisser blume. *Nigella flore albo multiplici*, Lob. peregrina flore multiplici, Eyft. *cardamomea*, quorundam ob odorem. *Cardamomi tertia species*, Lac. *Melanthium citrinum multiflorum*, Tab. pleno flore, Clus.

*Nummularia major lutea*, C. B. \* Pfennigfraut / Egelfraut. *Nummularia*, Matth. Trag. Dod. Lob. Eyft. *Hirudinaria minor*, Tab.

*Nux juglans sive regia vulgaris*, C. B. Ger-  
meine Nüsse. *Nux juglans*, Trag. Matth. Dod.  
Lob. Tab. Adfunt etiam Surdæ Cæsalpino voca-  
te, quæ a putamine purgari vix possunt, Stein-  
Nüsse.

*Nux juglans fructu maximo*, C. B. Grosse  
oder Wall. Nüsse. *Nuces caballinæ*, Lugdun.  
ex quarum cuppis marsupia fiunt pueris gestanda.

*Nux juglans fructu tenero & fragili putami-  
ne*, C. B. Dünnschälige Nüsse. *Nuces juglandes*  
cortice tenuissimo, Ges. hor.

*Nymphaea alba major*, C. B. \* Weiße Seeblume  
die grosse. *Nymphaea alba*, Matth. Dod. Lob. Tab.  
Clus. candida, Trag. major alba, Eyst. Nenufar,  
Brunf.

*Nymphaea alba minor*, C. B. \* & Tab. Weiße  
Seeblume die fleine. *Nymphaea parva*, Matth.

*Nymphaea alba minima*, C. B. \* Weiße Seeblu-  
me die kleineste. *Morsus ranæ*, Dod. Tab. Lob. ic.

*Nymphaea lutea major*, C. B. \* & Clus. Grosse  
gelbe Seeblume. *Nymphaea lutea*, Trag. Matth.  
Dod. Lob. Tab. Eyst.

*Nymphaea lutea minor magno flore*, C. B. \*  
Kleine gelbe Seeblume mit grossen blumen. *Nym-  
phaea lutea secunda*, Tab.

*Nymphaea lutea minor parvo flore*, C. B. \*  
Kleine gelbe Seeblume mit kleinen blumen.  
*Nymphaea lutea priina*, Tab. *lutea minor Septen-  
trionalium*, Lob. ic.

*Ocimum vulgatius*, C. B. Gemeine Basilge.  
*Ocimum medium*, Matth. *medium vulgatius*,  
 Eyft. *magaum*, Tab. *sive Basilicum medium vul-*  
*gatius*, Lob.

*Ocimum caryophyllum majus*, C. B. Nelken-  
 basilge. *Ocimum majus*, Matth. *maximum*, Dod.  
*maximum caryophyllum*, Basilica major, Trag.

*Ocimum folijs fimbriatis viridibus*, C. B.  
 Krause Basilge. *Ocimum crispum viride*, Eyft.

*Olea sativa*, C. B. Matth. Tab. Clus. Delbaum.  
*Olea*, Trag. Dod. Lob.

*Olea sylvestris folijs molli incano*, C. B. Wilder  
 Delbaum mit weichen grauen bleibern. *Olea syl-*  
*vestris Septentrionalium*, Lob. *Bohemica*, Matth.  
*Ziziphus alba*, Clus. *Ziziphus Cappadocia Plinii*,  
 Dod. *Salix Amerina*, Amat. Lusit.

*Onobrychis semine clypeato aspero major*, C.  
 B. Schildfrant. *Onobrychis altera*, Dod. *Hedy-*  
*sarum alterum clypeatum*, Lob. *clypeatum flore*  
*suaviter rubente*, Eyft.

*Onobrychis arvensis*, vel *Campanula arvensis*  
*erecta*, C. B. Frauen Spiegel. *Onobrychis altera Bel-*  
*garum*, Lob. Eyft. *Campanula arvensis minima*,  
 Dod. *Viola arvensis*, & *Viola pentagonia*, Tab.

*Ophioglossum vulgatum*, C. B. \* Schlangen-  
 zünglein. *Ophioglossum*, Matth. Trag. Dod. Eyft.  
 seu *Enophyllum*, Lob.

*Ophris bifolia*, C. B. \* Zwenblat. *Ophris*, Matth.  
 Tab. *Bifolium*, Lob. *Pseudorchis seu Bifolium*,  
 Dod.

*Orchidis* radice palmata, & testiculata tam simplici, quam gemina, variaz species.

*Origanum sylvestre*, C. B. \* Dod. Tab. Fuch. Dost / Wolgemuth. *Origanum vulgare*, Trag. Matth. Eyst. *Agrioriganum* sive *Onitis major*, Lob.

*Origanum Heracleoticum*, C. B. Matth. Dod. Lob. 1. & 2. Tab. Griechisch Wolgemuth. *Cunila gallinacea*, Plinii. Galli & Belgæ flores siccos salamentis ex hælecibus aut sardis paratis inspergunt, & à similitudine quadam *Lupulum Hispanicum*, Spanischen Hopffen nominant.

*Ornithogalum umbellatum maximum*, C. B. Geschirmte Vogelmilch die grosse. *Ornithogalum majus*, Dod. Arabicum, Clus. Eyst. *Lilionarcissus polyanthos*, Lob.

*Ornithogalum umbellatum medium angustifolium*, C. B. Geschirmte Vogelmilch die mitlere. *Ornithogalum candidum vulgare*, Lob. quintum sive vulgare, Clus. secundum, Matth. *Bulbus solsequius*, Tab. *Bulbus leucanthemos minor*, Dod.

*Ornithogalum album minus*, C. B. Kleine weisse Vogelmilch. *Ornithogalum minus*, Eyst. minus e *Pyrenæis*, Clus.

*Ornithogalum majus spicatum flore albo*, C. B. Gedährte Vogelmilch. *Ornithogalum Narbonense*, Dod. *spicatum flore lacteo*, Eyst. *spicatum Monspel. flore lacteo*, Lob. *majus secundum*, Clus.

*Ornithogalum luteum*, C. B. \* Lob. Tab. Afer-

zwie-

zwiebel. Bulbus, Trag. sylvestris, Fuch. Ruell. Dod. Eyst. esculentus, Lon.

*Ornithopodium majus*, C. B. \* Groß Vogelfuß. *Ornithopodium*, Dod. Lob.

*Ornithopodium minus*, C. B. \* Klein Vogelfuß. *Ornithopodium perpusillum*, Lob.

*Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioides*, C. B. Raucher Vogelfuß. *Scorpioides leguminosa*, Lob.

*Orobancha radice dentata major*, C. B. \* Zahn-  
fraut/Zahnwurz. *Dentaria major*, Matth. Lob. Clus. crocodilia, Tab. Squamatia, Lon. Anblatum, Dod. Squammata seu *Dentaria major*, Eyst.

*Orobis siliquis articulatis semine majore*, C. B. Garten Orobis. *Orobis sive Ervum*, Matth. Ervum, Tab. verum, Cam. *Orobis receptus herbariorum*, Lob.

*Orobis sylvaticus Vicia folijs*, C. B. Wald-Orobis mit wicken blettern. *Orobis pannonicus secundus*, Clus. *Astragaloides*, Dod. altera herbariorum, Lob.

*Ostrya Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis*, C. B. \* Hagebüche. *Ostrya Theophrasti & Fagulus herbariorum*, Clus. *Ornus*, Trag. Lon. *Carpinus*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Materies dura*, & trochleis apta, rotisque molendinariis.

*Palma major*, C. B. & Tab. Rechter Dattelpflaum. *Palma*, Trag. Matth. Dod. Lob. *dactylifera*, Linscot. Ex nucleis dactylorum propagatur,



aut plantæ triennes, quandoque etiam decennes ex Italia afferuntur, qualis superiori anno Berolini vifebatur in Electoralibus hortis, quaternos pedes superans, Foliis hæc prædita est alatis.

*Palma minor*, C. B. & Tab. Niedriger Dattelbaum. *Palma humilis*, Matth. *Palmites*, Lob. *Chamærops*, Plin. *Chamæriphe*, Dod. Hæc apud nos multos annos perdurat, grandescit, & floret: folia ipsi digitata.

*Panicum Germanicum*, sive *panicula minore*, C. B. Fench/ Senich/ Suchs schwan; Panicū, Fuch. Dod. Lob. Tab. Cam. minore panicula, Matth. *Milium agreste* sive *exiguum*, Trag.

*Panicum Italicum*, sive *panicula majore*, C. B. Großkolbiger Fench. *Panicum domesticum*, Matth. vulgare, Clus. *Indicum*, Tab. Dod. *Indicum panicula villosa*, Lob. Utriusq; semen Milio simile, sed paullo minus: coluntur in agris arenosis pro cibo rusticorum.

*Papaver hortense semine albo*, C. B. Garten Mohn mit weissen samē. *Papaver albū*, Plin. Trag. Dod. sativum, Diosc. Matth. Tab. album sativum, Lob. Flore adest candido & leviter purpureo.

*Papaver hortense nigro semine*, C. B. Garten Mohn mit schwarzem samē. *Papaver sylvestre*, Diosc. nigrum, Plin. nigrum sativum, Dod. flore malvæ hortensis aut pœoniæ, Lob.

*Papaver vulgare*, cujus capitula foraminibus hiant, semine incano, C. B. Auslauf fen-

fender Mohn. *Papaver vulgare & primum*, Trag. spontaneum sylvestre, Lob. patulum, Adv. tertium, Dod.

*Papaver cristatum floribus & semine album*, C.B. Kraußgeferbeter Mohn mit weissen blumen und samen. *Papaver fativum quartum*, Dod. fimbriatum aut cristatum album, Lob. flore niveo, Tab. Flos colore variat.

*Papaver cristatum floribus rubris, semine nigro*, C. B. Kraußgeferbeter Mohn mit rothen blumen und weissen samen. *Papaver secundum foliis dissectis*, Dod. fimbriatum aut cristatum nigrum, Lob. Flos colore variat.

*Papaver pleno flore album*, C.B. Garten Mohn mit weissen vollen blumen. *Papaver polyanthos*, Tab. album polyanthon seu multiflorum, Lob. Adest etiam flore purpureo, rubro, & variegato.

*Papaver erraticum majus*, C. B. \* Wilder Mohn der grosse/Klapperrosen. *Papaver erraticum*, Matth. Dod. Tab. erraticum rubrum, Eyst. rhœas, Diosc. Theoph. Plin. Lob.

*Papaver erraticum minus*, C B. \* & Tab. Wilder Mohn der kleine. *Papaver erraticum alterum*, Fuch. Dod. Argemone exigua, Trag.

*Papaver erraticum flore pleno*, C. B. Wilder Mohn mit gefüllten blumen. *Papaver rhœas flore pleno*, Cam. Argemone multiplex, Trag.

*Papaver corniculatum luteum*, C.B. & Eyst. Gehörneter Mohn mit gelben blumen. *Papaver*

ceratites, Diosc. Theophr. corniculatum, Matth. Lob. corniculatum primum, Tab. majus, Dod. flavo flore, Clus.

*Papaver corniculatum phœniceum hirsutum*, C.B. Gehörneter Mohn mit rothen blumen. *Papaver corniculatum rubrum*, Dod. alterum, Tab. cornutum flore phœniceo, Lob. Clus.

*Papaver corniculatum violaceum*, C.B. Lob. Dod. Gehörneter Mohn mit violblawen blumen. *Papaver corniculatum violaceo flore*, Clus.

*Papaver spinosum*, C.B. Clus. Eyft. Dornicher Mohn. *Ficus infernalis Italorum*. Flore simplici adest: flore pleno expectabatur hoc anno ex semine jacto, quod tamen plantam nullam protrusit.

*Parietaria officinarum* & *Dioscoridis*, C. B. \* Glasßkraut / S. Peterskraut / Tag und Nacht. *Parietaria*, Dod. Tab. Helxine, Matth. Fuch Lob.

*Pastinaca tenuifolia sativa radice lutea vel alba*, C. B. Garten Mohrrüben. *Pastinaca tenuifolia sativa*, Dod. *sativa Dioscoridis*, Lob. *sativa prima & secunda*, Tab. *Siler alterum*, Matth. *Carotta nostra lutea*, Cam.

*Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis*, vel *Daucus officinarum*, C. B. \* Wilde Mohrrüben / Bogelnest. *Pastinaca sylvestris*, Matth. erratica, Tab. *sylvestris tenuifolia*, Dod. *sylvestris genuina Dioscoridis*, Lob. *Daucus vulgaris*, Clus.

*Pastinaca sativa latifolia*, C. B. Garten Pastinack. *Pastinaca sativa*, Trag. domestica, Matth. Lob.

Lob. latifolia sativa, Dod. Elaphoboscum sativum, Tab.

*Pastinaca sylvestris latifolia*, C.B. \* Wilde Pastinack. *Pastinaca sylvestris*, Trag. latifolia sylvestris, Dod. Elaphoboscum, Matth. erraticum, Tab.

*Pedicularis pratensis purpurea*, C.B. \* Wiesen Nodel mit purpurblumen. *Pedicularis*, Lob. Tab. *Fistularia*, Dod. *Alectorolophi* tertium genus, Clus.

*Pedicularis pratensis lutea*, C.B. \* Wiesen Nodel mit gelben blumen. *Pedicularia lutea*, Tab. *Crista galli*, Lob. Dod. *Crista gallinacea*, Clus.

*Pedicularis aquatica flore viridi*. \* Wasser Nodel mit grünen blumen. Hanc in ripa fluminis observavi.

*Pepo oblongus*, C.B. Lob. lange Pfeben oder Peponen. *Pepo major oblongus*, Dod. maximus oblongus, Tab. Magnitudinæ fructus variat.

*Periclymenum non perfoliatum Germanicum*, C.B. \* Gemeine Specklilie/Weißblat. *Periclymenum*, Trag. Fuch. Tab. *Germanicum*, Eyst. vulgare Septentrionalium, Clus. *Caprifolium*, Off. & *Germanicum*, Dod.

*Periclymenum perfoliatum*, C.B. Lob. Tab. Eyst. Durchwachsende Specklilie. *Periclymenum*, Matth. vulgare alterum, Clus.

*Perfoliata vulgarissima sive arvensis*, C.B. \* Durchwachs. *Perfoliata*, Matth. Dod. Tab. Eyst. *Perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbilicato*, Lob.

*Per-*

*Persica molli carne & vulgaris viridis & alba*, C.B. Gemeine weiche Pfirsichen. *Persica malus*, Lob. Tab. *Malus Persica*, Dod. *Persica viridia & alba*, Matth.

*Persica dura, carne candida, aliquando ex albo subrubente*, C.B. Harte oder Herz-Pfirsichen. *Persica duracina*, Matth. *duracina alba*, Tab. *Rhodacina*, Aegin. & Aetio.

*Persica aestiva Armeniacis similia*, C. R. Frühe oder Johannis Pfirsichen. *Persica præcocia*, Tab. *pumila*, Cam. *Persicæ quartum genus*, Trag. *Persica S. Johannis*, quibusdam.

*Persica juglandina*. Nuß-Pfirsichen / glatte Pfirsichen. *Nucipersica*, C.B. Matth. quod nucum juglandium faciem repræsentent, & nulla lanugine pubescant. *Persica nux*, Anguill.

*Persicaria mitis maculosa & non maculosa*, C. B.\* gelinde Flöhkraut. *Persicaria*, Dod. altera, Trag. Matth. Tab. *mitis maculosa*, Lob. *scemina*, Lon.

*Persicaria urens*, C.B.\* & Lob. Brennend Flöhkraut. *Persicaria mas*, Lon. *Persicariæ primum genus*, Trag. Tab. *Hydropiper*, Dod. Matth. Fuch.

*Phalangium magno flore*, C.B. Erdspinnenkraut mit grossen weissen blumen. *Phalangium*, Matth. Matthioli, Tab. *Allobrogicum majus*, Clus. Eyst.

*Phalangium flore violaceo triphylo*. Violens laues Erdspinnenkraut mit dreyblettrigen blumen. Ita appellare liceat, quod *Phalangium Virginianum* vulgo. Videtur esse *Allium* aut *Moly*

Vir-



Virginianum, C. B. cui flores purpureo czrulcos tribuit, append. Pinac. pag. 520.

*Phalaris major semine albo*, C. B. Canariens-  
fraut. Phalaris, Matth. Dod. Lob. Tab.

*Phaseolus major, sive Smilax hortensis*, C. B.  
Grosse Gartenfaselen / Steigbonen / Türckische  
Bonen. Phaseolus vulgaris, Lob. Clus. Smilax  
hortensis, Trag. Matth. Tab. Fuch. Adest vario-  
rum colorum.

*Phaseolus minor, sive Smilax hortensis minor*,  
C. B. Kleine garten Faselen. Dolichus alter, Dod.  
Adest subniger, ruffus, varius.

*Phaseolus parvus Italicus, vel Smilax siliqua  
sursum rigente*, C. B. Kleine welsche Faselen. Pha-  
seolus, Matth. Adest altus & subniger.

*Phaseolus Aegyptiacus nigro semine*, C. B. Ae-  
gyptische Faselen. Phaseolus niger Lablab vocatus,  
Alpin. Phaseolus peregrinus Leblab, Clus.

*Phaseoli Indici aliquot species.* Indianischer  
Faselen etliche arten. Speciatim, Brasilianus maxi-  
mus: Peruvianus coccineus, nigra macula notatus:  
Ovalis niveus: alii.

*Philycaelator*, C. B. Heher Alatern. Philyca  
Theophrasti, Bellon. Alaternus prima, Tab. Clus.  
Folia huic sunt oblongiora: sicut sequenti sunt ma-  
gis circinata.

*Philyca humilior*, C. B. Niedriger Alatern. Ala-  
ternus alter, Clus. Tab. alter humilior latifol. Lob.

*Picea major prima, sive Abies rubra*, C. B. \*  
Pechbaum / Rothe Thanne. Picea, Matth. Lob. Tab.

Ph-

Plinii & Abies mascula Theophrasti, Clus. Abies, Dod. Tæda Plinii, Cæsalp. Piceæ summitates seorsim pingit, Eyst.

*Pilosella major repens hirsuta*, C. B.\* Kriechende Piloselle / Nagelkraut. Pilosella, Matth. Lob. Tab. major, Dod. Auricula muris minor, Lon. Trag.

*Pilosella erecta flore flammeo*. Auffrechte Piloselle mit flammigen blumen. An Pilosella major erecta altera, C. B. quæ Pilosella major altera, Tab.

*Pimpinella saxifraga major umbella candida*, C. B.\* Grosse wilde Pimpinelle. Pimpinella, Trag. Lob. saxifraga. Matth. Saxifraga magna, Dod. Tragoselinum majus, Tab.

*Pimpinella saxifraga minor*, C. B.\* Kleine wilde Pimpinelle. Pimpinella, Saxifraga hircina minor, Lob. Saxifraga parva, Dod. Saxifraga pimpinella Germanica minor, Clus. Tragoselinum petraeum, Tab.

*Pimpinella sanguisorba major*, C. B.\* Grosse Sanguisorba. Pimpinella seu Sanguisorba major, Matth. Pimpinella major sylvestris, Dod. Italica major, Clus. Sanguisorba major, Tab. altera major, Lob.

*Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta*, C. B. Kleine Sanguisorba oder Welsche Pimpinelle. Pimpinella, Lob. Sanguisorba, Dod. minor, Matth. Italica, Trag. Sanguisorba minor, Fuch. Tab.

*Pinus sativa*, C. B. Pinienbaum. Pinus, Trag. Dod. Lon. domestica, Matth. Tab. vulgarissima, Lob. Italica, Cam. Huic Pineæ nuces innascuntur, quarum nucleis satis propagatur. Ad nos quidem etiam arbusculæ cubitales ex Italia advehuntur, ad insignem tamen magnitudinem pervenire ipsas, aut fructus ferre nondum observavi.

*Pinus sylvestris*, C. B.\* & Matth. Fichte/ Kienbaum. Pinus sylvestris montana, Theoph. Tab. Pinaster, Trag. Lob. Pinus sylvestris sive Pinaster, Dod. Omnium copiosissimè apud nos crescit, cæditurque in lignum focarium ac trabale, itemque pro eliquanda pice.

*Piper Indicum vulgatissimum*, C. B. Indianischer Pfeffer mit länglichen schoten. Piper Indicum, Matth. medium, Eyf. Capsicum, Clus. in Monard. vel piper Indicum longioribus siliquis, Lob. Siliquastrum, Trag. Tab.

*Piper Indicum propendentibus siliquis rotundis*, C. B. Indianischer Pfeffer mit hangenden runden schoten. Siliquastrum latis siliquis, Trag. quartum, Fuch. fructu propendente rotundo, Regius in Clus. cur. post. Capsicum cordatum, Cam. & præterea varii generis alia.

*Pistacia peregrina fructu racemoso*, C. B. Pistacien. Pistacia, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyf. Terebinthus Indica, Theoph.

*Pistacia sylvestris*, C. B. Pimpernisse. Pistacia Germanica, Lon. Nux vesicaria, Trag. Dod. Staphylodendron, Matth. Lob. Tab. Eyf. Pi-

*Pisum majus quadratum*, C. B. Eckige Stabelerbſen. Fructus exſiccatione anguloſi fiunt. *Pisum majus*, Dod. quadratum Plinii, Lob. ic. Tab. magnum peregrinum, Eyſt. Piſa Italica grandia, Cam.

*Pisum hortense majus*, C. B. Kunte Stabelerbſen. *Pisum majus*, Matth. vulgatiuſ majus, Lob. ic. minus, Dod. Huc pertinet *Pisum præcox*, Früherbſen / quoniam citius reliquis ad maturitatem pervenit adjuvante præcoci ſatione.

*Pisum umbellatum*, C. B. Traubelerbſen / quoniam ſiliquæ racematim dependent. *Pisum proliſerum*, Tab. Piſorum primum genus, Trag.

*Pisum arvenſe*, C. B. Gelderbſen. *Pisum minus*, Matth. Dod. minus primum & ſecundum, Tab. Colore albicat fructus exſiccatus: adeſt tamen in hoc genere, cujuſ ſemini viror remanet, etiam ſiccato: vulgo Piſa viridia, grüne Erbſen.

*Pisum cathartium*. Purgier Erbſen. Ab effectu, quoniam fructus recens comeſtus alvum movet. Semen ſubſcuſcum eſt, non exacte rotundum, ſed foveis inæquale.

*Pisum leptolobum*. Dünnschälige Erbſen / Erbſen ohn ſchalen / Zuckerſchoten. Piſa ſine cortice durior, C. B. Piſa leptoloba, quæ ſimul cum folliculis comeduntur.

*Piſa gratioſa*. Erwten van gracie. Hæc A. 1658. primum innotuerunt Hagæ Comitſ per civem Joan. Babelium Adrians, cujuſ de ipſorum quali-



tatibus programma impressum extat. Videntur id peculiare præ aliis habere, quod sine ridicis crescant.

*Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato*, C. B. Blasenerbsen. *Pisum cordatum*, Lob. Eyst. Halacacabum peregrinum, Dod. Tab. Vesicaria sive Halicacabum repens, Matth.

*Pisum Indicum majus*, C. B. Grosse Indianische Erbsen. Color nostro subfuscus maculis variegatus. Huc pertinere videtur *Pisum Hispanicum Sarabanda* dictum, colore albidum, magnum, tuberosum, umbilico eminente.

*Pisum Indicum minus coccineum*, C. B. Kleine Indianische Erbsen. *Pisum coccineum* Americum, Lob. Phaseolus ruber Abrus vocatus, Alpin. Phaseolus Indicus Ginge & Abrus, Cam. Vicia Africana, Clus. exot.

*Pisum Chinense viride*. Grüne Chinesische Erbsen. An *Pisum virulentum Chinense*, C. B. Parva sunt, ex rotunditate oblongula, coloris viridis, cum umbilico albicante.

*Plantago latifolia sinuata*, C. B. \* Wegerich/Wegebreit. *Plantago major*, Matth. Dod. Tab. vulgaris latifolia, Lob. rubra, Trag.

*Plantago latifolia incana*, C. B. \* Wegerich mit breiten grauen blettern. *Plantago media*, Matth. Dod. minor Dioscoridis, Tab. major incana, Lob. Clus.



*Plantago latifolia rosea flore expanso*, C. B. Rosen-Wegerich. *Plantago rosea*, Lob. ic. Cam. Eyst. Succellu temporis flos expansus spicam acquirit, & tunc vocatur.

*Plantago latifolia rosea floribus quasi in spica dispositis*, C. B. *Plantago rosea*, Adv. multiplex, Tab. rosea spicata, Eyst.

*Plantago angustifolia major*, C. B. \* Schmalblettriger Wegerich der grosse / Spiz Wegerich. *Plantago minor*, Dod. lanceolata, Trag. Tab. longa, Matth. quinquenervia, Lob.

*Plantago angustifolia minor*, C. B. \* & Tab. Schmalblettriger Wegerich der kleine. *Plantago pentaneuros minor*, Thal. Lanceola minor, Cæs.

*Plantago aquatica latifolia*, C. B. \* Wasser-Wegerich der breite. *Plantago aquatica*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Fuch.

*Plantago aquatica angustifolia*, C. B. \* Wasser-Wegerich der schmale. *Plantago aquatica minor*, Tab. aquatica humilis angustifolia & longifolia, Lob.

*Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas*, C. B. Pöonie mit nussblettern. *Pæonia mas*, Matth. Lob. Dod. Tab. Eyst. foliis nucis, Gesn. hort.

*Pæonia communis vel fœmina*, C. B. Gemeine Pöonie mit einfachen blumen. *Pæonia fœmina*, Lob. fœmipa altera, Dod. vulgaris fœmina, Clus. rubra flore simplici, Eyst.

*Pæonia fœmina flore pleno rubro majore*, C. B. Pöc.

Pöonie mit grossen vollen rothen blumen. *Pœonia* *scemina multiplici flore*, Dod. Tab. *scemina polyanthos*, Lob. *polyanthos flore rubro*, Eyst.

*Pœonia flore pleno rubro minore*, C. B. Pöonie mit kleinen vollen rothen blumen. *Pœonia pleno rubro flore minor*, Clus. *altera flore pleno dilutior & minore*, Cam.

*Pœonia flore exalbido pleno*, C. B. Fleischfarbene Pöonie. *Pœonia sexta sive exalbida plena*, Clus. *flore pleno incarnato*, Eyst.

*Polium maritimum supinum Venetum*, C. B. Meer Polium. *Polium repens*, Dod. *montanum purpureum*, Lob. Tab. *quintum purpureum*, Clus.

*Polygala vulgaris*, C. B. \* Creuzblume. *Polygala*, Lon. Tab. *vulgaris minor*, Clus. *recentiorum*, Lob. *Flos ambarvalis*, Dod. *Polygalon flore rubro purpurascete, & flore cæruleo*, Eyst.

*Polygonatū latifolium vulgare*, C. B. \* & Clus. Weiswurz. *Polygonatum*, Matth. *latifolium*, Dod. Lob. Tab. *vulgatius*, Eyst. *Sigillū Salomonis*, Trag.

*Polygonum latifolium*, C. B. \* Breitblettrig Wegegras / Tausentknoten. *Polygonum majus*, Tab. mas, Matth. Dod. *mas vulgare*, Lob. *Centumnodia*, Brunsf.

*Polygonū brevi angustog folio*, C. B. \* Schmalblettrig Wegegras. *Polygonum secundum*, Tab.

*Polygonum cocciferum*, C. B. \* & Cam. ep. Coccinellen Wegegras. *Arenosis locis ubique obvium, cujus radicibus circa solstitium æstivū gra-*

na adnascuntur cocci æmula, quorum liquor rubellus sat eleganter tingit. Quod si loco sicco ipsa ferventur, indurescunt, & rugis contractis Coccinellam Officinarum veram mentiuntur. Plebs sanguinem divi Johannis, S. Johannis Blut nominat, sibi que falso persuadet, non inveniri hæc grana, nisi quotannis die vigesima quarta M. Junii, & quidem ipsa meridiei hora: ea verò elapsa evanescere. Idem prorsus simplex credulitas magis superstitiose, quam vere asserit de momento reperiundæ Osteocollæ, quæ ad radices vinearum Berolinensium frequens.

*Polygonum minus candicans*, C. B. Schneeweis Wegegras. *Polygonum montanum*, Tab. montanum niveum minimum, Lob. *Paronychia Hispanica*, Clus. Planta adulta membranulis prædita est niveis, novella non item: in Italia candidissimam vidimus, à quo candore apud nos non parum remittit.

*Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens*, C. B.\* Knaewel/Trag. *Polygonum minus polycarpon*, Tab. minus seu foemina, Lon. *Saxifraga Anglica*, Lob. ic.

*Polygonum minus*, seu *Millegrana major*, C. B.\* Tausendforn. *Polygonum minus*, Matth. *Polygoni genus Herniaria* appellata, Clus. *Herniaria*, Dod. Tab. *Herba Turca*, Lob.

*Polypodium vulgare*, C. B.\* Engelsüss. *Polypodium*, Trag. Matth. Lob. Tab. majus, Dod.

*Polytrichum aureum medium*, C.B.\* Göllden Wiedertod. *Polytrichū nobile*, Trag. *Adiantum aureum*, Off. *aureum minus*, Tab. *Muscus capillaris*, Dod.

*Polytrichum aureum minus*, C.B.\* Klein Göllden Wiedertod. *Polytrichum minus*, Trag. *aureū tertium*, Lon. *Musci capillaris altera species*, Dod.

*Populus alba majoribus folijs*, C.B.\* Weisser Pappelbaum. *Populus alba*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Populi albæ alia species*, Trag. *Folia in dorso candicant: sequentibus minus frequens*.

*Populus nigra*, C.B.\* Matth. Dod. Lob. Tab. Schwarzer Pappelbaum. *Populus prima sive vulgaris*, Trag. Ex hujus gemmulis Vug. *populneum confit*.

*Populus tremula*, C.B.\* Aspe. *Populus Lybica*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Cercis Theophrasti sive Populus Lybica Plinii*, Clus. *Folia longis & subtilibus pendent pediculis: unde aere etiam quieto perpetim tremunt*.

*Porrum commune capitatum*, C.B. Asch. lauch. *Porrum*, Dod. Tab. *commune*, Matth. *vulgare*, Lob.

*Porrum sectivum latifolium*, C.B. Schnitt. lauch. *Porrum sectivum*, Dod. *sectivum capitatum*, Matth. *tonsile & capitatum*, Lob. *Scilicet sectivum à capitato, non nisi tonsura differt*.

*Portulaca latifolia seu sativa*, C.B. Garten Portulac / Wurzelkraut. *Portulaca domestica*,



Matth Lob. Tab. hortensis; Trag. sativa, Eyst.

*Portulaca angustifolia sive sylvestris*, C. B. \*

Wilde Portulac. *Portulaca sylvestris*, Trag. Matth.

Dod. Lob. arvensis, Tab. minor, Cam. Gesn. hor.

*Potamogeton rotundifolium*, C. B. \* Rund-  
blettrig Samfraut. *Potamogeton*, Trag. Matth.  
Tab. Fuch. Lon.

*Potamogeton folijs latis splendentibus*, C. B. \*  
Samfraut mit breiten glänzenden blettern. *Pota-  
gometon altera*, Dod. *Folia huic perinde, ut ro-  
tundifolio, flaccidiora.*

*Potamogeton Salicis folio*, C. B. \* Samfraut  
mit weidenblettern. *Potamogeton angustifolium*,  
Tab. sive fontalis & spicata, Lob. ic. Adv. *Potamo-  
geton*, Dod. *Folia huic solidiora.*

*Potentilla*, C. B. \* & Matth. Gänserich / Gänse-  
fraut. *Anserina*, Trag. Tab. Argentina, Dod. Lob.  
In magnitudine apud nos admodum evariat.

*Prung*, C. B. Trag. Matth. Dod. Pflaumbaum.  
*Prunus sativa*, Fuch. domestica, Lob. Quorsum  
pertinent *Pruna*, quæ Ariecken vulgo dicuntur, gu-  
stu acida, magnitudine majora, aut minora.

*Pruna magna dulcia atrocerulea*, C. B. Ungri-  
sche Pflaumē. *Pruna Ungarica*, Matth. Damascena,  
Trag. Brunensia, Clus. Sunt majora & minora.

*Pruna magna rubra rotunda*, C. B. Grosse  
Rospflaumen. *Pruna asinina*, Trag. asinaria, Cæ-  
salp. Dantur etiam colore flavo, quæ appellantur,  
Grosse gelbe Rospflaumen.

*Pru-*



*Pruna coloris cereæ ex candido in luteum pallescente*, C. B. Spillinge. Pruna cerea & Ceriola, Trag. Tab. Præcocia sunt majora, minora serotina. Ex istis quædã sunt ovi gallinacei magnitudine, unde dicuntur Eierspillinge. Communiter sunt cerea tantũ: alia cerea & ex parte rubra: nonnulla prorsus alba, weiße Pflaumen / sicut ova columbina.

*Prunus sylvestris*, C. B. \* Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Schlehẽ. Prunus sylvestris vulgaris, Trag. Ad vivas sepes usurpatur: fructus adstrictoria vi pollet.

*Pruna sylvestria præcocia*, C. B. \* Haberschlehen. Pruni sylvestris altera species, Trag. Fructus præcedente major.

*Psyllium majus erectum*, C. B. \* Psyllie. Psyllium, Trag. Fuch. Matth. Dod. Lob. primum, Tab. Pulicaris herba, Lugd.

*Pulegium latifolium*, C. B. Polen. Pulegium, \* Trag. Matth. Dod. regium, Lob. Eyft.

*Pulsatilla folio crassiore & majore flore*, C. B. Rûchenschelle. Pullatilla, Matth. Dod. Tab. vulgaris, Lob. vulgaris dilutior, Clus.

*Pyrola rotundifolia major*, C. B. \* Wintergrün mit runden blettern. Pyrola, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. vulgator, Clus.

*Pyrola folio mucronato serrato*, C. B. \* Wintergrün mit gespizten blettern. Pyrola secunda & tenerior, Clus. minor, Thal.

*Pyrola frutescens arbuti folio*, C. B. \* Staudig Wintergrün. Pyrola tertia vel frutescens, Clus.

*Pyrus sativa*, C. B. Gartenbirnen. *Pyrus*, Dod. Pyra, Matth. Lob. Ejus licet adsint permultæ species, præcipuas tamen enuberabimus solummodo, duplicem constituendo classem. Prima continebit *Pyra magis durabilia* : nimirum *Pyra hyemalia*, Winterbirnen. *Pyra Bergamensis hyemalia*, Winter Bergamotten. *Pyra Christiana hyemalia*, Winter Bonchrestien oder Christenbirnen. *Pyra muscatellina*, Moschusbirnen. *Pyra Brixiana*, Brikerbirnen. *Pyra Gorlicensis*, Görlizerbirnen. *Pyra cineracea*, Graulinge oder ungenante Birnen. Altera recenset *minus durabilia* : quæ sunt *Pyra Augustana*, Augstbirnen. *Pyra aurea*, Goldbirnen. *Pyra avenaria*, Haberbirnen. *Pyra Bergamensis æstiva*, Sommer Bergamotten. *Pyra Borussica*, Preussische Birnen. *Pyra buxea*, Burbirnen oder kleine Muscatellerbirnen. *Pyra Christiana æstiva*, Sommer Bonchrestien. *Pyra cruenta*, Blutbirnen. *Pyra cydonia*, Coignekassen oder Quittenbirnen. *Pyra globosa*, Raubirnen. *Pyra lardina*, Speckbirnen. *Pyra palatina*, Pfalzgraffer. *Pyra pendula*, Haugelbirne. *Pyra racemosa*, Traubelbirnen. *Pyra saccharina*, Zuckerbirnen. *Pyra stragulatoria*, Würgebirnen. *Pyra virginea*, Jungferbirnen.

*Pyrus sylvestris*, C. B. \* Wilde Birnen / Holzbirnen. *Pyra*ster, Gax. *Pyra sylvestria*, Tab. Vernacule fructus alicubi vocantur Knödeln.

*Quercus cum longo pedicelo*, C. B. \* Eiche.  
Quer-

*Quercus*, Trag. Matth. Tab. vulgaris, Lob. In aver-  
sa parte foliorum profert interdum pilulas aquo-  
sas, tanquam gallas imperfectus: item pilulas e fo-  
liis convolutis, & excrementa alia.

*Quinque folium album majus alterum*, C. B.  
Sünfffingerkraut mit weissen blumen. *Quinque-*  
*folium sylvaticum*, Tab. sive *Pentaphyllum*, Clus.  
*Pentaphyllum albū*, Matth. majus flore albo, Eyst.

*Quinquefolium majus repens*, C. B. \* Krie-  
chend Sünfffingerkraut das grosse. *Quinquefo-*  
*lium*, Matth. Lob. majus, Dod. luteum majus,  
Fuch. *Pentaphyllum vulgare*, Trag.

*Quinquefolium minus repens luteum*, C. B. \*  
Kriechend Sünfffingerkraut das kleine. *Quinque-*  
*folii minimum genus*, Trag. *Pentaphyllum mi-*  
*nus luteum*, Adv.

*Quinquefolium rectum luteum*, C. B. \* Auff-  
recht Sünfffingerkraut. *Quinquefolium vulgare*,  
Lob. ic. alterum vulgare, Dod. Theophrasti ma-  
jus, Tab. *Pentaphyllum majus*, Lob. Eyst. Ludit fo-  
liis ternis, quinis, senis, ut plurimum septenis.

*Quinquefolium folio argenteo*, C. B. \* Auff-  
recht Sünfffingerkraut mit silberfarbenen blettern.  
*Quinquefolium petræum majus*, Tab. erectum  
incanum, Matth. luteum minus, Fuch. Ab incautis  
cum *Tormentilla sylvestri* facile confunditur.

*Quinquefolium palustre rubrum*, C. B. \*  
Sumpffig Sünfffingerkraut mit rothen blumen.  
*Quinquefolium palustre*, Tab. Eyst. Cam. ep.

quartum, Dod. Pentaphyllon rubrum palustre, Lob. ic.

*Radix rhodia*, C. B. Rosenwurz. Rhodia radix, Trag. Matth. Dod. Chus. sive rosea radix, Lob. Rosea radix, Tab.

*Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus*, C. B. \* Wald Hanefuß. Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscoso flore, Lob. ic. Moschatella, Cam. Aristolochiæ rotundæ concauæ similis herbula, Trag. Fumaria bulbosa seu tuberosa minima, Tab.

*Ranunculus pratensis erectus acris*, C. B. \* Aufrecht wiesen Hanefuß der scharffe. Ranunculus pratensis surrectis cauliculis, Lob. hortensis secundus, Dod. sylvestris & secundus, Tab.

*Ranunculus pratensis erectus dulcis*, C. B. \* Aufrecht wiesen Hanefuß der gelinde. Ranunculus pratensis vel primus, Trag. dulcis, Tab. hortensis erectus flore simplici luteo, Eyll.

*Ranunculus pratensis repens hirsutus*, C. B. \* Kriechender wiesen Hanefuß. Ranunculus pratensis reptante cauliculo, Lob. vinealis, Tab. hortensis primus, Dod.

*Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda*, C. B. \* Wiesen Hanefuß mit wirblicher wurzel. Ranunculus exiguus & primus, Trag. minor, Tab. quintus, Matth. bulbosus, Lob. tuberosus, Dod.

*Ranunculus hortensis erectus flore pleno*, C. B.



*C. B.* Garten Hanefuß mit gefüllten blumen. *Ranunculus luteus vel tertius flore multiplici*, Trag. *Polyanthemos*, Lob. *sylvestris secundus*, Dod. *erectus hortensis flore pleno luteo*, Eyst. Hic interdum prolifer evadit.

*Ranunculus bulbosus flore pleno*, *C. B.* Gefüllter Hanefuß mit zwieblicher wurzel. *Ranunculus bulbosus major*, Eyst. *radice bulbosa flore pleno*, Cam.

*Ranunculus radice tuberosa flore pleno & prolifero*, *C. B.* Knollig Hanefuß mit gefüllten blumen und kindern. *Ranunculus tuberosus flore multiplici*, Dod. *Anglicus*, Tab. *magnus Anglicus polyanthos*, Lob. ic.

*Ranunculus folio aconiti flore albo multiplici*, *C. B.* Hanefuß mit weissen vollen blumē. *Ranunculus niveus polyanthos*, Lob. *pleno flore albo*, Clus. Eyst. *altus multiflorus*, Tab. *leucanthemos flore pleno*. Cam.

*Ranunculus arvensis echinatus*, *C. B.* \* Ufer Hanefuß mit igelformigen samen. *Ranunculus arvensis*, Tab. *sylvestris tertius*, Dod. Lob.

*Ranunculus stellatus echinatus Creticus*, *C. B.* Gestirnter Hanefuß mit igelformigen samen. *Ranunculus echinatus Creticus*, Pon. Ital.

*Ranunculus palustris apij folio laevis*, *C. B.* \* Sumpff Hanefuß mit Wassermereß blettern. *Ranunculus palustris*, Dod. Tab. *palustris rotundior folio*, Lob. *primus*, Matth. *Apium aquaticū*, Trag. *Apium risus*, quorundam. *Herba Sardoia*, Guiland.



*Ranunculus aquaticus cotyledonis folio*, C.B.\*  
 Wasser Hanefuß mit Nabelkraut blettern. *Ranunculus aquaticus umbilicato folio*, Column.  
*Cotyledon palustris*, Dod. *aquatica acris*, Septentrionalium, Lob.

*Ranunculus aquaticus folio rotundo*, & *capillaceo*, C.B.\* Wasser Hanefuß zngleich mit runden und zärrigen blettern. *Ranunculus aquatilis*, Dod. *aquatilis hepaticæ facie*, Lob. *fluviatilis*, Tab.

*Ranunculus longifolius palustris major*, C.B.\*  
 Langblettriger Sumpffhanefuß der groſſe. *Ranunculus lanceatus major*, Tab. *Hujus folia prima aliquando subrotunda sunt*, ad *Cochleariæ formam accedentia*.

*Ranunculus longifolius palustris minor*, C.B.\*  
 Langblettiger Sumpffhanefuß der kleine. *Ranunculus lanceatus minor*, Tab. *flammeus aquatilis angustifolius*, Lob. *Flammula ranunculus*, Dod.

*Ranunculus longifolius palustris serratus*, C.B.\*  
 Sumpff Hanefuß mit langen ſägenformigen blettern. *Ranunculus lanceatus serratus*, Tab. *aquatilis angustifolius serratus*, Lob. *Flammula ranunculus folio serrato*, Dod.

*Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice minor*, C.B. Asiatiſcher Hanefuß etwas wollig. *Ranunculus Illyricus*, Eyst. Dod. Lob. Tab. *grumosa radice quartus*, Cluſ.

*Ranunculus grumosa radice flore phæniceo*  
 mi-

*minimo simplici*, C.B. Asiatischer Hanefuß mit kleinen lichtrothen blumen. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice primus*, Clus. hist. & Tripolitanus phœniceo flore, pan.

*Ranunculus grumosa radice ramosus*, C. B. Asiatischer Hanefuß mit zweigen. *Ranunculus Asiaticus polyclonos sive grumosa radice secundus*, Clus. Asiaticus grumosa radice flore phœniceo ruberrimo, Eyst.

*Ranunculus grumosa radice flore flavo vario*, C. B. Asiatischer Hanefuß mit gelb und rothgestreiffen blumen. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto*, Eyst. Clus. cur. post.

*Ranunculus grumosa radice flore albo*, C. B. Asiatischer Hanefuß mit weissen blumen. *Ranunculus peregrinus grumosa radice primus*, Clus. Floris oræ suaviter rubent.

*Ranunculus asphodeli radice flore sanguineo*, C.B. Asiatischer Hanefuß mit gefüllten blutrothen blumen. *Ranunculus sanguineus multiplex*, Lob. Turcicus sive sanguineus, Tab. Asiaticus grumosa radice pleno flore secundus, Clus. Huic cognatus:

*Ranunculus asphodeli radice flore in ambitu subphœniceo rubente, in medio lineis flavis interstincto*, qualis crescebat in Hortis aulicis Bero-  
linensibus anno 1659. & 1660. Geslammeter Asiatischer Hanefuß.

*Ranunculus asphodeli radice folio lato nervoso flore flavo pleno.* Asiatischer Hanefuß mit breiten adrichen blettern und gefüllter gelben blume. Referendus ad *Ranunculum Lusitanicum primum*, Tab. aut *Lusitanicum autumnale* in *Lo-belii*, qui tamen est flore simplici, & à C. B. sub *Ranunculo latifolio bullato asphodeli radice* fuit comprehensus.

*Ranunculus asphodeli radice prolifer miniatius*, C. B. Asiatischer Hanefuß mit kindern. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore* 3. *Clus. pleno flore sanguineo prolifero*, Eyst.

*Rapa sativa rotunda seu mas*, C. B. Runde Rüben. *Rapum sativum*, Fuch. Ruell. vulgare, Trag. Dod. rotundum, Matth. orbiculatum, Tab. majus orbiculatum seu turbinatum, Lob.

*Rapa sativa oblonga, seu femina*, C. B. Lange Rüben. *Rapū oblongum*, Trag. oblongius, Dod. longum, Matth. Tab. tereti rotunda oblongaq; radice, Lob. Inter nostrates celebrantur exiguae quidem, sed grati saporis rapæ, quæ in agris vicinis Teltoiviano & Frisicano coluntur.

*Rapa sylvestris*, c. B. \* Wilde Rüben. *Rapum sylvestre*, Matth. Tab. sylvestre non bulbosū, Lob. Radix oblongula quidem, sed culinæ insueta.

*Raphanus major orbicularis vel rotundus*, C. B. Großer runder Rüberettig. *Raphanus*, Trag. rotundus, Tab. vulgaris primus, Matth. magnus, Lob. Radicula prima, Dod.

*Raphanus niger*, C.B.Lob. ic. Schwarz Rübe-  
rettig. *Raphanus cortice nigricante*, Ges. hor. ra-  
dice nigra, Cam.

*Raphanus minor oblongus*, C.B. Radis. Ra-  
phanus longus, Trag. Matth. minor purpureus,  
Lob. Radicula sativa minor, Dod.

*Raphanus rusticus*, C.B. & Lob. Merrettig.  
*Raphanus major*, Trag. marinus, Tab. vulgaris &  
rusticanus, Matth.

*Raphanus aquaticus folijs in profundas laci-  
nias divisjs*, C. B. \* Wasser Kettig. *Raphanus a-  
quaticus*, Tab. sylvestris officinarum aquaticus,  
Lob, ic. Radicula sylvestris, Dod.

*Rapistrum flore luteo*, C. B. \* Hederich mit gel-  
ben blumen. *Rapistrum*, Dod. arborum, Lob.  
Lampfana, Matth. flore melino, Tab. Hordeo ut  
plurimum innascitur: siliquæ sunt articulatae.

*Rapistrum flore albo siliqua articulata*,  
C. B. \* Hederich mit weissen blumen. *Rapistrum  
flore albo* *Erucae folijs*, Lob. ic. *Armoracia*, Tab.  
& Schroederi.

*Rapunculus esculentus*, C. B. Wurzelrapünzel.  
*Rapunculus*, Matth. Dod. Tab. *Rapunculum vul-  
gare*, Trag. *Rapuntium parvum*, Lob. Hujus ra-  
dix imprimis, deinde etiam folia ima à coquis ex-  
petuntur. Semen minutissimum omnium, verno  
tempore jacitur. *Rapunculo* vero ille spontaneus,  
Feldrapünzel est species *Valerianæ*, de qua inferio.

*Rapunculus hortensis latiore folio, seu Pyrami-  
da-*

*dalis*, C. B. Pyramidal. Campanula major, Dod. major lactescēs, Lob. lactescens fœtidior, Clus. lactaria, Tab. Pyramidalis Lutetiana, Eyst.

*Rapunculus Creticus*, seu *Pyramidalis altera*, C. B. Petromarula. Rapunculus Creticus petromarula, Jo. Bauh. Petromarula seu Lactuca petraea Cretica, Belli, Ponæ, Clus. Semen minutissimum, & ægre apud nos provenit.

*Reseda vulgaris*, C. B. Reseda. Reseda latifolia, Tab. Rheseda Plinii, Eyst. Rheseda Plinii Neoteri-  
corum, Adv.

*Rhamnus catharticus*, C. B. \* Wegedorn. Rhamnus solutivus, Dod. Spina infectoria, Matth. Lob. Tab. Clus. Spina cervina vulgo, Ges. hort. Ex baccis immaturis color luteus, ex maturis viridis paratur: itemque in Officinis Syrupus domesticus sive de Spina cervina.

*Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescenze*, C. B. Wegedorn mit Wendenblettern. Rhamnus secundus, Matth. Dod. Clus. primus Dioscoridis creditus, Lob. Oleaster Germanicus, Cord. Sanddorn/Weidendorn. Fructus Batavis Dymmenbesing / quoniam in mariuo littore locis arenosis proveniunt, dicuntur.

*Rhamnus folio subrotundo fructu compresso*, C. B. Judendorn. Rhamnus tertius, Matth. Paliurus, Dod. Lob. Eyst. Spina Judaica Crescentio. Spina Christi quibusdam.

*Rhus folio Ulmi*, C. B. Gerberbaum / Tauerbaum/  
baum/



baum/Schlingbaum. Rhus, Matth. Tab. coriaria, Dod. obloniorum, Lob. Clus. Sumach Arabum, Lon.

*Rhus myrtifolia Monspeliaca*, C. B. Gerberbaum mit Myrtenblettern. *Rhus myrtifolius*, Tab. sylvestris Plinii, Lob. Dod.

*Ricinus vulgaris*, C. B. Wunderbaum. *Ricinus*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. major, Eyft.

*Ricinus Americanus major semine nigro*, C. B. Americanischer Wunderbaum. *Ricinus Americus*, Lob. ic. Tab. Clus. not. ad Monard. Syricus, Cam.

*Rosa rubra*, C. B. & Tab. Röhre Rosen. *Rosa domestica punicea*, Matth. hortensis rubra multiplex, Trag. Damascena, Lob. sativa tertia, quæ Provincialis Gallis, Dod. Hujus folia quoniam colorem & odorem diutius servant, & adstringendi majore vi pollent, a Pharmacopœis ulurpantur ad odoramenta, & Aceti, atque Conservæ rosarum vitriolatæ confectionem. Caterum in hoc ipso frutice frequentius contingere adverti lusum illum aut errorem Naturæ, per quem ramulorum nonnulli florei prodeunt. Nimirum flos pediculo non innititur suo, sed ramulum ambit ea ratione, ut is per medium florem transiisse pulchro spectaculo videatur.

*Rosa rubra pallidior*, C. B. Blasfrohte oder Zucker Rose / quoniam ex ejus flore Conservam rosarum simplicem Officinæ parant. *Rosa holose-*  
M ricca,

cea, Lob. ic. damascena rubra, Lugd. fativa quarta, quæ francha Gallis, Dod. rubicunda, Cam. Rosam tamen rubicundam Saccharinam dictam ad priorem Bauhinus retulit.

*Rosa saturatus rubens*, C. B. Knopffrosen/ quoniam alabastro sunt crassiore : item Rohlfrosen/ quia rubor ad nigredinem vergit. Rosa prima Prænestinæ similis, Clus. purpurea sive in rubro nigricans, Cam. Ad parandam Aquam stillatitiam adhiberi quoque potest.

*Rosa purpurea*, C. B. Zeitsarbene Rosen/ Gemeine Centifolien. Rosa domestica carnis colorem referens, Matth. fativa secunda sive incarnata, Dod. provincialis major, Tab. provincialis flore incarnato pleno, Eyf. Hanc pro conficiendo Rhodopharmaco sive Syrupo Rosarum solutivo Medicamentarii nostri adhibent.

*Rosa maxima multiplex*, C. B. Grosse Holländische Centifolien. Rosa Centifolia Batavica rubra, Clus. Eyf.

*Rosa minor rubello flore*, C. B. Mayrosen/ Kleine Provinzrosen. Rosa provincialis minor, Tab. cinamomea altera, Cam. majalis quibusdam, forte ob præcocitatem. Flos exiguus, & parum odoratus : multis tamen foliolis stipatur.

*Rosa alba vulgaris major*, C. B. Weiße Rosen einfach/ und auch gefüllet. Rosa alba, Tab. fativa alba & prima, Dod. domestica alba, Matth.

Matth. hortensis candida, Trag. Istac ut plurimum pro paranda Aqua rosarum stillatitia utuntur.

*Rosa moschata simplici flore*, C. B. Einfache Moschresen. Rosa moschata & Damalcena, Matth. muscata alba, Tab. muscata hortensis flore simplici, Lob. sativa quinta, Dod. Damascena simplici flore, Cam. Eyst. Huic quam ulli alteri major vis inest hypagoga, immo tanta, ut vicena floris recentis folia devorata facile alvum subducant, suffragio Matthioli. Celebrant Itali suum Syrupum aureum Ducis Mantuani, & modum compositionis occultant Pharnacopœi illi, quibus arcanum innotuit. Nos ægre ab aliquo ipsorum extorsimus, & est sane medicamentum regium. Conficitur autem ex rosis moschatis utrisque ea tamen differentia, ut Syrupus, si hæ solæ allumantur, efficacior: sin sequentes, debilior evadat, solent tamen plerumque misceri.

*Rosa moschata flore pleno*, C. B. Belle Moschresen. Rosa moschata, Lob. ic. alba multiplex, Tab. alba Damascena flore pleno, Eyst. damascena sive moscata pleno flore, Cam. sativa quinta multiplex, Dod. Rosæ moschatae apud nos hæctenus infrequentes: e re tamen foret, in usum trahi ipsas ob insignem efficaciam. Quin & has innuere videtur Pharnacopœia Auguſtana, dum pro præparando Mucharo sive Syrupo Rosarum solutivo simplici, Rosas Damascenas

recipi jubet, quæ cum Moschatis apud Matthiolum sunt eadem.

*Rosa menstrua*. Monatrosen. Frutex valde spinosus est, & altius surgit: flores umbellatim juncti nascuntur, foliolis L. aut LX. constant, magnitudine Centifolias æquant, odore Moschatas referunt, in colore pallor rubedini prævalet: quas notas peculiari Programme expressit Exc. Dn. Leonhardus Ursinus. An Rosa moschata semper vireus, C. B. & Clus. app. alt. auct. Rosa Italica perpetua, siue omnium mensium, Jo. B. Ferrarii l. 3. Floræ c. 18. & Illustr. Comitis Octavii Brembati lib. 1. Protei Legati. Id autem ingenii habet Rosa hæc, ut primo vere calyces confertissimos quidem simul parturiat, eosdem vero non simul, sed successive aut per intervalla explicet: quod si primum hiantes decerpas, ferotini tota æstate vernaturi nascuntur. Deinceps autumnno sese denuo in calyces effundit, à quibus ipsa hyems in Hibernaculis flores expectet: adeo ut per naturam hic frutex biflorus sit, seu potius genituram florum bis protrudat, qui se ordine alii post alios pandunt. Amputatione autem & verna & autumnali non parum ingenita vis excitatur: immo Brembatus in singulis vasis per singulos menses (sicut in cultura Anemonarum fieri solet) frutices novos pangit, alimentum primo subtrahit, deinde affatim inundat, atque hoc artificio rosetum sibi toto anno floridum comparat.

Ro-

*Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato, C. B.\* Wilde Rosen/* cujus fructus vesci sunt, & plebi dicuntur Haagebutten/Wipen: *Rosa sylvestris*, Matth. Dod. Tab. canina odorata & sylvestris, Lob. Cynosbatus Dioscoridis, Lon. Cynorrhodos, Plinii. Huic crebro adnascitur spongiola castaneæ similis, quæ Bedeguar officinis nuncupatur.

*Rosa odore cinamomi simplex, C. B. Zimmetrose. Rosa cinamomina*, Dod. Rose de canelle, Lob. ic.

*Rosa flore simplici miniata, aversa parte luteo. Türkische Rosen. Rosa Turcica flore simplici luteo-phœniceo*, Hort. Hafniensis. *Rosa flavo-rubra* dici quoque posset.

*Rosa lutea simplex, C. B. Einfache gelbe Rosen. Rosa lutea*, Lob. Cam. flore simplici, Eyst. citrina, Gesn. hor. sylvestris tertia vel *Rosa octava*, Dod.

*Rosa lutea multiplex, C. B. Viole gelbe Rosen. Rosa flava plena*, Clus. lutea maxima flore pleno, Eyst. Est flore expanso, & flore semiclauso.

*Rosa Hierichuntea vulgo dicta, C. B. Rose von Jericho. Rosa Hiericontea*, Lon. Lob. aperta & conclusa, Eyst. Hierichontina prima & secunda, Tab.

*Rosmarinus hortensis angustiore folio, C. B. Rossmarin Rosmarinus*, Trag. Rosmarinum coronarium, Matth. Lob. Eyst. Nobilior habet



betur, cui folia latiora; varietas tamen hæc est, non constituens peculiarem speciem.

*Rosmarinus folio maculato.* Bergülster Rosmarin. quoniam maculis luteis, aut auri quodammodo a mulis, folia hinc inde asperguntur: cætera ab altero non differt.

*Ros solis folio rotundo, C. B.\** Sonnentau. Ros solis, Dod. Rorida sive Ros solis major, Lob. Rorella minor prima, Tab. Ror. sive Ros solis, Eyst.

*Rubia tinctorum sativa, C. B.* Serberroh. te. Rubia sativa, Trag. Matth. Dod. major, Lob. Clus.

*Rubus vulgaris, sive fructu nigro, C. B.\** Schwarze Brombeern. Rubus, Matth. Dod. Lob. arvensis, Tab. Fructus grati saporis, & moris similes.

*Rubus repens fructu caesio, C. B.\** Blauschwarze Brombeern. Rubus minor, Dod. humilis & primus, Trag. humilis Belgicus, Clus.

*Rubus odoratus Americanus.* Americanische Brombeerstaude. Rubus magnus odoratus, Hort. Lugdun. Batav.

*Rubus Idæus spinosus, C. B.\** Hindbeern. Rubus Idæus, Trag. Matth. Dod. Lob. Idæus vulgaris, Clus. Fructus spiritus vitales reficit: quamobrem inde Syrupus, Vinum, & Acetum parantur.

*Ruscus, C. B.* Trag. Matth. Lob. Tab. Eyst. Meusebarn/Myrtendorn. Ruscum, Dod. Myrtacantha, Lob. ic. Bruscus, quorundam.

*Ruta hortensis latifolia*, C. B. Raute. Ruta, Matth. domestica, Trag. hortensis, Lob. latifolia, Tab. graveolens hortensis, Dod.

*Sabina folio Tamarisci*, C. B. Unfruchtbarer Sevenbaum. Sabina, Trag. Fuch. Dod. Lob. sine baccis sive sterilis, Matth. Savina mas, Tab.

*Sabina folio Cupressi*, C. B. Fruchtbarer Sevenbaum. Sabina altera, Dod. baccifera, Matth. foemina minor, Tab. genuina baccifera atrorubra, Lob.

*Sagitta aquatica minor latifolia*, C. B. \* Pfeilkraut mit breiten blettern. Sagitta minor, Matth. Dod. Lob. Tab. Sagittalis & Sagittaria, quorundam.

*Sagitta aquatica minor angustifolia*, C. B. \* Pfeilkraut mit schmalen blettern. Sagitta minor angustifolia, Tab.

*Salix vulgaris alba arborescens*, C. B. \* Weiße Wynde/ oder Wynde mit weissen gerten. Salix Dioscoridis, Lob. prima vel major, Dod. ex qua perticae fiunt, Matth.

*Salix vulgaris rubens*, C. B. \* Röthliche Wynde. Salix minor, viminalis & Gallica, Dod. colore rufescente, Matth. primum genus, Lon. Hujus vimina ad vinciendum idonea, praecipue si aqua prius macerentur. In ramorum cacumine nonnunquam observavi, pilulas crispas, foliosas, & ad formam spicae digestas adnasci.

*Salix vulgaris nigricans folio non serrato*, C. B.\* Schwarzhliche Weide mit ungeferbeten blettern. Salicis primum genus, Trag. Fuch. *Salix nigra* seu *punica*, Lon.

*Salix sativa lutea folio crenato*, C. B.\* Gelbe Weide mit geferbeten blettern. *Salix tertia*, Trag. *angustifolia sylvestris*, Tab. Salicis alterum genus, Fuch.

*Salix folio amygdalino utrinque virente aurito*, C. B.\* Weide mit geöhrten Mandelblettern. *Salix sylvestris latifolia*, Tab. Singulorum foliorum exortibus alæ binæ apponuntur.

*Salix fragilis*, C. B.\* Bruchweide. *Salix alba*, Lon. secunda cortice candido, Trag. Hæc ad vincula prorsus inutilis.

*Salix latifolia rotunda*, C. B.\* Senlweide mit runden blettern. *Salix latifolia*, Clus. *caprea rotundifolia*, Tab. Hujus carbone pictores utuntur elegantiores, & qui pulverem tormentarium conficiunt. In ejus ramulis folia dense interdum congeruntur, ut Rosam flore pleno referant: sicut aliquoties mihi observare licuit.

*Salix folio ex rotunditate acuminato*, C. B.\* Senlweide mit etwas gespizten blettern. *Salix caprea latifolia*, Tab. *aquatica*, Lob. ic. Præcedenti cognata, & vix alia re, quam forma folii differt.

*Salix pumila linifolia incana*, C. B.\* Zwergweide. *Salix pumila angustifolia* prior, Clus. Valde frequens quibusdam sabuletis nostris: sed folia

lia non sunt tam acuta, quam a Clusio pinguntur. Præterea maiorem, & minorem quandam reperimus.

*Salvia major*, C. B. Matth. Dod. Tab. Gresse Salben. *Salvia latifolia*, Clus. major scabrior Dioscoridis, Lob. major latifolia flore caruleo, Eyst.

*Salvia minor aurita*, & *non aurita*, C. B. Kleine geöhrte und ungeöhrte Salben / Kreuz Salben. *Salvia minor*, Matth. Lob. Tab. pinnata, Eyst. angustifolia, Clus.

*Sambucus fructu in umbella nigro*, C. B.\* Gemeiner Stieder / Holunder. *Sambucus*, Matth. Dod. Lob. ic. Tab. vulgaris, Trag. Hunc Salici innatum aliquoties invenimus, pro amuleto contra Epilepsiam: immo tota hæc stirps juxta singulas partes medicinalis est.

*Sambucus racemosa rubra*, C. B. Traubenstieder mit rothen beeren. *Sambucus sylvestris*, Trag. montana, Matth. montana racemosa, Lob. quarta, Dod. cervina, Tab.

*Sambucus laciniato folio*, C. B. Stieder mit zerschnittenen blettern. *Sambucus laciniata*, Tab. foliis laciniatis, Lob. lacinoso folio, Dod.

*Sambucus humilis sive Ebulus*, C. B.\* Attig. Ebulus, Trag. Matth. Lob. Tab. sive humilis *Sambucus*, Dod. Vulgaris altitudinem non attingit hic: purgandi vero virtute magis pollet.

*Sambucus aquatica flore simplici*, C. B.\* Wasser

ser= Glieder mit schlechten blumen. *Sambucus aquatica*, Trag. Matth. Tab. Lob. ic. palustris, Dod. Hujus baccæ per maturitatem rubentes, vulgo Kallinen dicuntur, quibus aucupes pro capiendis turdis tempore autumnali, quoties baccæ Sorbi sylvestris desunt, utuntur.

*Sambucus aquatica flore globoso pleno*, C. B. Wasserflieder mit kuglichen blumen / Schneeballen. *Sambucus aquatica polyanthos*, Tab. rosea, Lob. ic. Eyst. palustris secunda, Dod.

*Sanicula officinarum*, C. B. \* Sanickel. Sanicula, Trag. Dod. Tab. Eyst. Diapensia, Matth. Sanicula & Diapensia, Lob.

*Sanicula montana latifolia laciniata*, C. B. Breitblettrig Berg-Sanickel. *Sanicula montana*, Clus. alpina, Tab. Cortusa, Matth. Caryophyllata Veronensium flore Saniculæ ursinæ, Lob. Nostræ prior figura Clusii & Tab. magis quadrat.

*Sanicula Cortusa Americana*. Americanische Cortusa oder Bergsanickel. A præcedenti non parum differt.

*Sanicula montana rotundifolia major*, C. B. Rundblettrig Bergsanickel die grosse. *Sanicula montana altera*, Clus. Eyst. alpina, Cam. ep. guttata, Eid hor. Caryophyllata sive Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Adv. Lob. ic. Umbilicus Veneris Septentrionalium, nonnullis Italis.

*Sanicula montana rotundifolia minor*,  
C. B.



C. B. Rundblettrig Berg-Sanickel die kleine,  
*Sanicula montanae alterius species secunda*,  
 Clus.

*Sanicula alpina lutea*, C. B. Bährohren mit  
 gelben blumen. *Sanicula sive Auricula ursi*,  
 Matth. *Auricula ursi*, Dod. floribus luteis,  
 Tab. Eyft. prima vel luteo flore, Clus. Paralyti-  
 ca alpina *Sanicula*, Lob. Item flore albo, argenteo,  
 maculato.

*Sanicula alpina purpurea*, C. B. Bährohren  
 mit purpurblumen. *Sanicula alpina rubra*, & *Pri-*  
*mula alpina latifolia*, Tab. *Auricula ursi secunda*,  
 Clus. flore purpureo, Lob. ic. Item flore rubro,  
 & incarnato.

*Saponaria major levis*, C. B. Seiffkraut.  
*Saponaria*, Dod. Lob. Tab. Eyft. *Viola agre-*  
*stis*, Trag.

*Saponaria major flore pleno*. Seiffkraut  
 mit vollen blumen. Color floris ex albo dilute  
 purpurat.

*Satureja hortensis*, C. B. Rölle / *Saturey*: com-  
 muniter etiam Pfefferkraut / quæ tamen ap-  
 pellation Lepidio magis proprie competit. *Satu-*  
*reja*, Trag. Dod. Lob. Tab. altera, Matth. dome-  
 stica, Eyft. *Thymbra*, Dios. Plauta est annua, se-  
 quens vero perennat.

*Satureja montana*, C. B. Rölle / Winterpfeffer-  
 kraut / Spanisch Thymian. *Thymbra*, Dod.  
 Tab. Eyft.

*Saxifraga rotundifolia alba*, C.B. \* Weisser Steinbrech. *Saxifraga alba*, Trag. Dod. Tab. alba tuberosa radice, Clus. alba chelidonides, Lob. *Saxifraga quarta*, Matth. Huic grana ad radices nascuntur.

*Saxifraga rotundifolia aurea*, C.B. \* Göllden Steinbrech. *Saxifraga aurea*, Dod. Eyst. aurea lichenis facie & natalitiis, Lob. *Chrysosplenium*, Tab. An Hepatica palustris, Eyst. qui tamen quare ipsi flores hic pingat cæruleos, nondum liquet, nisi sit planta ab hac diversa.

*Scabiosa pratensis hirsuta*, quæ *Officinarum*, C.B. \* Scabiose / Apostemkraut. *Scabiosa aivenensis*, Tab. altera campestris seu segetum, Lob. ic. vulgaris, Eyst. *Scabiosæ* primum genus, Trag.

*Scabiosa multifido folio, flore flavescente*, C.B. Kleiu zerschnittene Scabiose mit gelben blumen. *Scabiosa septima*, Clus. *Pannonica flore albo*, Eyst. lutea è Thuringia, Cam.

*Scabiosa flore globoso niveo*, C.B. Scabiose mit kuglichen schneeweissen blumen. *Scabiosa alba in hortis Belgii*, Clus. *Belgica flore albo*, Eyst.

*Scabiosa prolifera folio latiore*, C.B. Scabiose mit nebenblümlein. *Scabiosa prolifera*, Tab. Lob. ic. prolifero flore, Clus.

*Scabiosa latifolia non laciniata flore purpureo muscato*. \* Moschriechende Scabiose. An *Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda*, vel *Scabiosa minor capitulo globoso odoro*, C.B. In syl-

*Sylva Mullenbecensi, quæ transitur Aurangiburgum profectis.*

*Scabiosa capitulo globoso major, C.B.\** Rundköpffige Scabiose die grosse. *Scabiosa minor, Matth. Lob. media, Dod. quinta sive montana, Clus. vigesima fœmina herbariorum, Tab.*

*Scabiosa capitulo globoso minor, C.B.\** Rundblettrige Scabiose die kleine. *Scabiosa minor secunda, & quinta, Tab. angustifolia flore subcæruleo, Eyst.*

*Scabiosa stellata folio laciniato major, C.B.* Stern-Scabiose mit zerschnittenen blettern. *Scabiola peregrina, Dod. Hispanica major, Clus. Lob. Tab. Eyst.*

*Scabiosa stellata folio non dissecto, C.B.* Stern-Scabiose mit unzerschnittenen blettern. *Scabiosa peregrina, Lob. peregrina foliis non dissectis, Tab. arborea Cretica, Ponæ.*

*Scilla vulgaris radice rubra, C.B.* Meerzwiebel. *Scilla, Trag. Matth. rubentibus radicis tunicis folio aloes carinato, Lob. Pancratium, Dod. Tab. Clus.*

*Scolymus chrysanthemus, C.B.* Gold-Distel. *Scolymus Theophrasti, Clus. Lob. Tab. Cam. Carduus chrysanthemus, Dod.*

*Scordium, C.B.\** Lachenknoblauch. *Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst.*

*Scordium alterum seu Salvia sylvestris, C.B.\** Galben-Scordium. *Scordium alterum Plinii*

nii, Lob. Cam. *Salvia sylvestris*, Trag. *agrestis* five *Sphacelus*, Dod. *Scorodonia*, Cord. Thal.

*Scorpioides bupleuri folio*, C. B. Tab. Cam. Scorpionkraut. *Scorpioides prior*, Dod. *repens bupleuri folio*, Lob.

*Scorpioides portulacæ folio*, C. B. Scorpionkraut mit Portulac blettern. *Scorpioides Matthioli*, Dod.

*Scorzonera latifolia sinuata*, C. B. Spanische Scorzonere oder Schlangennord. *Scorzonera*, Dod. Lob. *Hispanica*, Matth. Tab. *major Hispanica prima*, Clus. *Salsifix d'Espagne*, Gallis: quoniam in radice utuntur in cibis perinde, ut radice *Tragopogi*.

*Scorzonera latifolia altera*, C. B. Deutsche Scorzonere. *Scorzonera Germanica*, Tab. *latifolia*, Eyllt. *Boemica*, Matth. Lob. *major vel pannonica prima*, Clus.

*Scrophularia nodosa foetida*, C. B.\* Knotenkraut/ Braunwurz. *Scrophularia*, Matth. Dod. *major*, Lob. Tab.

*Scrophularia aquatica major*, C. B.\* Wasser-Knotenkraut das grosse. *Betonica aquatica*, Dod. Lob. Tab. *Ocimum majus*, Trag.

*Scrophularia aquatica minor, five palustris non foetida*, C. B.\* Wasser-Knotenkraut das kleine. *Scrophularia foemina*, Cam. ep. *Betonica aquatica septentrionalium species minor*, Lob.

*Secale hybernum*, C. B. Winter Rogge / quoniam autumnno satum, licet ante hyemem prodeant folia graminea, culmos tamen non profert nisi vere subsequēntis anni, æstate demum perficiendum. *Secale*, Matth. Lob. Tab. Siligo veterum & *Secale*, Trag. Rogga sive *Secale* Plinii, Dod. Hoc apud nos verno vulgatius. Datur vero ejus singularis quædam quasi species, quam à culmorum multitudine *Staudenrogge* nominant: spicæ bipalmæares sive octo unciarum sunt, & granis admodum turgent. Requirit solum fertile, & sationem minus densam. Seri in Norvegia & Pomerania ob fertilitatem non paucis locis solet: inde in Marchiam allatum nuper & tam felici successu satum, ut anno præsentis septuagenum granum tulerit. Vocari *Secale hybernum* fertilius posset.

*Secale vernum*, C. B. Sommer Rogge / quod vere primo feritur, & subsequente mox æstate maturefcit. Grana *Secalis hyberni* ab alterius granis vix possunt solo visu discerni, si miscantur: ideoque singula seorsim asservanda veniunt. Siligo æstiva, Trag. Rogga sive *Secale æstivum*, Dod.

*Securidaca lutea major*, C. B. Groß Beylsfraut. *Securidaca major*, Matth. vera, Clus. Hedyсарum, Ges. hor. Lon. majus, Cam. primum, Dod. sive *Securidaca major*, Lob.

*Securidaca lutea minor corniculis recurvis*,  
C. B.



C. B. Klein Beylfraut. *Securidaca minor*, Matth. Lob. Cam. *Hedysarum alterum*, Dod. *Astragalus Monspeliacus*, Clus.

*Securidaca filiquis planis utrinque dentatis*, C. B. Zwenfchneidig Beylfraut. *Securidaca peregrina*, Clus.

*Sedum majus arborescens flosculis candidis*, c. B. Baumicht Hausflaub. *Sedum majus legitimum*, Clus. *arborescens majus Græcum*, Lob. ic. Eyst. *Sempervivum arborescens*, Matth. Dod. Aizoon *arborescens*, Cam.

*Sedum majus vulgare*, C. B. Grosse Hauswurz/ Hausflaub. *Sedum majus*, Tab. vulgare, Eyst. *Sempervivum majus*, Matth. Lob. *majus alterum sive Jovis barba*, Dod. *Cotyledon altera prima*, sive *Sedum majus vulgare*, Clus.

*Sedum majus montanum dentatis folijs*, C. B. Groß Hausflaub mit bezähnten blettern / Spinnweb/ quoniam per cuspides foliorum fila visuntur quasi ab araneis ducta. *Cotyledon altera secunda*, Clus. Aizoon seu *Sempervivum majus*, Thal.

*Sedum majus montanum folijs non dentatis, fl. rubentibus*, C. B. Groß Hauswurz mit rechten blumen. *Sedum minus flore rubente*, Eyst. *Cotyledon altera tertia*, Clus. Etiam in hac fila ducta apparent.

*Sedum cristatum lato caule*. Breitstenglich Hauswurz oben ganz gefrauset. *Sedum Burgundicum*, quibusdam. *Caule est lato, plano, & sub*  
initium

initium rubente: inferius is acuminatur, & ex  
 cuspe terræ commissa radículas emittit fi-  
 brosas. Caterum inferiore parte foliis caulis  
 destituitur, progrediente quoque nuditate illa  
 surlum versus singulas lacinias, in quas ipse su-  
 perius, Linguae instar cervinæ multifido folio,  
 C. B. dirimitur. Laciniarum uperior pars sti-  
 patur foliis viridibus, exiguis, teretibus, qualia  
 fere in Sedo minore teretifolio luteo, C. B. vi-  
 suntur: posita vero folia illa cristam galli gallina-  
 cei sua incurvatione referunt. Successu tempo-  
 ris emittit ramos longiulculos, degeneraturum  
 quasi in Sedum illud teretifolium modo nomina-  
 tum. An à quoquam hætenus descriptum sit, aut  
 pictum, me latet.

*Sedum minus teretifolium luteum, C. B.* Klei-  
 ne gelbe Haupswurz mit ründlichen blättern. Sedi  
 minoris secunda species, Trag. Sempervivum mi-  
 nus æstivum, Lob.

*Sedum minus luteum folio acuto, C. B.* Kleine  
 gelbe Haupswurz mit spitzigen blättern. Sedum  
 minus quintum, Clus. minus hæmatodes, Tab.  
 Sempervivum minus primum, Dod. Aizoon hæ-  
 matoides, Lob. ic.

*Sedum minus vermiculatum acre, C. B.* \*  
 Scharffer Maupfeffer. Sedum minimum, Tab.  
 minimum causticum, Eyll. minus octavum cau-  
 sticum, Clus. minus tertium & Vermicularis

Trag. Sempervivum minimum sive tertium, Matth. minimum sive Illecebra, Lob. Illecebra sive Sempervivum tertium, Dod.

*Sedum minus vermiculatum insipidum*, C.B.\* Maupfesser ohn geschmack. Sedum minus seu Vermicularis insipida, Eyst. Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

*Sedum minus fruticosum*, C.B. Kleine Staudige Haupswurz. Sedum minimum arborescens vermiculatum, Lob.

*Senecio minor vulgaris*, C. B.\* Kreuzkraut / Baldgreiß. Senecio, Matth. Lob. primus, Tab. vulgaris & primus, Trag. Erigerū, Diosc. & Plin.

*Serpyllum vulgare majus*, C.B. Großer Quendel. Serpyllum album primum & secundum, Tab. majus flore purpureo, & aliud candido, Cam.

*Serpyllum vulgare minus*, C. B.\* Kleiner Quendel. Serpyllum, Trag. Lob. vulgare, Dod. sylvestre, Matth. minus flore albo, & flore purpureo, Tab. vulgare repens, Clus.

*Serratula*, C.B.\* Matth. Dod. Lob. Clus. Scharfenkraut. Serratula tinctoria, Tab. tinctoris, Eyst.

*Sesamum veterum*, C. B. Leindotter / Flachsdotter. Sesamum, Matth. Lob. Dod. Tab. & Officinarum. Sesamum verum, Cam. In his regionibus semen jactum ægre provenit: in Sicilia & Creta sponte nascitur.

*Sideritis vulgaris hirsuta erecta*, C.B.\* Gliedkraut. Sideritis vulgaris, Cam. ep. vel secunda, Clus. quar-

quarta, Lon. sive ferruminatrix, Adv. Lob. ic.

*Siliqua edulis*, C. B. cujus fructus in Officinis Germaniæ dicitur Panis divi Johannis, S. Johannesbrod. Siliqua, Matth. ceronia, Clus. Ceratonia, Dod. Ceratia vel Siliqua, Tab. & Lobelii, qui Adversar. p. 414. Multū hæc cognita Niceæ, inquit, & maris Ligustici accolis, ubi eam esitant pueri, etiamq; porci. Quare qui sacram paginā vertunt, hanc debent intelligere Luc. XV. 16. de filio profligato.

*Siliqua sylvestris rotundifolia*, C. B. Judasbaum. Siliqua sylvestris, Clus. Cam. ep. Arbor Judæ, Dod. Lob. Tab. Eyst.

*Sinapi rapi folio*, C. B. Gartensenff mit rüben blettern und gelben samen/ Weisser Senff vulgo. Sinapi Diosc. Theoph. alterum, Plin. primum, Matth. album, Cam. sativum prius, Dod. sativum Eruce aut Rapi folio, Lob. Semē huic luteū tribuit Matthiolus, & pro Eruce semine, wit Mostaertsaat/ ab officinis Belgii exponi, Dodō æus affirmat.

*Sinapi apij folio*, C. B. Gartensenff mit Wassermerck blettern und braunrothen samen/ Schwarzer Senff vulgo, Sinapi gracile, Plin. alterū, Matth. qui ipsi subruffum vel album semen adscribit. luteum sativum alterum, Trag. album, Eyst. primum, Fuch. sativum alterum, Dod. Præcedente acrius est, ipsique addi solet, quoties Mostarda magis vellicans expetitur.

*Sinapi Eruce folio*, C. B. \*Wilder Senff. Sinapi tertium, Matth. sylvestre, Dod. sylvestre minus bursa pastoris folio, Lob. Na Sion

*Sion sive Apium palustre folijs oblongis*, C. B.\*  
 Wassermerck mit länglichen blettern. *Sium verū*,  
 Matth. odoratum, Trag. primum minus, Tab. sive  
 Laver, Lob.

*Sisarum Germanorum*, C. B. Zuckerwurzel.  
*Sisarum*, Trag. Dod. Lob. Tab. Siser, Matth.

*Smilax aspera fructu rubente*, C. B. Stechende  
 Winde. *Smilax aspera*, Matth. Dod. Lob. *aspera ve-*  
*ra*, Trag. *aspera prima & tertia*, Tab. *aspera fructu*  
*rutilo*, Clus.

*Solanum officinarum*, C. B.\* Nachtschatten.  
*Solanum vulgare*, Trag. *lativum*, Tab. *hortense*,  
 Matth. Dod. Lob.

*Solanum vesicarium*, C. B. & Dod. Judenfir-  
 schen. *Solanum halicacabum*, Trag. Matth. Lob.  
*Halicacabum vulgare*, Eyst. Alkekengi, Lon.

*Solanum vesicarium Indicum*, C. B. Indiani-  
 sche Judenfirsch. *Halicacabum sive Solanum In-*  
*dicum*, Cam. Eyst.

*Solanum vesicarium folio Atriplicis*. Juden-  
 firsch mit Meldenblettern aus Brasilien. Co-  
 maru Brasiliensium.

*Solanum melanocerasos*, C. B.\* Nachtschatten  
 mit schwarzen firsch. *cerasa enim nigra fructus*  
*plane refert*. *Solanum majus*, Matth. *somniferum*,  
 Lob. *hortense nigrum*, Trag. *lethale*, Dod. Clus.  
 cui etiam Belladonna, pan.

*Solanum fruticosum bacciferum*, C. B. Stau-  
 diger Nachtschatten. *Solanum fruticosum*, Tab.  
 Sych-



Strychnodendron, Lob. Eyft. Pseudocapsicum, Dod. Amomum Plinii, quorundam.

*Solanum quadrifolium bacciferum*, C. B. \* Einbeer/Wolfsbeer. *Solanum tetraphyllum*, Lob. Herba paris, Matth. Dod. Eyft. Aconitum saluterum, Tab.

*Solanum scandens seu Dulcamara*, C. B. \* Steigender Nachtschatten / Bittersüß / Alprancken. Dulcamara, Dod. Dulcis amara, Trag. Amara dulcis, Tab. Vitis sylvestris, Matth. Circæa Monspeliensium, Lob.

*Solanum tuberosum esculentum*, C. B. Nachtschatten mit knolligen rohten wurzeln zur Speise dienlich/Holländische Zartuffeln/quo nomine tamen etiam designantur Tubera terræ, ab Italis in fummis habita deliciis. Neque confundi debent hæ radices cum radicibus Helianthemi Indici tuberosi, de quo supra. Papas Peruanorum, Eyft. Descriptionem & figuram vide in Prodr. & Matth. C. B. itemque apud P. Laurembergium Appar. Plant. lib II. c. IV. quæ tamen icon, exceptis radicibus, male congruit.

*Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli*, C. B. Rundgestreiffte weiche Tollapffel. Poma amoris, Lob. Tab. Eyft. Aurea mala, Dod.

*Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro*, C. B. Rundgestreiffte harte Tollapffel. *Solanum pomiferum*, Lob. Tab. Eyft. Mala Æthiopica, Dod.

*Solanum peregrinum fructu rotundo*, C. B.  
 Glattrunde Zolläpfel. *Hyoscyamus peregrinus*  
*Dalechampii*, Lugd.

*Solanum pomiferum fructu oblongo*, C. B.  
 Längliche Zolläpfel. *Mala infama*, Frag. Dod.  
 Tab. *Melongena*, Matth. Lob. *Melanzana fructu*  
*pallido*, Eyst.

*Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore*, C.  
 B. Stramonie mit stachelichten runden äpfeln.  
*Solanum spinosum*, Tab. *Stramonia*, Dod. Eyst.  
*Stramonium peregrinum*, Lob. *Nux metella*,  
 Matth.

*Solanum fatidum pomo spinoso oblongo*, C. B.  
 Stramonie mit stachelichen langen äpfeln. *Tatu-*  
*la*, Cam. hor. *Datura Turcarum*, Eyst. *Nuci metel-*  
*læ congener*, Cam. ep.

*Solanum fatidum pomo spinoso rotundo semi-*  
*ne pallido*, C. B. Stramonie mit stachelichen rundē  
 äpfeln. *Datura Ægyptiaca flore pleno*, Pon. Ital.  
*Stamonia Ægyptiaca flore gemino*, du Bry.

*Solanum Ægyptiacum flore pleno*, C. B. Æ-  
 gyptische Stramonie mit gefüllten blumen. *Stram-*  
*onia Ægyptiaca flore pleno*, du Bry.

*Solanum Mexiocanum flore magno*, C. B. Me-  
 xicanischer Nachtschatten. *Viola Peruviana*, Tab.  
*Admirabilis Peruviana*, Clus. *Magnæ admiratio-*  
*nis herba*, Lob. *Jasminum Indicum seu flos mira-*  
*bilis Peruanus*, Eyst.

*Solanifolia Circea dicta major*, C. B. \* *Circæa*.  
 Cir-

Circza, Eyst. Circza Lutetiana, Lob. Herba D. Stephani, Tab. Lappa sylvestris, Trag.

*Sonchus asper laciniatus & non laciniatus*, C. B.\* Krauser Hasenfohl. *Sonchus asper*, Tab. aspera, Matth. *levis tenerior latifolia*, Lob.

*Sonchus laevis laciniatus latifolig*, C. B.\* Glatzer Hasenfohl. *Sonchus laevis*, Matth. Dod. *laevis vulgaris foliis laciniatis dentis leonis*, Lob. *laevis alter flore luteo, & tertius flore niveo*, Tab.

*Sonchus Africanus*. Africanischer Hasenfohl. *Sonchus Mauritanicus*, Horti Patavini.

*Soncho affinis Lampsana domestica*, C. B.\* Hasenfohl Lampsana genannt. *Sonchus sylvestris primus*, Tab. Lampsana, Lob. Dod.

*Sorbus sativa*, C. B. Sperberbaum. *Sorbus* Trag. Dod. Lon. Tab. domestica, Matth. Lob. legitima, Clus. esculenta, Cam. Fructus si mitescunt, edules fiunt mespilorum instar, & nominantur Spöräpfel / Speyerlinge.

*Sorbus sylvestris folijs domestica similis*, C. B.\* Ebereschen / Quizenbaum. *Sorbo sylvestris*, Matth. Tab. sylvestris alpina, Lob. aucuparia, Clus. Ornus, Dod. Fraxinea arbor, Trag. In baccis maxima spes aucupibus posita est.

*Sparganium ramosum*, C. B.\* Igelsknospen mit ästen. Sparganium, Trag. Matth. Tab. Eyst. & Butomos Theophrasti, Lob. Platanaria, Dod.

*Sparganium non ramosum*, C. B.\* Igelsknospē  
ohn

ohn äſte. Sparganium alterum, Lob. Tab. Platana-  
ria altera, Dod.

*Spartium arborescens seminibus lenti simili-  
bus*, C.B. Spartium. Spartium Hispanicum, Eyst.  
Tab. Diolcorideum Narbonense & Hispanicum,  
Lob. Genista Hispanica, Matth. Italica, Dod.

*Sphondylium vulgare hirsutum*, C.B.\* Zeuſſch  
Bärenflaw. Sphondylium, Matth. Tab. Spondyli-  
um, Lob. Dod. Branca ursina, Trag. & Offic. A-  
canthus vulgaris ſive Germanica, Fuch.

*Spina alba tomentosa latifolia sylvestris*, C.  
B.\* Webedistel. Acanthium, Matth. Dod. Lob.  
vulgare, Tab.

*Spiræa ſive Frutex ſpicatus folijs ſalignis ſer-  
vatis*, C.B. Spiræa. Spiræa Theophrasti forte,  
Cluſ.

*Spongia ramosa*, C.B.\* aut ei ſimilis, qualem re-  
peri innatam trunco pinastri flumine ſecundo ad-  
vecti, & in aſſeres ſecandi. Externa facie conve-  
nit Conſervæ marinæ generi, quod Lobelius Ob-  
ſervat. p. 654. exhibuit. Si quis ad Muſcos arbore-  
os referre mallet, non repugno.

*Pſeudostachys alpina*, C.B. Alpen-Salben/  
Alpenfrant. Salvia alpina, Tab. Marrubium mon-  
tanum primum, Thal.

*Staphis agria*, C.B. Trag. Matth. Dod. Lob.  
Cam. Zeuſſefrant/Meuſepfeffer. Pedicularis, Cord.  
Apud nos ex ſemine provenit: in Iſtria, Dalmatia,  
Apulia ſponte creſcit.



*Stœbe major folijs cichoraceis, mollibꝫ lanuginosis, C.B.* Stœbe mit Cichorienblettern. *Stœbe major, Tab. Hispanica, Cam. Salmantica major, Lob. Salmantica prima, Clus. Aphyllantes prima, Dod.*

*Stœbe incana tenuifolia. \** Graue Stœbe mit kleinen blettern. An *Stœbe incana Cyano similis tenuifolia, C.B.*

*Stœchas purpurea, C.B.* Stœchaskraut. *Stœchas, Trag. Matth. Lob. arabica, Cam. brevioribus ligulis, Clus. In floribus, quos Officinæ divendunt, latere semen interdum solet: ex illo fato nobis plantulæ aliquando provenerunt.*

*Styrax folio mali cotonei, C.B.* Styraxbaum. *Styrax, Matth. Lob. Tab. Cam. Lon.*

*Succisa glabra, C.B. \** Glatter Abbiß. *Succisa, Matth. Dod. Morfus diaboli, Trag. Lob. Tab.*

*Succisa hirsuta, C.B. \** Rauher Abbiß. *Morfus diaboli hirsuta rarior, Ges. hor. Notavi quoque Succisam foliis hirsutam, & caulis parte inferna: Superior vero pars, qua foliis eminebat, glabra erat.*

*Symphytum Consolida major, C.B. \** Wallwurz, Schwarzwurz / Beinwelle. *Symphytum majus, Matth. Tab. magnum, Dod. alum seu Alus, Lob. Consolida major, Trag. Flos est purpureus, aut albus, aut pallide luteus: unde tres figuræ apud Eyst.*

*Symphytum minus Borruginis facie, C.B.* Bor-



ragen Wallwurz. *Symphytum pumilum repens* Borraginis facie, Lob. Borraginis altera species, Dod. Borrago minima, Eyst.

*Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia, C. B.* Zungenkraut / Fleckig Zungenkraut. *Symphytum maculosum*, Dod. *Pulmonaria maculosa*, Lob. Tab. Eyst. altera, Matth. vulgaris maculoso folio, Clus.

*Syringa alba, C. B.* Weiße Syringe. *Syringa*, Dod. alba, Tab. Italica, Lob. Eyst. Frutex coronarius, Clus.

*Syringa cerulea, C. B.* Blaue Syringe / Spanischer Glieder. *Syringa Lusitanica*, Tab. cærulea Lusitanica, Lob. Eyst. flore cæruleo, Clus. Lillach, Dod. Lilac, Matth.

*Tamarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica, C. B.* Tamarissen. *Tamarix*, Dod. Tab. *Tamariscus Germanica*, Lob. *Myrica sylvestris sive Tamarix*, Matth.

*Tanacetum vulgare luteum, C. B. \** Gemeine Rheinfarn. *Tanacetum*, Matth. Dod. vulgare, Trag. Eyst. millefolii foliis, Lob. *Artemisia Dioscoridis*, Tab.

*Tanacetum folijs crispis, C. B.* Krause Rheinfarn. *Tanacetum crispum*, Dod. cristatum Anglicum, Lob. Eyst. *Artemisia sativa Anglica*, Tab.

*Tanacetum sive Flos Africanus major flore pleno, C. B.* Grosse Africanische Rheinfarn (vulgo Sammetblumen) mit vollen blumen. Flos Afri-

Africanus major aureus multiflorus, Tab. Caryophyllus Indicus major, Matth. Eyst. Othonna major polyanthos, Lob.

*Tanacetum Africanum majus simplici flore*, C. B. Grosse Africanische Rheinfarn mit einfachen blumen. Flos Africanus simplici flore, Tab. Lob. ic.

*Tanacetum Africanum seu Flos Africanus minor*, C. B. Kleine Africanische Rheinfarn. Flos Africanus, Lob. minor flore simplici & pleno, Tab. Caryophyllus Indicus minor, Matth. Variat colore luteo toto, & luteo rubescente.

*Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso*, C. B. Rheinfarn mit hohlen blumen. Caryophyllus Mexicanus fistuloso flore, Column.

*Taxus*, C. B. \* Eibenbaum. Matth. Dod. Lob. Cam. Lon. & plerisque aliis. Nascitur frequens in sylvis circa Linum. Viret perpetuo fronde, fert baccas rubras: nec est tam venenata apud nos, quemadmodum antiqui prodiderunt.

*Telephium vulgare*, C. B. \* & Clus. Gemein Knabenkraut. Telephium, Matth. Lob. Tab. alterum sive Crassula, Dod. Faba inversa, Lob. ic. Fabaria, Off.

*Telephium purpureū majus*, c. B. Knabenkraut mit purpurblumē. Telephium floribus purpureis, Tab. Lob. ic. Cam. ep. quintū purpureo flore, Clus.

*Telephium repens folio non deciduo*, C. B. Kriechend Knabenkraut. Telephium Imperati, Cam. septimum, Clus. Te-

*Terebinthus vulgaris*, C.B. Terpenthinbaum.  
Terebinthus, Matth. Dod. Clus. Lob. Tab. Lon.

*Teucrium*, C.B. Lob. Eyf. *Teucrium*. *Teucrium primum*, Tab. *secundum*, Matth. vulgare fruticans, Clus. *Chamædrys altera seu assurgens*, Dod.

*Teucrium peregrinum folio sinuoso*, C.B. Spanisch *Teucrium*. *Teucrium Boeticum*, Tab. fruticans *Boeticum*, Clus.

*Thalictrum majus filiqua angulosa aut striata*, C.B. \* *Grosse Wiesenraute mit eckigen schoten*. *Thalictrum flore albo aut incarnato*, Eyf. *Thalictrum pratense primum vel quintum*, Clus. *magnum*, nonnullis *Pseudorhabarbarum* ob radicis luteum colorem, Dod. *Ruta pratensis herbariorum*, Lob.

*Thalictrum majus flavum staminibus luteis, vel glauco folio*, C. B. \* *Grosse Wiesenraute mit gelben zäseln an der blumen*. *Thalictrum majus tertium*, Dod. *primum vel Hispanicum*, Clus. *Ruta pratensis major quarta*, Tab.

*Thalictrum minus*, C. B. \* *Kleine Wiesenraute*. *Thalictrum tenuifolium*, Lob. *Thalictrum minus*, Dod. *septimum*, Clus. *Ruta pratensis minor*, Tab.

*Thlaspi arvense filiquis latis*, C. B. \* *Wilder Baurfensff mit grauen bletteren*. *Thlaspi primum*, Matth. *alterum*, Dod. *vulgatissimum vaccariae folio*, Lob.

*Thla-*

*Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio*, C. B. Geschirmiter Boursenff aus Creta. *Thlaspi Creticum*, Tab. quartum, Matth. Candia umbellatum Iberidis folio, Lob. Cappadocium flore incarnato, & flore albo, Eyst.

*Thlaspi Creticum flore albo majus*, C. B. Großer Cretischer Boursenff mit weissen blumen. Figura extat in Prodr. C. B. Planta est perennis.

*Thlaspi montanum incanum luteum serpylli folio majus*, C. B.\* Berg Boursenff mit gelben blumen. *Thlaspi supinum luteum*, Lob. ic.

*Thlaspi bicutatum asperum hieracifolium & majus*, C. B. Boursenff mit gedoppelten schilden der grosse. *Thlaspi clypeatum*, Clus. minus clypeatum primum, Tab. parvum hieracifolium, live *Lunaria lutea Monspeliensium*, Lob.

*Thlaspi bicutatum asperum minus*, C. B. Boursenff mit doppelten schilden der kleine. *Jondraba alyssoides Apula spicata*, Column.

*Thlaspi fruticosum Leucoij folio angustifolium*, C. B. Boursenff mit schmallen Leucojenblattern. *Thlaspi fruticosum folio Leucoij marini minoris*, Lob. Tab. semper virens, Cam.

*Thlaspi fruticosum incanum*, C. B.\* Grauer staudiger Boursenff. *Thlaspi incanum Mechliniense*, Lob. Clus.

*Thya Theophrasti*, C. B. Baum des lebens. *Arbor vita*, Dod. Clus. Tab. Eyst. *Cedrus Lycia*, Lob. In pago Schwant in Horto Nobil. Dn. Georg.



V Vilhelmi de Redern egregia visitur arbor Thya, quæ per multos jam annos ibi habetur, & fructus quoque profert. Caudex tribus spithamis cingitur, & altitudine XXIV. pedes æquat. Hyeme nullo opus habet tegmine. Ramorum compages in formam pyramidalem acuminatur.

*Thymelææ affinis facie externa*, C. B. Steinrößlein. Cneoron, Matth. cap. de Cinam. Cneorum Matthioli, Clus. Cam.

*Thymus vulgaris folio tenuiore*, C. B. & Eyst. Thymian. Thymus, Trag. Fuch. Lon. Serpyllum hortense, Dod. ic.

*Tilia fœmina folio majore*, C. B. \* Lindenbaum. Tilia, Dod. fœmina, Matth. Lob. Tab. fativa, Trag. Flores medicinales sunt, & materies serinariis valde expetita.

*Tilia fœmina folio minore*, C. B. \* Steinlinde. Tilia sylvestris, Trag. minor, Ges. hor. Per omnia minor est, & fronde nigriore.

*Tithymalus Characias amygdaloides*, C. B. \* & Lob. Wolffsmilch mit Mandelblettern. Tithymalus characias primus, sive mas, Dod. amygdaloides, & amygdaloides latifolius, Tab.

*Tithymalus helioscopius*, C. B. \* Matth. Lob. Dod. Tab. Sonnenwendige Wolffsmilch. Esula vulgaris & tertia, Trag. Noster foliis est crenatis, sed non usque ad caulem.

*Tithymalus cyparissias*, C. B. \* Matth. Dod. Lob. Tab. Cypressen Wolffsmilch, Tithymalus



lus cupressinus, sive humipinus, Lob. ic.

*Tithymalus folijs pini*, C.B. \* Wolffsmilch mit  
Tichtenblettern. *Tithymalus cupressinus* secun-  
dus, Tab. Esula, Off. minor, Dod. vulgaris major  
& 5. Trag. Pityusa sive Pinea, Lob.

*Tithymalus palustris fruticosus*, C. B. \* Stau-  
dige Wolffsmilch. Esula major, Dod. major Ger-  
manica, Lob. major & secunda, Trag.

*Tormentilla sylvestris*, C.B. \* Tormentille. Tor-  
mentilla, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst. Hep-  
taphyllum, Fuch.

*Trachelium Americanum flore rubro oblongo*.  
Cardinalsblume. Flos Cardinalicius sive Trache-  
lium Indicum, Hort. Patav. *Trachelium Americanum*  
flore rubro, Ferrar. Planta Cardinalis, Hort. Paris.

*Tragopogon pratense luteum majus*, C. B. \*  
Grosser Bocksbart mit gelben blumen. Tragopo-  
gon, Matth. Dod. luteum, Lob. Tab. flore luteo,  
Eyst. Barbula hirci, Trag.

*Tragopogon gramineo folio radice villosa*, C.B. \*  
Bocksbart mit grasblettern. Barbula hirci  
minor, Tab.

*Tragopogon purpureoceruleus porri folio, quod*  
*artifi vulgo*, C.B. Bocksbart mit purpurblawē blu-  
men. Tragopogon, Lob. alterum, Matth. hortense,  
Dod. desc. purpureus, Eyst. purpureocerulea, Tab.  
Des Salsifix, Gallorum. Hortulanis nostris voca-  
tur Haberwurß/ quoniam radices lactescentes cu-  
linæ inferunt, quæ his perinde, ut radicibus petro-  
se.

selini, pro condiendis cibariis utitur, præmissa tamen in aqua calida maceratione.

*Tribulus aquaticus*, C. B.\* Trag. Matth. Dod. Lon. Lob. Wassernüsse. *Tribulus aquaticus* major, Clus. pan. lacustris, Cord.

*Tribulus terrestris Ciceris folio fructu aculeato*, C. B. Burzeldorn. *Tribulus terrestris*, Matth. Dod. Lob. Clus.

*Trichomanes sive Polytrichum officinarum*, C. B.\* Steinfeder / Maursarn. *Trichomanes*, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Cam. mas, Tab.

*Trifolium bitumen redolens*, C. B. Harzlee. *Trifolium bituminosum*, Dod. Tab. Eyst. asphaltum, Matth. Lob.

*Trifolium palustre*, C. B.\* Dod. Eyst. Sumpfsoder Biberlee. *Trifolium paludosum*, Lob. majus & fibrinum, Tab. Limonium pratense, Trag.

*Trifolium Americanum folio oblongo*. Americanisch Klee mit länglichen blettern. *Trifolium Americanum spicatum*, Hort. Patav.

*Trifolium pratense purpureum*, C. B.\* & Trag. Brauner Wiesentlee. *Trifolium pratense*, Matth. Dod. Lob. Floris color interdum pallidior.

*Trifolium pratense album*, C. B.\* & Fuch. Weißer Wiesentlee. *Trifolium pratense alterum*, Trag. Matth. majus primum, Clus.

*Trifolium pratense luteum capitulo brevior*. C. B.\* Gelber Wiesentlee. *Trifolium pratense luteum*, Fuch. Cam. arvense, Tab. Lotus sylve-

ve-

vestris, Lon. Meliloti exigua species prima, vel sexta, Trag.

*Trifolium pratense luteum capitulo lupuli*, C. B. \* Hopffenflee. *Trifolium agrarium*, Dod. luteum minimum, Lob. lupulinum, quibusdam.

*Trifolium pratense minus flosculis purpureis*, C. B. \* Klein brauner Wiesenflee. *Lotus pratensis purpurea*, Lugd. Folia modo terna habet, modo quaterna, & tunc vernacule Bierblettriger Klee nominatur.

*Trifolium montanum spica longissima rubente*, C. B. Bergflee mit langer rohter ähre. *Lagopus major*, Eyft. major alter, Dod. altera folio pinna-to, Lob.

*Trifolium montanum angustissimum spicatum*, C. B. Geährter Bergflee mit sehr schmallen blet-tern. *Lagopus altera angustifolia*, Lob. ic. *Trifolium alopecuroides* quorundam.

*Trifolium arvense humile spicatum*, C. B. \* Hasenflee/Hasenpfötlein. *Lagopus*, Off. sive *Pes leporinus*, Matth. Dod. Lob. *Lagopodium primum*, Tab.

*Trifolium cochleatum maritimum tomentosum*, C. B. Wolliger Schneckenflee. *Medica marina*, Tab. Clus. Cam. Adv. Lob. ic.

*Trifolium cochleatum fructu nigro hispido*, C. B. Schneckenflee mit schwarzer borstiger frucht. *Trifolium cochleatum alterum*, Dod. *Medica folliculo spinoso*, Lob.



Tri-

*Trifolium seu Medica capsulis tornatis spinosis, & non spinosis: capsulis orbiculatis seu cochleatis compressis: capsulis scutellatis: capsulis do-liatis exsculptis, spinosis, non spinosis: capsulis compressis echinatis: capsulis muricatis sive uncinatis.*

*Trifolium echinatum arvense, C.B. Zgelsflee.*  
*Medica pusilla, Cam. Tribulus terrestris minor repens, Lugd.*

*Trifolium acetosum vulgare, C.B.\* Saurflee.*  
*Trifolium acetosum, Matth. Dod. flore albo, Eyst. Acetosella, Off. Oxys alba, Tab. Oxis quorundam, Lob. Oxytriphylon, Trag.*

*Trifolium hepaticum flore simplici, C.B.\* Leberflee/ Edel Leberkraut.* *Trifolium aureum, Dod. Hepatica aurea, Tab. Hepaticum trifolium, Lob. Epatica nobilis, Off. Trinitas, Matth. Adest flore caruleo, & flore subpurpureo.*

*Trifolium hepaticum flore pleno, C.B. Leberflee mit gefüllten blumen.* *Hepatica trifolia polyanthos, Lob. caruleo pleno flore, Clus. aurea multiflora, Tab. aurea flore pleno & caruleo, Eyst.*

*Triticum hybernum aristis carens, C.B. Weiz.* *Triticum, Dod. Tab. Tritici primum genus, Trag. Siligo spica mutica, Lob. Apud nos in terra non hybernat semen, sed solet verno tempore feri, ut circa finem æstatis ad maturitatem perveniat.*

*Tri-*

*Triticum spica multiplici*, C. B. Traubelweize.  
*Triticum ramosum*, Plin. racemosum, Portæ. mul-  
 tiplici spica, Lob. ic. typhinum multiplici spica,  
 Tab. Spicis turgēt lenis, aut octonis: Matthioli  
 vero XXIV. spicas à se visas scriptitat.

*Tubera cervina*, C. B. \* Hirschwan/ Hirsch-  
 brunst. Fungus cervinus sive Cerviboletus, Matth.  
 germ. Lon. Boleti cervini orbiculati, Thal. Fi-  
 guram habet Joann. Bauhinus, lib. XL. p. 851.

*Tulipa præcox lutea*, C. B. Gelbe Früh-  
 tulpe. *Tulipa præcox flava*, Clus. Lilionarcissus luteus,  
 Lob.

*Tulipa præcox rubra*, C. B. Rote Früh-  
 tulpe. *Tulipa*, Dod. Narcissus quintus, Matth. Lilionar-  
 cissus sanguineus puniceusve, Lob.

*Tulipa præcox purpurea*, C. B. & Clus. Pur-  
 purne Früh-  
 tulpe. Lilionarcissus purpureus, Lob.  
*Tulipa purpurea calice pallescente*, Eyf.

*Tulipa præcox alba*, C. B. & Clus. Weiße Früh-  
 tulpe. Lilionarcissus niveus, Lob.

*Tulipa præcox lutea varia*, C. B. Gelbgemeng-  
 ete Früh-  
 tulpe. Et ejus quidem aliquot varieta-  
 tes, cum primis ex Eyf. *Tulipa lutea lituris aure-*  
*is*, & *lituris miniatis*, & *maculis rubens*.

*Tulipa præcox rubra varia*, C. B. & Clus. cum  
 aliquot vartetatibus. Rottgemengte Früh-  
 tulpe et  
 licher arten.

*Tulipa præcox purpurea varia*, C. B. & Clus.  
 Purpurgemengete Früh-  
 tulpe. Inter ceteras



hujus varietates adest quoque, quæ proxime accedit ad Tulipam miniatam linea viridi, Eyft.

*Tulipa præcox alba varia*, C. B. & Clus. Weißgemengete Frühtulpe/cum nonnullis varietatibus, cujusmodi speciatim ex Eyft. sunt: Tulipa candida lineis viridibus, Tulipa alba maculis roseis, Tulipa albicans maculis latis rubentibus, Tulipa alba marginibus rubescens.

*Tulipa serotina lutea*, C. B. Gelbe Spät-Tulipe. Tulipa serotina flava, Clus. sive Lilionarcissus luteus latifolius obtusus phœniceis rubentibus oris, Lob.

*Tulipa serotina rubra*, C. B. & Clus. Rote Spättulpe. Floris color valde saturatus, unguis flavi, apices cum pediculis nigri.

*Tulipa serotina coccinea*, C. B. Scharlach-ne Spät-Tulpe. Tulipa coccinea albescentibus oris, Eyft.

*Tulipa serotina alba*, C. B. Weiße Spät-Tulpe. Referantur ad hanc quoque nonnullæ varietates, & ex Eyft. quidem: Tulipa albicans margine coccineo, Tulipa albicans ex flavo purpureo, Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.

*Tulipa serotina ramosa major*, C. B. Spättulpe mit Ästen. Tulipa serotina polyclades major, Clus. polyanthos, Eyft. Floris color in nostra est purpureus.

*Tulipa serotina flore pleno*, C. B. Spättulpe mit gefüllter blume. Tulipa serotina flore pleno,

exaurantio & viridi colore mixto: folia in flore LX. superiori anno numerabantur, adeo ut ob plenitudinem flos integre se explicare vix posset.

*Tulipa dubia major & media*, C. B. atq; Clus. cum aliquot varietatibus. Zweifelhaffte Tulpe die grosse und mitlere/mit etlichen verendrungen.

*Tulipa pumilio latifolia alba*, C. B. Breitblettrige Zwercft. die weisse. *Tulipa pumilio alba unguib9 luteis*, Eyst. Tulipæ hæ ob caulē brevē pumiliones sive nanæ dicuntur, licet flos ipsis magn9 sit.

*Tulipa pumilio latifolia rubra*, C. B. Breitblettrige Zwercftulpe die rothe. *Tulipa pumilio*, Lob. ic. *dubia pumilio*, Clus.

*Tulipa minor lutea Italica*, C. B. Kleine Weltsche Tulpe mit gelben blumen. *Tulipa Italica prima*, Tab. Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. Bononiensis luteus, Lob. Tulipæ minores ratione parvi floris nominatur: etsi caule satis longo donatæ sint.

*Tulipa bombycina Cretica*, C. B. Seidene Tulpe / quoniam bulbus ipsi tomentosus, & foliorum oræ. *Tulipa bombycina flore rubro*, Rob. Swert. Bry. *Tulipa de Alepo*, Cl. V. Leonhardi Urfini Botanici Academix Lipsiensis, qui ipsam programmate anno 1661. impresso descripsit.

*Tulipa variegata Persica*, C. B. Persische Tulpe. *Tulipa Persica*, Eyst. *Persica minor altera*, Clus. cur. post. Hujus bulbus cum in terram alte descendat, supposita testa opus habet.

*Ad hæc ipsa nomina reduci possunt, si qua*

varietates superant, cum in hac planta miris modis Natura etiam apud nos luxuriet. Ad Gallicas autem atque Belgicas Tuliparum nomenclaturas quod attinet, quamvis ratio illas imponendi rejicienda prorsus non sit, doctioribus tamen minus probatur. Profecto teri viam hanc à nullo rei herbariæ classico auctore memini: estque præterea ea ipsa lubrica & inconstans, cum ad insomnia cujusvis hortulani idiotæ mutet. Adde quod sit absque insigni utilitate difficilis, cum careat hætenus scripta methodo, & appellationes illæ ex nuda inspectione, perinde ut characteres elementorum discantur, sola traditione servandæ. Ne quid tamen hac parte etiam desideretur, agedum nomina illa hic apponemus.

Achat Blanc.	Admiral Rintjes.
Achat rubin.	Admiral Liffen.
Admiral Boggart.	Admiral Lyon.
Admiral van der Enk.	Admiral de Mann.
Admiral van Engeland.	Admiral Mierlander.
Admiral van Enkhuyzen	Admiral Opdam.
Admiral de Franze.	Admiral Pelegrim.
Admiral de Grot.	Admiral de Ryp.
Admiral van Holland.	Admiral Spiegel.
Admiral van Hoorn.	Admiral Sunfer.
Admiral Jacot.	Admiral van Weynen.
Admiral van der Ruyp.	Africaner.
Admiral Krienken.	Amours.

Angelier mit blauëgrund Donville.	
Anvers.	Doree.
Argos.	Dorothea d'Hollande.
Bel Brüssel.	Duc de Florenz.
Bel Gabriel.	Esclusius.
Belle Zandc.	Elzevier.
Belle Princesse.	Fama.
Belvidere.	Festus.
Beste Besta.	Ferdinandus.
Beste gemarmelte.	Gebieße Korenhart.
Bitter.	Gebieße Pottebacker.
Biscuit-backer.	Gebigarirte Branson.
Bloedroden Branson.	Geel en rood van zenden.
Blenborger.	Geel en rood de Mester.
Böhmische Kron.	Geel met rood boden.
Brandenburger.	Geele Kroon.
Brabantson.	Gelder.
Breunpurpur.	Gemarmelte Goyer.
Buseloo.	Gemarmelte van der Enk.
Cammelot Kromhout.	Generalissimo.
Cam. van der schuren.	General Carlein.
Cardinal Richelieu.	General Korenhart.
Carols.	General Dufk.
Catelande.	General van Engeland.
Cedonulli.	General van Holland.
Centen.	General de Mann.
Darius.	General Nieuwlander.
Diana.	General Rector.
Donckervolck.	General Rotgans.

General Sunmende.	Incarnadin geboord.
Gevlamde Branson.	Zoncker.
Gevlamee Duyk.	Juno.
Gevlamde Goudenlakte.	Jupiter.
Gevlamde Pottelbacker.	Ristemaker.
Gevlamde Purper.	Klein geplumasirte.
Gevleugelde Korenhart.	Kroon Konal.
Goliath.	Lakk Korenhart.
Gouda.	Lakk Francois.
Grijseline.	Lakk Broege.
Grote geplumasirte.	Lakk van Rhyn.
Grote Hollander.	Late Blyenborger.
Grote Standart.	Landschap van Vol.
Grote Zamerlan.	Latur.
Grumbergenaer.	Le Grand.
Hagenauer.	Marcus Aurelius.
Hector.	Marchand.
Hercles.	Marmer van Harlas.
Hirschhorn.	Marmer Jaspee.
Hoe lenger hoe liever.	May de Prinze.
Hugenot.	Memorable.
Jacot.	Melkemmer.
Jan Gersen.	Morgenstern.
Jan Simonsen.	Mercure.
Jaspe Sara.	Morveille van Quakel.
Jerry.	Meterman.
Jerry nabij.	Molsuick.
Incarnat Weerschijn.	Morlyon Vol.
Inc. met witte grond.	Nette Branson.

Non



Nonfuit.	Prinz Wallis.
Occidentale.	Prinz Robbert.
Orange.	Purper met geele plekke.
Orlande.	Kattebeet.
Oudenaarde.	Kaveschof.
Pallas.	Kieſwieker.
Palto pio.	Koermonder.
Paragon d' Arragon.	Kood en geel gevlamd.
Paragon Claermont.	Kood met geele ruggen.
Paragon Florison.	Kosemunda.
Paragon Grebber.	Kon de Portugal.
Paragon Liſſen.	Saint Pierre.
Paragon Mahu.	Sanbloom.
Paragon Molin.	Sanbloem Koning.
Paragon Nieuwerde.	Scipio Africanus.
Paragon Prior.	Schilder.
Paragon Velsen.	Semper Augustus.
Paragon Vigeboom.	Silvern ſaken.
Pareil.	Silvern Goudenſaken.
Paſſeport.	Sonnenbloem.
Paſ Citadelle.	Spharamundi.
Pelecan.	Stroogeel met rood.
Pelumpe.	Sulphurgeel met rood.
Perſemacker.	Suiſer.
Peers Morlhon.	Suimende Jan Gersen.
Plumage.	Sylvia.
Postilion.	Torlon.
Present.	Tournay.
Present Liſſens.	Tournay van dren.
	D 5                      Zout

Tournay Kätlein.	Broege Momporeille.
Tournon Morlyon.	Broege geplumasirte.
Venus.	Witte Kroon.
Vice Admiral.	Witte Galiotte.
Viceroy.	Witte Kattebeet.
Violet Rotgans.	Wit en rood Passport.
Witroep.	Wit en rood boden.
Broege Blyenborger.	Zene-koot.

*Tussilago vulgaris*, C. B. \* Huffleattig. *Tussilago*, Matth. Dod. Lob. Eyf. Fuch. *Ungula caballina*, Trag. Farfara, aliis.

*Typha palustris major*, C. B. \* Grosse Wasserfolben. *Typha*, Matth. Lob. Tab. *aquatica*, Trag. *aquatica seu Cestrum morionis*, Dod. Summo capiti flos innascitur lanuginosus, quo ad farciendas mattas atque tegetes utuntur: rustici Schmackedunen nominant.

*Typha palustris minor*, C. B. \* Kleine Wasserfolben. *Typha minor*, Lob. ic. minima, Clus. pan. minor sive *Typhula*, Tab.

*Valeriana hortensis*, C. B. Garten Baldrian. *Valeriana vera*, Trag. minor, Lob. Eyf. *hortensis*, Dod. Phu magnum, Matth. ponticum, Tab.

*Valeriana sylvestris major*, C. B. \* Grosser wald Baldrian. *Valeriana vulgaris*, Trag. *sylvestris*, Lob. Dod. Eyf. prima, Clus. Phu parvum, Matth. vulgare, Tab.

*Valeriana palustris minor*, C. B. \* Kleiner Sumpff Baldrian. *Valeriana minor sylvestris*, Lob.

Lob. minima, Dod. Phu minus, Tab. minimum, Matth.

*Valeriana campestris inodora major*, C. B. \*

Seld Rapünzel. *Valeriana campestris*, Cam. Olus album, Dod. *Lactuca agnina*, Tab. Phu minimum alterum, Lob. Sponte quidem provenit: in hortis tamen culta habitior evadit, vocaturque tunc Garten-Rapünzel. In hortos semel illata ex semine deciduo se propagare solet, sed incommodo proventus tempore: ideoque præstat sationem autumnino instituere, quo hyeme exeunte & sub initium veris ima tenella folia habeantur. In acetariis folia duntaxat esitamus, cum radix exilis sit: contra expetitur radix imprimis Rapunculi esculenti, de quo superius.

*Valeriana rubra*, C. B. Dod. Tab. Cam. Eyst. Baldrian mit rothen blumen. Ocymastrum Valerianthos, Lob.

*Valeriana carulea*, C. B. Baldrian mit blauen blumen. *Valeriana græca*, Dod. Tab. græca flore cæruleo, Eyst. peregrina, Lob. Cam. Pseudovaleriana dici meretur.

*Verbascum mas latifolium luteum*, C. B. \* Wollkraut / Königsferze / Kerzenkraut. *Verbascum mas*, Tab. primum, Matth. latius, Dod. latifolium mas, Eyst. mas & Candela regia, Lob.

*Verbascum fœmina flore luteo magno*, C. B. \* Wollkraut mit grossen gelben blumen. *Verbascum* sive Candela regia, Trag.

Ver-

*Verbascum nigrum* flore ex luteo purpurascen-  
te, C. B. Schwarzlich Wollkraut mit kleinen gel-  
ben blumen. *Verbascum nigrum*, Trag. Dod. Tab.  
Lob. tertium, Matth. Blattaria Plinii, Eyst.

*Verbascum latis Salviae folijs*, C. B. Wollkraut  
mit Salbenen blettern. *Verbascum Salvifolium*  
fruticosum luteo flore, Lob. sylvestre, Matth. Clus.  
sylvestre alterum, Dod. *Salvifolium* quorundam.

*Verbasculum pratense odoratum*, C. B.\* Wol-  
riechende Schlüsselblumen. *Primula veris*, Matth.  
Tab. flavo flore elatior, Clus. majoribus floribus  
luteis odoratis, Dod. flore luteo, Eyst. *Primula*  
*pratensis*, Lob. *Herba paralysis vulgaris*, Trag.

*Verbasculum pratense vel sylvaticum inodo-  
rum*, C. B.\* Schlüsselblumen ohn geruch. *Primula*  
*veris altera*, Matth. pallido flore elatior, Clus. major.  
Dod. sylvestris tertia, Tab. *pratensis inodora* lute-  
opallida.

*Verbasculum sylvarum majus singulari flore*,  
C. B. Einzele Schlüsselblumen. *Primula sylvarum*,  
Lob. *veris minor*, Dod. *veris pallido flore humilis*,  
Clus. *veris sylvestris flore pallido*, Eyst. *sylvestris*  
*secunda*, Tab. Flos pallet: & superiori anno nobis  
succrevit etiam flore dilute purpureo.

*Verbasculum hortense multiplex*, C. B. Völle  
Schlüsselblumen. *Primula veris Anglicana flore*  
*pleno*, Eyst. *hortensis Anglica flore pleno*, Lob.  
*multiflora*, Tab. *Primulae veris flos multiplex*, Dod.

*Verbasculum proliferum*, C. B. Schlüssel-  
blu-

blumen mit kindern oder nebenblümlein. *Primula veris prolifera*, Tab. flore geminato, Eyst. flore gemino altero alteri innato, Lob.

*Verbasculum alpinum umbellatum minus*, C. B. Rothe Schlüsselblumen mit dolden. *Primula alpina media*, Tab. veris flore rubro, Clus. veris angustifolia rubra, & alba, Eyst.

*Verbena communis ceruleo flore*, C. B. \* Eisenfraut / Eiserhart. *Verbena recta*, Trag. communis & sacra recta, Lob. *Verbenaca*, Matth. recta, Tab. Dod. vulgaris, Clus.

*Veronica mas supina & vulgatissima*, C. B. \* Liegend Ehrenpreis. *Veronica*, Tab. mas serpens, Dod. vulgaris supina, Clus. major Septentrionalium, Lob.

*Veronica spicata angustifolia*, C. B. \* Aufrecht Ehrenpreis. *Veronica recta prima*, Tab. recta herbariorum, Lob. recta vulgaris major, Clus.

*Vicia sativa vulgaris semine nigro*, C. B. Saatwicken. *Vicia*, Lon. *Orobis sativus*, & *Vicia* major, Trag. Semen nigricat, & cinerei quoq; coloris est.

*Vicia sepium folio rotundiore acuto*, C. B. \* Zaunwicken. *Vicia*, Dod. Lob. Clus. sylvestris, Lon. Aphaca, Matth.

*Vicia multiflora*, C. B. \* Wilde Wicken mit vielen blauen blumen / Vogelwicken. *Aracus*, Tab. *Galega altera vel sylvestris*, Dod.

*Vicia segetum cum siliquis plurimis, hirsutis*, C. B. \* Wilde Wicken mit vielen rauhen scho



schoten/Krocf. *Vicia minima*, Trag. *Cracca minor*, Tab. *Aracus* five *Cracca minima*, Lob. *Cracca* alterum genus, Dod. Vitium est *Secalis*, & *Hordei*.

*Vicia lutea folijs convolvuli minoris*, C. B. Gelbe Wicken mit Winden blettern. *Aphaca*, Lob. *Cam. Elatine tertia*, Tab.

*Viola lunaria major filiqua rotunda*, C. B. Mondviole mit runden schoten. *Viola lunaris prima*, Tab. *latifolia*, Dod. *lunaria Græca*, Lob. *Lunaria Græca annua*, Eyft.

*Viola lunaria major filiqua oblonga*, C. B. Mondviole mit länglichen schoten. *Viola lunaris secunda*, Tab. *latifolia*, Clus. *Lunaria Græca perennis*, Eyft. *Lunaria Raphanitis*, five *Bolbonac*, radice rediviva, Lob. ic. Huic flos albus.

*Viola martia purpurea flore simplici odoro*, C. B. \* Wohlriechende Mergviolen. *Viola purpurea*, Matth. *nigra*, Dod. Clus. *martia purpurea*, Tab. *præcox purpurea*, Lob.

*Viola martia inodora sylvestris*, C. B. \* Mergviolen ohn geruch. *Viola canina*, Lon. Trag. Tab. *martia canina*, Eyft. *sylvestris inodora*, Dod. *canina cærulea inodora sylvestris ferotina*, Lob. ic.

*Viola martia multiplici flore*, C. B. Viele Mergviolen. *Viola flore multiplici*, Dod. *martia purpurea*, Lob. ic. *purpurea multiplex*, Tab. Eyft.

*Viola martia erecta purpurea*. Aufrechte Biöle mit purpurblumen. *Viola arborescens*, Matth.

Matth. Tab. martia arborescens purpurea, C.B. elatior, Clus. erecta flore caeruleo, Eyst.

*Viola tricolor erecta*, C. B. \* Aufrechte Viole mit dreien farben. *Viola asurgens tricolor*, Dod. martia surrectis cauliculis, Lob.

*Viola tricolor hortensis repens*, C. B. Kriechende Viole mit dreien farben. *Viola tricolor*, Dod. Clus. flammea coloria, Lob. trinitatis prima, Tab. Herba trinitatis, Fuch. Lon. lativa, Trag. Jacea sive Flos trinitatis, Matth. Color floris variat, qui triplex, duplex, simplex interdum, scilicet luteus aut pallidus: magnitudine vero reliquas superat. Quo pertinet Flos trinitatis major violaceus, & major pallidus, Eyst.

*Viola bicolor arvensis*, C. B. \* Acker violen mit zwey farben. *Viola trinitatis minor petraea*, Tab. sylvestris, Lob. ic. Herba trinitatis sylvestris, Trag. Jacea altera, Matth.

*Virga aurea latifolia serrata*, C. B. Breitblettrig Wundkraut. *Virga aurea*, Cam. ep. altera serrato folio, Lob. ferratis foliis, Tab. margine crenato, Dod.

*Virga aurea angustifolia minus serrata*, C. B. \* Schmalblettrig Wundkraut / Heidnisch Wundkraut. *Virga aurea*, Matth. Dod. Eyst. foliis non ferratis, Cam. ep. aurea Villanovani, Lob. Symphytum petraeum tertium, Tab.

*Viscum baccis albis*, C. B. \* Mistel. *Viscum*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Clus. Apud nos in

in quercu, malo, forte etiam aliis arboribus reperitur.

*Vitex folijs angustioribus cannabis modo dispositis*, C.B. Reuschbaum. Vitex, Trag. Dod five Salix amerina, Matth. Agnus castus, Off. Elæagnon Theophrasti, Lob.

*Vitis Idæa folijs oblongis crenatis fructu nigricante*, C.B.\* Schwarze Heydelbeer / Schwarze Besinge. Vitis Idæa prima, Tab. vulgaris baccis nigris, Clus. Myrtillus, Matth. Vaccinia nigra, Lob.

*Vitis Idæa folijs subrotundis non crenatis baccis rubris*, C. B.\* Rote Heydelbeer. Vitis Idæa rubra, Dod. Cam. ep. bucceis foliis, Clus. Vaccinia rubra, Lob. Myrtillus exiguus, Trag.

*Vitis vinifera*, C.B. Diosc. Lob. Matth. Dod. & exterorum. Weinstock. Hujus differentiarum potissimum ab uvis petuntur, quæ ratione quantitatis, adsunt magnæ vel parvæ, & quidem acinis sparsis vel compactis præditæ: ratione coloris, albæ, virides, fulvæ, rubentes & nigricantes. Constituntur autem vulgo duo quasi summa genera, Blancker und rohter Wein. Prioris species potissimæ apud nos hæ sunt: Schönadel / Muscateller / Blanck-Welsch / Rehfahl / Mittel- Fränkisch / Groß- Fränkisch / Klein- Fränkisch / Adel- Fränkisch / Grün- Fränkisch / Elbling / Blanckheurnisch / Rüssling / Lamperts / Weidling / Grün Weidling. Posterioris vero sequentes: Rote Muscateller / Rote Welsch / Genser oder Rote Schön-

Schönadel/ Roht Terminer/ Schiel Terminer/  
Wiener/ Klebroht/ Ungrisch Leibfarb/ Roht Heu-  
nisch/ Hartroht/ Ziegelfarbe/ Gemein roht/ Fett-  
roht/ Schleeroht/ Zottelroht.

*Vitis vinifera apyrena*. Corinthen/ Weintrau-  
ben ohn förner. *Vitis Corinthia* & *apyrina*, Lob.  
Adv. *Uvæ passæ Indicæ gigartis carêtes*, C.B. *Uvæ*,  
sine vinaceis seu *apyrenæ*, add. Clus. cur. post. Ab  
hac diversa est *Vitis agygartos*, Cam, cui vulgare  
nomen Elbertrauben.

*Vitis Americana quinquefolia*. Fünffblettri-  
ger Weinstock aus America. *Vitis Virginiana*, C.  
B. & *Vitedera Virginiana*, Hort. Hafn. & Græ-  
ning. Ramulorum plerique quina, pauci terna  
promunt folia.

*Vitis Americana folio juglandis*. Americani-  
scher Weinstock mit Nußblettern. *Vitis Canaden-  
sis*, C.B. & *Vitis Indica trifolia*, Hort. Patav. Folia  
terna junguntur uno pediculo ad similitudinem  
foliorum trifolii aut phaseoli. Eorum quædam  
margine integro, alia leviter sinuato donantur.

*Ulmus campestris*, C.B. \* Küster. *Ulmus*,  
Trag. Matth. Dod. Lob. Clus. prima, Tab. Semi-  
na huic foliacea, & gallinis in cibum summopere  
expetita: quod si ipsis abundanter vescantur, adeo  
interdum pinguescunt, ut inde moriantur.

*Urtica urens maxima*, C.B. \* Grosse Bren-  
nessel/ Brandnessel. *Urtica major*, Tab. secunda,  
Matth. *urens altera*, Dod. *sylvestris asperior*.

Lob. Crescit etiam caule parum rubente.

*Urtica urens minor*, C.B. \* Kleine Brennessel.

*Urtica minor*, Tab. tertia, Trag. Matth. urens minima, Dod. minor acrior, Lob.

*Urtica urens pilulas ferens*, C.B. Welsche Nessel / quibusdam jocosè Spanischer Majoran / ad fallendum incautos, ut specie nominis illusi, naribus ramulū decerptū admoveant. *Urtica prima*, Matth. prima semine lini, Diosc. Romana, Trag. Eyst. Romana vel mascula, Lob. Tab. Clus. urēs prior, Dod.

*Urtica aculeata folijs serratis*, C.B. \* Hanffnessel, Cannabis sylvestris, Trag. sylvestris spuria altera, Lob. ic. Cannabina alba, Tab.

*Urtica aculeata folijs serratis altera*, C.B. \* Hanffnessel eine ander art. *Urtica mortua quarta*, Dod. poster. Cannabis sylvestris spuria tertia, Lob. ic. Alyssum arvense album, Tab.

*Ustilago secalis*, C.B. \* Roggebrand. *Ustilago*, Trag. Dod. Lon. Lob. secalina, Tab. Hæc, sicut & sequentes binæ, non sunt species, sed stirpium suarum vitia, ex uredine seu rubigine nata.

*Ustilago hordei*, C.B. \* Gerstebrand. *Ustilago hordeacea*, Tab. polystichi, & hordei distichi, Lob. ic.

*Ustilago avenæ*, C.B. \* & Lob. ic. Haberbrand. *Ustilago avenacea*, Tab.

*Yucca folijs Aloës*, C.B. Zucca. Hiucca, aliorum: *Yucca nova gloriose elata*, Lob. adv. part. alt. *Yucca* ~~radix~~ occidentalis planta, Horti Parisiensis.

*Zea*



*Zeopyron seu Triticospeltum*, C.B. Speltweizen/Mackende Gerste, Zeopyron, Dod. Lob. Tab. Speltæ species tertia, Trag. Hordeum glabrum, Cord. nudum, Ges. gymnocrithon, Cam.

*Ziziphus sativa fructu oblongo*. Brustbeerbaum/Zieserlein. Jujubæ, Trag. Tab. Arabum, Lob. majores oblongæ, C.B. Ziziphus, Dod. Clus. Zizipha, Matth.

## EXPLICATIO NOTARUM,

*Quibus integra citatorum Auctorum nomina designantur.*

Adv. Adversaria Penæ.	Clus. Carol. Clusii Historia rariorum.
Alpin. Prosper Alpinus.	Clus. pan. Clusii Historia Pannonica.
Bremb. Octavius Brembatus.	Clus. hisp. Clusii Historia Hispanica.
Brunt. Otho Brunfelsig.	Clus. eur. post. Clus. Curæ posteriores.
Bry. Florilegium du Bry.	Colum. Fabius Columna.
C.B. Caspar. Bauhinus.	Cord. Valerius Cordus.
Jo. B. Joan. Bauhinus.	Diosc. Dioscorides.
Cæsalp. Andr. Cæsalpinus.	Dod. Rembertus Dodonæus:
Cam. Joach. Camerarii Hortus.	Eyst. Basil. Bessleri Hortus Eystetenensis.
Cam. ep. Camerarii Epitome.	
Cast. Castor Durantes	

# EXPLICATIO NOTARUM.

<b>Ferrar.</b> Jo. B. Ferrarius.	<b>Plin.</b> Plinii Historia Naturalis.
<b>Fuch.</b> Leonh. Fuchsi.	<b>Prodr.</b> Caspari Bauhini Prodomus.
<b>Historia</b> Latina.	<b>Rauv.</b> Leonhardus Rauvolfius.
<b>Ges.</b> Conradus Gesnerus.	<b>Ruell.</b> Joannes Ruellius.
<b>Lob.</b> Matth. Lobelii Observationes.	<b>Suert.</b> Samuel Suertius.
<b>Lob. ic.</b> Lobelii Icones seorsim cusæ.	<b>Tab.</b> Tabernæmontani editio Bauhiniana.
<b>Lon.</b> Adamus Lonicerus.	<b>Thal.</b> Joannes Thalius.
<b>Lugd.</b> Historia generalis Lugduni impressa.	<b>Trag.</b> Hieronymus Tragus.
<b>Matth.</b> Matthioli Latini editio Bauhiniana.	<b>Vell.</b> Joan. Vesslingius.
<b>Monar.</b> Nicolaus Monardes.	

## INDEX GERMANICUS,

In gratiam Tyronum pro faciliore inquisitione adjunctus: in quo tamen non singulæ Species, sed magnam partem Genera saltem Plantarum Marchicarum recensentur: quin & multa nomina non Germanica, vulgo tamen usitata admiscuntur.

<b>Abiss.</b> Succisa.	<b>Adelen.</b> Aquilegia.
<b>Abelmosch.</b> Alceæ species.	<b>Ackerflette.</b> Caulis.
<b>Abend</b> Violæ. Hesperis.	<b>Ackerminze.</b> Calamintha.
<b>Abraz.</b> Alii spec.	<b>Ackerzwiebel.</b> Ornithogali spec.
<b>Abutilon.</b> Althææ spec.	<b>Adamsapffel.</b> Mali aurantiæ spec.
<b>Acacia.</b> Acacia.	<b>Abrause.</b> Abrotanum.
<b>Acarne.</b> Acacia.	

# GERMANICUS.

Aegyptisch Mueskraut.	Balaustien. Mali Punicea
Corchorus.	spec.
Uhorn. Acer montanum.	Baldgreiß. Senecio.
Uland/ Ulauntwurz. Hel-	Baldrian. Valeriana.
nium.	Balsamkraut. Balsamina.
Ulandbeer/ Ulsesinge. Gros-	Balsmiste. Mentha spec.
sularia spec.	Bammia. Alcea spec.
Ulatern. Philyca.	Bärdille. Meum.
Alcea. Alcea.	Bärenklau welsch. Acanth.
Upranden. Solani spec.	Bärenklau teutsch. Sphon-
Upraute. Fumaria.	dylum.
Aloe. Aloe.	Bärohren. Sanicula alpina.
AlpenSalbey/ Alpenkraut.	Basilge. Ocimum.
Stachys spec.	Bathengel. Chamædrys.
Ulsnach. Apii spec.	Baumbonen. Anagyris.
Androsace. Alfine spec.	Baum des Lebens. Thya.
Andorn. Marrubium.	Baumwolle. Gossypium.
Anemone. Anemone.	Baursenff. Thlaspi.
Aniß. Anisum.	Beinwell. Symphytū maj.
Angelice. Angelica.	Beiskohl. Beta.
Anthyllis. Anthyllis.	Beißrüben. Beta spec.
Aphodil. Asphodelus.	Benedictenwurz. Caryo-
Aphodil-Elie. Lili spec.	phyllata.
Apffelbaum. Malus.	Berberiß. Berberis.
Apostemkraut. Scabiosa.	Bergmünze. Calamintha
Apricosen. Malus Armeni-	spec.
aca.	Berg Sanickel. Sanicula
Artshocken. Cinara.	montana.
Aschlauch. Porrum.	Beruffkraut. Conyza spec.
Aspe. Populi spec.	Besinge. Vitis Idæa spec.
Attig. Sambuci spec.	Besingkraut. Fragaria.
Augentrost. Eufragia.	Betonte. Betonica.
Aurin wild. Gratiola.	Bettfuß. Clinopodium.
Azedarach. Azedaracus.	Bensfuß. Artemisia.
<b>B</b> Achbungen. Anagallis	Benkraut. Securigera.
aquatica.	Bilsenkraut. Hyoscyamus.
	Win.

# INDEX

- Bingelkraut. Mercurialis.  
 Binsen. Juncus.  
 Bircke. Betula.  
 Birnbaum. Pyrus.  
 Bischoffshut. Epimedium.  
 Bittersüß. Solani spec.  
 Blasenerbsen. Pisum vesicarium.  
 Blaue Distel. Eryngium.  
 Bleykraut. Lepidii spec.  
 Blumen-rohr. Arundo indica.  
 Bocksbart. Tragopogon.  
 Bockshorn. Foeniculum graecum.  
 Bone. Faba.  
 Borrage. Buglossi spec.  
 Brand. Ustilago.  
 Brandnessel. Urtica urens.  
 Braunwurz. Scrofularia.  
 Brombeern. Rubus.  
 Brunette. Adonis.  
 Brustbeerbaum. Ziziphus.  
 Büche. Fagus.  
 Buchwetz. Erysimum cereale.  
 Bucke. Artemisia.  
 Burzeldorn. Tribulus terrestris.  
 Burzelkraut. Portulaca.  
 Buxbaum. Buxus.  
 Calmus. Acorus.  
 Canarienkraut. Phalaris.  
 Caneelbaum. Lauri spec.  
 Cappern. Capparis.  
 Cardinalsblume. Trachelium Americanum.  
 Cardobenedicten. Cnici spec.  
 Castanie. Castanea.  
 Centifolie. Rosa spec.  
 Cepee. Cepaea.  
 Cerinthe. Cerinthe.  
 Chamänerion. Lythymachia spec.  
 Chermesbaum. Ilicis spec.  
 Chondrille. Chondrilla.  
 Circäa. Solanifolia.  
 Cistus. Cistus.  
 Citrouen. Malus Medica.  
 Citrullen. Anguria.  
 Coccinellen Wegegras. Polygoni spec.  
 Colocasia. Aris spec.  
 Coriander. Coriandrum.  
 Cornelbaum. Cornus.  
 Cortusa. Sanicula spec.  
 Creuzbeer. Loniceri. Alni spec.  
 Creuzblume. Polygala.  
 Creuz. Salbey. Salvia spec.  
 Creuzkraut. Senecio.  
 Crupine. Chondrilla spec.  
 Cypressenbaum. Cupressus.  
 Cypressenkraut. Abrotanum foemina.  
 Dattelbaum. Palma.  
 Dentellaria. Lepidii spec.  
 Diesemkraut. Geranii spec.

Dille. Anethum.	Enzianelle. Gentianella.
Diptam der falsche. Pseudodictamnus.	Ephew. Hedera arborea.
Diptam der weisse. Dictamnus albus.	Eppich. Apium.
Distel. Carduus.	Erbsen. Pisum.
Dost. Origanum.	Erdartschocken. Helenii sp.
Dotterblume. Caltha sp.	Erdbeer. Fragaria.
Dotterkraut. Erysimum vulgare.	Erdbeer-spinat. Actipl. sp.
Draba. Draba.	Erdrauch. Fumaria.
Dragune. Dracunculus.	Erdsinnenkraut. Phalang.
Draspe. Festuca spec.	Esche. Fraxinus.
Durchwachs. Perfoliata.	Esula Indica. Lapathi sp.
Dürrwurz. Conyza.	Färberbaum. Cotinus.
Dunnen-besing. Rhamni fructus.	Färberrotthe. Rubia.
Ebereschen. Sorbus.	Farenkraut. Filix.
Eberwurz. Carlina.	Faselen. Phaleolus.
Echium. Echium.	Faulbaum. Alnus nigra.
Edel Leberkraut. Trifolium hepaticum.	Fetthonen. Lupinus.
Egelfraut. Nummularia.	Fetgenbaum. Ficus.
Ehrenpreis. Veronica.	Feldrapünzel. Valerian. sp.
Eibenbaum. Taxus.	Fendel. Foeniculum.
Eiche. Quercus.	Fette Hanne. Telephium.
Eichfaren. Filix querna.	Fench/Fench. Panicum.
Einbeer. Solani spec.	Fichte. Pinus.
Eisenhütlein. Aconitum.	Fieberkraut. Lyfimachiz spec.
Eisenkraut/Eiserhart. Verbena.	Filzfraut. Cuscuta.
Else/Erle. Alnus.	Fingerkraut. Digitalis.
Endivien. Intybus.	Glack. Linum.
Eugelsüß. Polypodium.	Glackstrauch. Linaria.
Enztan. Gentiana.	Glacksdotter. Sesamum.
	Glieder. Sambucus.
	Gliederschwamm. Fungi spec.
	Glockblume. Iacea.
	Glockkraut. Perficaria.



# INDEX.

Frabjosenholz. Lotus Afri-	Goldblume. Chrysanthe-
cana.	mum.
Frauenmünze. Mentha sp.	Gold-distel. Scolymus.
Frauenschu. Helleborina	Gottheil. Brunella.
spec.	Gottshülff. Marrubium
Frauenspiegel. Onobrychis	album.
arvensis.	Gräffinne. Coronopus.
Fritillarie. Fritillaria.	Granatenbaum. Malus
Fuchßschwanz. Panicum.	Punica.
Fühlendes Kraut. Herba	Gras. Gramen.
mimosa.	Gras-Isop/Grase-Poley.
Fünffinger-Kraut. Quin-	Hyssopifolia.
quefolium.	Graselulch. Festuca grami-
Gamander. Chamædrys.	nea.
Gänseblumen. Bellis syl-	Gratia Dei. Geranii spec.
vestris.	Grazede. Gratiola.
Gänserich/Gänsekraut. Po-	Grindwurz. Lapathū acutū
tentilla.	Gvajacum Patavinum.
Gartenflee. Lotus hortensis.	Lotus Africana.
Garbe. Cumini spec.	Gulden Gänfel. Consolida
Gauchheil. Anagallis.	media.
Geißbart. Barba capræ.	Gulden Lachen. Leucii sp.
Geißblat. Periclymenum.	Gulden Widertod. Poly-
Geißflee. Cytisus.	trichum aureum.
Geißraute. Galega.	Gunderman/Gundelrebe.
Gelber Viole. Leucii sp.	Hedera terrestris.
Gelbe Razenpoten. Heli-	Gurken. Cucumis.
chrysum.	Gürtelkraut. Musci spec.
Gemsenwurz. Doronicum.	Guter Henrich. Lapathi sp.
Gerberbaum. Rhus.	Haber. Avena.
Gerste. Hordeum.	Haberlulch. Festuca a-
Ginst. Genista.	venacea.
Glasstra. Parietaria.	Haberschlehen. Pruni sylv.
Gliedkraut. Sideritis.	spec.
Glocklein. Campanula.	Habertwurz. Tragopogi sp.

# GERMANICUS.

Habichtkraut. Hieracium.  
 Hagebüche. Ostrya.  
 Hagebutten. Rosa spec.  
 Hagedorn. Mespili spec.  
 Hanefuß. Ranunculus.  
 Hanff. Cannabis.  
 Harthem. Hyperici spec.  
 Hartriegel. Corai spec.  
 Haselnüsse. Corylus.  
 Haselwurz. Asarum.  
 Hasenkohl. Senechus.  
 Hasenpfortlein. Trifolii sp.  
 Hasenpappeln. Malva sylv.  
 Haubechel. Anonis.  
 Hauslaub/Haustwurz. Sedum.  
 Hederich. Rapistrum.  
 Hendelkraut. Alinae spec.  
 Herbstrosen. Malva rosea.  
 Herzfreude. Asperula.  
 Herzgespan. Marrubii sp.  
 Heydnisch Wundkraut. Virga aurea spec.  
 Hendelkraut. Erica.  
 Hendelbeer. Vitis Idra.  
 Hindbeern. Rubus Idæus.  
 Hirschbrunst. Tubera cervina.  
 Hirschkraut. Libanotis.  
 Hirschzunge. Lingua cervina.  
 Hirse. Milium.  
 Holländische Zartuffeln. Solani spec.  
 Hollwurz. Fumariz spec.

Holunder. Sambucus.  
 Hopffe. Lupulus.  
 Hufeisenkraut. Ferrum equinum.  
 Hufslattig. Tussilago.  
 Hülst. Ilicis spec.  
 Hundszahn. Dens canis.  
 Hundszunge. Cynoglossum.  
 Hundedrage. Hedera terrestris.  
 Hünerbiß. Alinae.  
 Hyacinth. Hyacinthus.  
 Jakobskraut. Jacobaea.  
 Jasmin. Jasminum.  
 Jbisch. Althaea.  
 Je länger je lieber. Lupini spec.  
 Jgelstnospen. Sparganium.  
 Jlaub. Hedera arborea.  
 Indiantische Feigen. Ficus Indica.  
 Indianische Kresse. Nasturtium Indicum.  
 Indianischer Pfeffer. Piper Indicum.  
 Joannisbeer. Grossularia non spinosa.  
 Joannisblut. Polygoni cocciferi grana.  
 Joannisbrod. Siliqua edulis.  
 Joanniskraut. Hypericum.  
 Iris. Iris.  
 Isop. Hyssopus.  
 Jude. Tucca.

# INDEX.

Judasbaum. Siliqua spec.	Ruhweizen. Melampyrum.
Judasohr. Fungi spec.	Rümmel. Cuminum.
Judendorn. Rhamni spec.	Rüribis. Cucurbita.
Judenfirschen. Solani spec.	Ublab Phaeoli spec.
Amillen. Chamamelum	Lachentknolauch. Scor-
Rannentraut.	dium.
Kartendistel. Diplacus.	Lactuke. Lactuca.
Käsepappeln. Malva sylve-	Lampfane. Lampfana.
stria.	Lavendel. Lavandula.
Kellersbals. Laureola.	Leberbalsam. Ageratum.
Kerffel. Cezrophylum.	Leberblümlein. Gramen
Ketmia. Olcea arborescens.	Parnassi.
Kerzenkraut. Verbascum.	Leberflee. Trifolium he-
Reuschbaum. Vitex	patium.
Kesertron. Lillii spec.	Leckrige. Glycyrrhiza.
Kichern. Cicer.	Leindotter. Sesamum.
Kirschen. Cerasus.	Leinkraut. Linaria.
Klapperrosen. Papaverer-	Leucoje. Leucorum.
raticum.	Leusekraut. Staphisagria.
Klebekraut. Aparine.	Liebstockel. Ligusticum.
Klee. Trifolium.	Lilienconvallien. Lilium
Kletten. Lappa.	convallium.
Knabenkraut. Telephium.	Lilie. Lilium.
Knauel. Polygoni spec.	Limonen. Malus limonia.
Knoblauch. Allium.	Limonium. Limonium.
Knoblauchkraut. Alliaria.	Linde. Tilia.
Knotenkraut. Scrophularia	Linsen. Lens.
Kohl. Brassica.	Linsenbaum. Colutea.
Kölle. Satureja.	Löffel-futteral. Ferrum
Königsferze. Verbascum.	quinum.
Kornblume. Cyanus.	Löffelkraut. Cochlearia.
Kränenfuß. Coronopus.	Lorbeerbaum. Laurus.
Kresse. Nasturtium.	Lotus. Lotus.
Krusette. Crucjata.	Lotusbaum. Lotus Afri-
Küchenschelle. Puliatilla,	cana.

Löwen-

# GERMANICUS.

Löwenmaul. Antirrhinum.	Meserich. Asperula.
Löwenzahn. Dens leonis.	Mespelbaum. Mespilus.
Lulch. Festuca.	Meur. Alnus spec.
Lulchgras. Gramen lolia- ceum.	Meusedorn. Ruscus.
Lungenkraut. Symphyti sp.	Meusepfaffer. Staphisagria.
Lungenmoß. Musci spec.	Meuseschwanz. Holoste- affinis.
Lychnis. Lychnis.	Mexicanischer Nachtscha- ten. Solani spec.
Majoran. Majorana.	Meyenblümlein. Lilium convallium.
Mandelbaum. Amy- gdalus.	Meyer. Blitum.
Mangolt. Lapathum.	Milchglöcklein. Campanu- la Americana.
Mänsblut. Andros-mon.	Mistel. Viscum.
Mannstreu. Eryngium.	Mohn. papaver.
Marellen. Malus Arme- niaca.	Mohrenkraut. Æthiopis.
Massholder. Acer cæpestre.	Mohrrüben. pastinaca te- nuitolia.
Maßlieben. Bellis.	Moly. Moly.
Maßlichbaum. Lentiscus.	Momordica. Balsam. mas.
Maßlichkraut. Marum.	Monatrose. Rosa spec.
Maulbeerbaum. Morus.	Mondviole. Viola lunaria.
Maurfarn. Trichomanes.	Mondkraut / Mondraute. Lunaria.
Maurpfaffer. Sedi spec.	Morcheln. Fungi spec.
Meer-polium. Polium ma- ritimum.	Mosß. Muscus.
Meer-portulac. Halimus.	Mottenkraut. Blattaria.
Meerzwiebel. Scilla.	Münchrhabarbar. Lapathi spec.
Megerkraut. Mollugo.	Münze. Menta.
Meisterwurz. Imperatoria.	Mutterkraut. Matricaria.
Melde. Attriplex.	Myrrhis. Myrrhis.
Melisse. Melissa.	Myrtenbaum. Myrtus.
Melone. Melo.	Myrtendorn. Ruscus.
Melochia. Corchorus.	
Merrettig. Raphani spec.	
Merzviole. Viola Martia.	

# INDEX.

- N**abelkraut. Coryledon.  
 Nachtschatten. Solanū.  
 Nackende Gerste. Zeopyrō.  
 Nägelein. Caryophyllus.  
 Nagelkraut. Pilosellæ spec.  
 Nägeleintourz. Caryophyllata.  
 Narzisse. Narcissus.  
 Natterwurz. Bistorta.  
 Nette. Calaminthæ spec.  
 Nessel. Urtica.  
 Niesewurz. Helleborus.  
 Nigelle. Nigella.  
 Noli-me-tangere. Balsaminæ spec.  
 Nüsse. Nux juglans.  
**O**chsenauge. Buphtalmum.  
 Ochsenzunge. Buglossum.  
 Odermeñige. Eupatorii sp.  
 Oelbaum. Olea.  
 Oleander. Nerion.  
 Orchis. Orchis.  
 Orobus. Orobus.  
 Osterluzie. Aristolochia.  
**P**apagenfedern. Amarynthi spec.  
 Pappelbaum. Populus.  
 Pappelkraut. Malva.  
 Passionblume. Clematidis spec.  
 Pastinack. Pastinaca latifolia.  
 Pavv. Anemonæ spec.  
 Pechtanne. Picea.  
 Pehden. Graminis spec.  
 Pergamotten. Pyri spec.  
 Perlkraut. Lithospermum.  
 Persianische Lilie. Lilium Persicum.  
 Petersilge. Apium.  
 S. Peterskraut. Parietaria.  
 Petromarula. Rapunculi spec.  
 Pfaffenröhrlein. Dens leonis.  
 Pfaffenpint. Arum.  
 Pfeben oder Peponē. Pepo.  
 Pfefferkraut. Lepidium & Satureja.  
 Peilkraut. Sagitta.  
 Pfenigkraut. Nummularia  
 Pfifferling. Fungi spec.  
 Pfirsichen. persica.  
 Pflaumenbaum. Prunus.  
 Pfrimkraut. Genista.  
 Piloselle. pilosella.  
 Pimpernüsse. pistacia sylvestris.  
 Pimpinelle. pimpinella.  
 Pistaciē. pistacia peregrina  
 Platterbsen. Lathyrus.  
 Poeonte. poeonia.  
 Posist. Fungi spec.  
 Poley. pulegium.  
 Polenenmünze. Calaminthæ spec.  
 Pomeranzen. Malus aurantia.  
 Portulac. portulaca.



# GERMANICUS.

Post. Cisti spec.  
 Pötscherben. Alni nigra spec.  
 Psyllie. psyllium.  
 Pölze. Fungi spec.  
 Pyramidal. Rapunculi sp.  
**P** Bamoclit. Jasmini spec.  
 Queden. Gramen caninū.  
 Quendel. Serpyllum.  
 Quittenbaum. Malus cotonea.  
 Quitzenbaum. Sorbus.  
**R** Ade. Lychnis spec.  
 Radies. Raphani spec.  
 Rapünzel. Rapunculus.  
 Rauce. Eruca.  
 Raubbeer. grossularia sp.  
 Raute. Ruta.  
 Reitscher. Fungi spec.  
 Resede. Reseda.  
 Rheinblume. Helichrysum  
 Rheinfarn. Tanacetum.  
 Rheinweide. Ligustrum.  
 Ringelblum. Caltha.  
 Ritterspor. Consolidaga-  
 galis.  
 Rodel. pedicularis.  
 Rogge. Secale.  
 Roggeblume. Cyanus.  
 Rohr. Arundo.  
 Rose. Rosa.  
 Rosentwurz. Radix rhodia.  
 Rosenpappel. Malva rosea.  
 Rosinen. grossularia spec.

Rosmarin. Rosmarinus.  
 Rosschwanz. Equisetum.  
 Rothe Rüben. Beta spec.  
 Rothe Steinbrech. Filipendula.  
 Rothe Tanne. picea.  
 Rübe. Rapa.  
 Rüberettig. Raphanus.  
 Ruhrkraut. Gnaphalium.  
 Ruprechtstrauch. Geranii spec.  
 Ruster. Ulmus.  
**S** Affran. Crocus.  
 Salben. Salvia.  
 Salbeyen-Wollkraut. Verbasci spec.  
 Salben-Scordium. Scordii spec.  
 Samkraut. potamogeton.  
 Sammetblume. Tanacetum spec.  
 Sanddorn. Rhamni spec.  
 Sanguisorba. pimpinella spec.  
 Sanikel. Sanicula.  
 Saturey. Satureja.  
 Saurampff. Acetosa.  
 Saurklee. Trifolii spec.  
 Scabiose. Scabiosa.  
 Schaffthew. Equisetum.  
 Schaffgarbe. Millefolium.  
 Scharbockstrauch. Chelidonia minor.  
 Scharley. Horminum.  
 Schallachbaum. ilicis spec.  
 Schar.

# INDEX

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Schartenkraut. Serratula.           | Senff. Sinapi.                     |
| Schellkraut. Chelidonium.           | Senfblatter. Colutea sp.           |
| Schildkraut. Onobrychis.            | Sesban Galega spec.                |
| Schirling. Cicuta.                  | Sevenbaum. Sabina.                 |
| Schirlingkraut. Cicuta.             | Sehlwende. Salicis spec.           |
| ria.                                | Siebenzett. Loni spec.             |
| Schlagkraut. Chamæpitys.            | Sichelkraut. Aloes spec.           |
| Schlangenkraut. Dracunculus.        | Sigmarskraut. Alcea.               |
| Schlangenzünglein. Ophioglossum.    | Sinaw. Alchimilla.                 |
| Schlehen. prunus sylvestris.        | Singrün. Clematis.                 |
| Schlingbaum. Rhus.                  | Sonnenblume. Helenium Indicum.     |
| Schlüsselblumen. Verberculum.       | Sonnentau. Ros solis.              |
| Schneeballen. Sambuci sp.           | Sophera. Galega spec.              |
| Schneetropffen. Leucopium bulbosum. | Spanischer Glieder. Syringa spec.  |
| Schneckenklee. Trifolii spec.       | Spanischer Hopffe. Origanum spec.  |
| Schnitslauch. porri spec.           | Spanisch Majoran. Urtica spec.     |
| Schwaden. Graminis spec.            | Spanisch Rohr. Arundinis spec.     |
| Schwalbenturz. Asclepias            | Spargen. Asparagus.                |
| Schwarzkümmel. Nigella.             | Spartium. Spartium.                |
| Schwarzwurz. symphytum majus.       | Specklilie. periclymenum.          |
| Schweinbrod. Cyclamen.              | Speltweizen. Zeopyron.             |
| Schwertel. Gladiolus.               | Sperberbaum. Sorbus lat.           |
| Scorpionkraut. Scorpioid.           | Spenerlinge. sorbi lativæ fructus. |
| Scorzonere. scorzonera.             | Spergula. Alfine spec.             |
| Scutellarie. Lamii spec.            | Spica. Lavendula spec.             |
| Seebume. Nymphaea.                  | Spilbaum. Evonymus.                |
| Seidelbast. Chamæla.                | Spillinge. pruni spec.             |
| Seiffkraut. Saponaria.              | Spinat. Lapathi spec.              |
| Seleri. Apii spec.                  | Spinngeweb. ledi spec.             |

# GERMANICUS.

<b>E</b> piräa. Coirza.	<b>Z</b> aschekraut. Bursa pastoris.
<b>S</b> poräpfel. torbi sativa fructus.	<b>Z</b> aube Nessel. Lamium.
<b>S</b> pringkörner. Labyrinth.	<b>Z</b> auerbaum. Rhus.
<b>S</b> tachwurz. Abrotanum	<b>Z</b> ausendgüldenraut. Centaureum.
<b>S</b> tachelbeer. Grossularia.	<b>Z</b> ausendknoten. polygo- num.
<b>S</b> tallkraut. Anonis.	<b>Z</b> ausendkorn. polygoni sp.
<b>S</b> techaskraut. Stoechas.	<b>Z</b> ausendschön. Amaranth 9.
<b>S</b> tehende Winde. Smilax aspera.	<b>Z</b> erpethinbaum. Terebint.
<b>S</b> techpalmen. ilicis spec.	<b>Z</b> eucrium. Teucrium.
<b>S</b> techrüben. Napus.	<b>Z</b> eutsch Ingber. Arum.
<b>S</b> teigbönen. phaseoli spec.	<b>Z</b> hanne die weisse. Abies.
<b>S</b> teinbrech. saxifraga.	<b>Z</b> hanne die rothe. picea.
<b>S</b> teinfeder. Trichomanes.	<b>Z</b> hymian. Thymus.
<b>S</b> teinflee. Melilotus.	<b>Z</b> olläpfel. solani spec.
<b>S</b> teintresse. Coronopi spe.	<b>Z</b> ormentille. Tormentilla.
<b>S</b> teinmoß. Lichen petra 9.	<b>Z</b> raubelweize. Triticum spica multiplici.
<b>S</b> teinrößlein. Thymelæa officinis.	<b>Z</b> raubenkraut. abotrys.
<b>S</b> ternkraut. Aster.	<b>Z</b> ürckische bonē. phaseoli sp.
<b>S</b> törbe. Stoebr.	<b>Z</b> ürkischer Bund. Liliisp.
<b>S</b> torchschnabel. geranium.	<b>Z</b> ulpe. Tulipa.
<b>S</b> tramonie. solani spec.	<b>V</b> iole. Viola.
<b>S</b> treichkraut. Luteola.	<b>V</b> ogelfuß. Ornithop.
<b>S</b> yraxbaum. Sytax.	<b>V</b> ogelmilch. Ornithogala.
<b>S</b> üßholz. Glycyrrhiza.	<b>V</b> ogelnest. pastinacæ spec.
<b>S</b> yrinae. Syringa.	<b>J</b> acholder. juniperus.
<b>S</b> yrischer Pappelbaum Aloeæ spec.	<b>W</b> aldmeister. Asper.
<b>T</b> aback. Nicotiana.	<b>W</b> aldrebe. Clematitis.
<b>T</b> amarissen. Tamarix.	<b>W</b> allnüsse. Nucis juglan- dis spec.
<b>T</b> ag und Nacht. parietaria.	<b>W</b> allstroh. gallium.
<b>T</b> artuffeln aus Holland. solani spec.	<b>W</b> allwurz. symphy- tum.

Wiss

# INDEX GERMANICUS.

Wasserdoſt. Eupatorium.	Winterblumen. Helichryſ.
Wafferfolb. Typha paluſtr.	Wintergrün. pyrola.
Wafferlilie gelb. acori ſp.	Winter-rapünzel. Valeria-
Waffermerck. Apii ſpec.	na ſpec.
Waffermerck mit länglichẽ blettern. Sion.	Wirbeldoſt. Clinopodium.
Waffernüſſe. Tribulus a quaticus.	Wirbelkraut. Aſtragalus.
Webediſtel. Spina alba.	Wolfsbeer. Solani ſpec.
Wegedorn. Rhamnus.	Wolffsmilch. Tithymalus.
Wegegras. polygoum.	Wolgemut. Origanum.
Wegerich / Wegebreit.	Wollkraut. Verbascum.
plantago.	Wunderbaum. Ricinus.
Wegeſenff. Eryſimū vulg.	Wundkraut. Virga aurea.
Wegewart. Cichorium.	Wundkraut dem Loto ver-
Weide. Salix.	wand. Loto affinis.
Weidendorn. Rhamni ſp.	WurzelRapünzel. (Rapun-
Weinſtock. Vitis vinifera.	culus eſculentus.
Weinſtock aus America.	Zahnkraut / Zahnwurz.
Vitis Americana.	Orobanche.
Weißdorn. Meſpili ſpec.	Zapffenkraut. Laurus A-
Weißwurz. polygonatum.	lexandrina.
Weize. Triticum.	Zaunrübe. Bryonia.
Welfamen. Naſturtii ſpec.	Zehrwurz. Arum.
Welfche Bonẽ. phaſcoli ſp.	Zeisigkraut. Anagallis ſpec.
Wermuth. Abſinthium.	Zeitloſen. Colchicum.
Wenderich. Lyſimachia.	Ziegenraute. Galega.
Wicken. Vicia.	Zieferlein. Ziziphus.
Wiederſtoß. Lychnis ſpec.	Ziland. Chamelza.
Wiepen. Roſe ſpec.	Zuckerrüben. Siſarum.
Wieſenraute. ThaliArum.	Zuckerschoten. piſi ſpec.
Wild Aurin. Gratiola.	ZwergRingelblume. Cal-
Wilder Saſſfran. Cnicus.	hæ ſpec.
Winde. Convolvulus.	Zwerckweide. Salicis ſpec.
Windröſlein. Anemone.	Zwenblatt. Ophis bifolia.
	Zwiebel. Ceba.
	Zymbelkraut. Cymbalaria.















